

JO. BAPTISTAE.
MORGAGNI
IN PATAVINO GYMNASIO
PRIMARIJ ANATOMES PROFESSORIS
ADVERSARIA
ANATOMICA TERTIA.

*Observationes complectuntur distributas in L. Animadver-
siones ad Partem I. Libri II. Theatri Anatomici
Cl. V. Jo. Jacobi Mangeti Sereniss. Regis
Prussia Archiatri.*



PATAVII. MDCCXVII.
EXCUDEBAT JOSEPHUS COMINUS
VULPIORUM AERE.
et SUPERIORUM PERMISSU.

Illustrissimis atque Excellentissimis Viris
REI LITTERARIÆ MODERATORIBUS
FRANCISCO SUPERANTIO
Aedis D. Marci Procuratori,
MICHAELI MAUROCENO,
LAURENTIO THEUPOLO
Equiti, ac Aedis D. Marci Procuratori,
TOTIQUE TRIUMVIRUM LITTERARIORUM
ORDINI AMPLISSIMO



Joannes Baptista Morgagnus S. P. D.



On est cur longa epistola gravissimis ob-
strepam occupationibus quibus Vos, AM-
PLISSIMI VIRI, in Reipublica procurazione distine-
mini. Quod enim mihi in his Tertiis Adversariis edendis
con-

consilium sit, in iis exposui litteris quas nuper Alteris præfixi. Virtutes verò innumeras, & cetera Eximia Ornamenta Vestra celebrare nec pro dignitate possum (quis autem possit?) & si possem, in epistola tamen non aggredierer. Illud ergo unum relinquitur ut Vos orem, ut hoc quoque opusculum, quale id cunque est, & Vobis esse inscriptum, & gratum acceptumque habere velitis. Quod tamen ipsum ne pluribus verbis à Vobis petam, Vestra ista facit cum omnibus cognita, tum mihi inprimis spectata Benignitas. Quamobrem potius D. O. M. precor, ut Vos omnes, *AMPLISSIMI VIRI*, & Patriæ, & huic Gymnasio quam diutissimè servet incolumes.

D. Patavio III. Idus Novembres M DCC XVII.



JO. BAPTISTÆ MORGAGNI
ADVERSARIA ANATOMICA
T E R T I A

A D V. C L.

JO. JACOBUM MANGETUM.

M. D. & Sereniss. Regis Prussia Archiatrum.

A N I M A D V E R S I O I



Ecundi Libri tui primis paginis vix inspectis,
hunc intelligo priori non dissimilem fore.
Nam ad Peritonæum quod attinet, te ita
geris, V. Cl. ut Lectorem & supervacaneis
lassis, & inter se pugnantibus implices.
Supervacanea inprimis sunt his temporibus
quæ ex Glissonio de Peritonæi, tunicarum
que viscerum, ipsi inclusorum, exortu tam
prolixo sermone exhibes. Pugnant verò
inter se præsertim quæ de Processibus Pe-
ritonæi ex eodem Glissonio, ex Nuckio, & ex Verheyenio addu-
cis. Nam primus interiorum Peritonæi membranam ad initia eorum
Processuum pertundi; & in herniis dilatari sive in viris, sive in mu-
lieribus indiscriminatim docet. Nuckius id in mulieribus concedit;
in viris negat. Verheyenius negat indiscriminatim, atque ideo in
utrisque. Hic qui Lectores scire possint, hos Processus, ut in vi-
ris, diligentius à Verheyenio; ut in mulieribus, à Nuckio; ut in
utrisque.

TOM. I.
pag.
234

De Processibus Peritonæi.

234.

235

236

A

utrisque

- utrisque, minis accuratè à Glissonio esse descriptos; quì, inquam, scire possint, quæro, te silente, imò Verheyenii Anatomiam ceu „ non parum sanè accuratam, „ & Glissonii Tractatum ceu „ accuratissimum „ dum singulorum verba affers, laudante? Cre-
 234. dent, opinor, Glissonio non modò in his, sed & in cæteris quæ, te pariter silente, addit, videlicet intrà eòdem Peritonæi Processus quasi intrà capsulas in viris musculos cremasteres descendere, in mulieribus ligamenta rotunda *ad clitoridem* deferri. Igitur præstitisset hæc ex Glissonio, doctissimo alioquin Viro, & in aliis diligentiore, præmittere; eorumque vice, Diverticuli, ut Nuckius loquitur, Peritonæi Figuram ab hoc ipso editam producere, quam in Tabula LVI. ubi locus non defuisset, frustra quæro. Cæterum
 236. num quæ gula, vena cava, & reliqua de quibus Verheyenius meminit, transeunt, Peritonæum perforetur, an potius ad ea obducenda invertatur, aliasque de hoc genere disquisitiones prætergredior, ut de istis duobus quæ Poupartius Suspensoria Abdominis Ligamenta appellavit, quid sit mihi observarum, proponam, non jam dico
 237. in veterum Anatomicorum libris, in quibus eadem memorantur, sed in multis cadaveribus, in quibus longè aliam eorum naturam
 238. *Ligamenta Abdominis Suspensoria.* deprehendi. Resecto enim illo ipsorum extremo per quod ossi pubis affiguntur, eoque unà cum continuato musculi Obliqui Externi tendine ad latus sensim inverso, evidentissimè comperi, ipsa non peculiaris ligamenta, sed imam tendinis ejusdem musculi oram esse. Fiunt namque ex fibris quæ proximis in continuato tendine sunt parallelæ, eadem cum ipsis figurâ, crassitie, colore, consistentiâ, eademque demum; quod potissimum attendendum est; cum fibris musculi carnis continuatione. Nam etsi infimarum ex ipsis perpaucæ, extremæ spinæ ossis ilium in transitu annecti solent (nam & aliquando nullas earum annexas vidi) non tamen propterea non satis perspicuè, respondentibus sibi fibris carnis hæc quoque continuantur. Hæc serè ipsæ sunt quæ in fasciculum videntur constipari, sed neque teretem, cum ad modum instilæ planus sit, neque latum, cum vix una linea Bononiensi latiore viderim, neque demum, quod rei caput est, aliud quàm tendinis limbum reputandum, si ea qua nos indicavimus, ratione examinetur.

ANIMADVERSI O II.

Non immeritò veritus es, ne quæ de Omento ex Glissonio pa-
 riter adducis, ea nimis proluxa viderentur. Quotus enim
 quisque erit cui his temporibus non proluxa videantur cum primis
 pleraque eorum quæ de istis causis aut pinguedinis, aut figuræ
 Omenti per plures paginas differuntur? Profers deinde Malpighii
 de Omento Dissertationem „ aliquot etiam Notis superadditis „ ve-
 lut in Indice admones. Sed hæc nimirum duæ illæ ipsæ sunt quas ei-
 dem Dissertationi in Bibliotheca Anaromica addideras; in quarum
 alterâ Omenti nescio quod Fermentum in scænam producis, in pri-
 mâ autem Vasa Adiposa, & inter hæc atque Membranam Adiposam
 communicationem adductâ quadam observatione comprobare te,
 credis. Attamen in eum Malpighii locum nulla fortasse melior No-
 ta produci poterat quàm quod ipse interjecto ab ea edita Disserta-
 tione triginta annorum intervallo, in Posthumo Opere eo quo præ-
 stabat, candore falsus est. „ Vâlorum, inquit, seu ductuum adipo-
 rum existentiam non adhuc integrè asserere audeo, licet circa
 „ ipsâ exinde sollicitus plurimùm me exercuerim. „ Nec sanè
 ejusmodi Vasa videntur necessaria, quando quidquid iis potissimùm
 tribueretur, per vasa sanguifera explicari potest. Nam arteriarum
 communicationem cum cellulis adiposis in II. Adversariis, te non
 dissentiente, posuimus; cellularum autem ipsarum ibidem memora-
 tum cum venis commercium Malpighius hic satis indicat, dum te-
 statur, se & in ranis, & in aliis animantibus, compressis præcipuè
 striis adiposis trunco venæ portæ adnatis, manifestas olei guttulas
 unâ cum sanguine per eandem venam in hepatis cavum ferri vidisse.
 Cæterum ejusmodi observationes ut reditum pinguedinis com-
 probant tum generatim in venas, tum speciatim in venam portæ,
 sic firmant illum Omenti usum à Doctissimo Boerhaavio propositum,
 idest ut sanguinem pro bilis separatione ad hepar tendentem multis
 oleosis particulis opportunissimè augeat. Quo usu admisso, anim-
 adverto, Mesenterii usibus hunc quoque addi verisimiliter posse, vi-
 delicet ut sanguini per suas mesentericas venas ab intestinis ad he-
 par ascendenti multas in transitu ex iis quibus copiosè ornatur, adi-
 posas cellulis particulas oleosas ob eandem causam admisceat.

242

239
& seq.

245

243

De Vasa
Adiposa.Animadv.
6.

246.

De Omenti
Ufu.Institut.
Medic. n.
319. &
seq.Pinguedi-
nis Mesen-
terii Ufus.

ANIMADVERSI O III.

- 233 CUM inter initia hujus Libri „ ab imo ventre, secundum me-
 251 „ thodum Anatomicis familiarem ordiri te „ dixeris, eamque
 253 in duobus superioribus Capitibus servaveris; in hoc repente, & nul-
 lam quidem petendo veniam, ad Oesophagum, arque adeo ad Pha-
 ryngem transis; quasi verò & hæ Partes ut ventriculo continuantur,
 ita in imo ventre concluderentur: quod quando tibi facere placuit,
 cur & in Tabulis non fecisti? Sed his missis; quæ de memoratis Partibus ex Verheyenio producis, inspiciamus. Quod
 attinet ad carnem Oesophagi tunicam, scripserat is in prima Anatomies suæ editione „ ab egregiis Viris (scilicet Willisio atque Ste-
 „ none) egregiè sibi impositum esse, „ quòd illam in homine ex
 „ spiralibus fibris constare, docuissent, quæ ex longitudinalibus, &
 „ annularibus efficiatur. Porro in altera, ex qua hæc tu profers, editione,
 ut admonitus à me fuerat in Adversariis Prioribus, ita Stenonem ipse quidem omisit; fibras verò longitudinales, & annulares, & rationem cur in his decipi quis possit, jure meritoque retinuit. Quorum tu rerum securus, tum hic, tum infra quoties ille fibras annulares esse, dicit, toties „ veriùs, potiùsque Spirales „ esse, interjecta notula affirmas, sed verè, ut prædixisti, *levicula*. Nam si Verheyenius, ut ibidem fateris, „ accuratissimè „ de Oesophago scripsit; æquum sanè erat, ut alterum Anatomicum ipsi opponeres qui id in humano, de quo agitur, Oesophago, accurato pariter & cauto instituto examine, se observasse, testaretur; imò ne hoc quidem satis erat; sed ut inter eos dissentientes judicium ferres, te ipsum, animo à præjudicata opinione libero id observare, conveniebat. Hoc si fecisses, ut ex meis observationibus conjicio, mecum in hac parte Verheyenium laudares, & in aliis potiùs in quibus siles, reprehenderes. Nam ut de numero tunicarum Oesophagi non disputem, quem eodem fermè jure vel augere ad septenarium, vel, quod in intestinis fecit, contrahere ad ternarium potuisset; quid de Pharynge, ejusque musculis sentiam, ex II. Adversariis satis apparet. Mirumque inprimis est, non dico alios Anatomicos, & hos recentiores, sed ipsum olim M. Tullium nonnulla de anterioribus, & summis Pharyngis terminis scivisse quæ Verheyenius ignoraverit. In secundo enim libro de natura Deorum antequam attingeret quædam quæ hic in fine à Verheyenio dicuntur: Oesophagum videlicet, sive, ut ipse Tullius loquitur, Stomachum „ agitatione, & motibus linguæ cum depulsum, & quasi detrusum ci-
 „ bum

De Oesophagi tunicis.
 Gr. 3. C. 10.

252
 quæ. 16.

Animad. 14. & 18.
 De Pharynge.

253

„ bum accepit, depellere; ipsius autem partes eas quæ sunt infra
 „ id quod devoratur, dilatari, quæ autem supra, contrahi; „ ante
 hæc, inquam, illa scripserat: „ Linguam, ad radices ejus hærens,
 „ excipit Stomachus, quod primum illabuntur ea quæ accepta sunt.
 „ Oris utrâque ex parte tonsillas attingens, palato extremo, atque
 „ intimo terminatur. „ Hæc si Verheyenius alique perpendsent,
 non faciliè Uvulam à Pharynge discidissent. Quod reliquum est;
 de Oesophagi Glandulis hæc in brutis observavi. Interiores parvas
 quidem, sed creberrimas in gallinis, in ea etiam parte oesophagi
 quæ infra ingluviem est, vidi. Itemque in testudinis terrestris oesophago
 minutas conspexi, sed evidenter lenticulares, nonnullas præ-
 fertim quæ à coercita materia aliquantulum turgabant. In summo
 etiam vulvino oesophago parvulas vidi & subrotundas, quæ, expres-
 so contento humore, subsidebant: ut mittam latum crasumque an-
 nulum glandulosum, imum pharyngis orificium in cane circumple-
 gentem, de quo in Epistola etiam dixi de plerisque Uvulæ, & Pha-
 ryngis Musculis. Et hæc quidem omnes glandulæ interiorum oesopha-
 gi faciem observanti conspicuæ fuerunt. Eodemque, opinor, perti-
 nebant duo ovalia tubercula parvam nucem juglandem æquantia
 quæ intrâ infimum canini oesophagi tubum prominentia olim inve-
 ni, altero etiam ibidem hiante, foramine grandiusculo sic ut me-
 diocrem stylum admitteret. Hæc cum, me aliò avocato, Amicus
 dissecuisset, ex aggerie glandularum in eorum cavâ hiantium com-
 pacta fuisse, retulit. De istis autem quæ oesophago exterius affi-
 dent, Glandulis, quàm crebrò in canibus turgant, & à vermiculis
 quibusdam rubentibus, oblongis, & tenuibus incolantur, observa-
 tiones ostendunt Experientissimi Redii, & Virorum Cl. Danielis Cle-
 rici, & Joannis Fantoni. Igitur in glandulas sic affectas cum ego
 quoque sæpe inciderim, & foramina per quæ cum oesophagi tubo
 communicabant, ita facta animadverterim, ut omnibus conditioni-
 bus potius quàm viæ ab erodentibus vermiculis temerè apertæ, mea-
 tus ab iisdem dilatati interdum esse viderentur; haud longè ab eo
 absim ut cum Fantono, & Verheyenio existimem, has Glandulas
 additas esse ad magis lubricam efficiendam oesophagi viam, dum
 præsertim à durioribus & æquo grandioribus, ut in canibus sæpe
 contingit, deglutitis premuntur. Quoniam tamen, iis Glandulis
 secundum naturam se habentibus, nullos evidentes meatus in cane,
 multòque etiam minus in homine vidisse memini; venia mihi dabi-
 tur, ut opinor, si tecum interea, Mangere, non abnuentibus Do-
 ctissimis Actorum Lipsiensium Scriptoris, optabo, ut ejusmodi ca-
 naliculi, illique nominatim Thyroidæ Glandulæ, in cujus anatome

253.

De Glandulis Oesophagi.

De gl.
Anim.
Viv.
De Lum-
brico Lat.
C. 13.
Anatom.
Diff. 3.

supra 252.

253.

Supplem.
Tom. 6.
Sec. 6.

me

me aliquam, ut aliàs ostendi, operam posui, manifestius demonstrentur.

ANIMADVERSI O IV.

De Glandulis Ventriculi.
Anatom.
Diss. 3.

De Ventriculi, & Pylori primis stru-
ctura.

254

256

259

Quàm raræ sint observationes indubiarum atque evidentium Glandularum in tunica Ventriculi humani interiore, ex eo intelligitur quòd nonnulli glandulas in eadem tunica non admittunt. Quos ut convinceret Eruditissimus Fantonus observationes commemoravit duas in duarum mulierum ventriculo habitas à Wepsero unam, à Peyero alteram. His ego tertiam addam quam ante hos decem annos cum Doctissimis Amicis Veneris habui. Scilicet interiorèm superficiem virilis ventriculi prope antrum pylori ad digitos transversos plures confertissimis lenticularibus Glandulis obstitam vidimus, quarum multæ manifestum in centro excretorium osculum habebant. In altero etiam ventriculo humano ejusmodi Glandulas vidisse olim memini, sed neque elegantia, neque numero cum descriptis conferendas. Porro ad ordines carnearum ventriculi fibrarum quod attinet, etsi Willisius „ pro virili sua conari se, „ dicit, eam partem Anatomies hætenus serè intactam tractare; „ qui tamen Falloppii nostri Observationes Anatomicas legent, non illos tantum, sed & alia quæ supra à Willisio de Ventriculo traduntur, jam olim ad eundem prorsus modum tradita inveniunt. Illud verò non invenient quod Willisius infra docet: „ in ipso videlicet Pylori foramine intimam nervosam tunicam in molem oblongam, quæ instar Epistomii est, attolli. „ In mulieris quidem ventriculo haud procul ab eo foramine carunculam olim vidi oblongo petiolo internæ tunicæ inhaerentem, & huic extrinsecus concolorem, intrinsecus autem ex rubro albicantem, ut unam è mesenterii glandulis imitari videretur. Aliàsque item vidi ex ipso Pylori annulo laciniam quasi quandam dependentem. Et præterea in suisbus ut circum Pylori antrum peculiarem advolutum musculum, sic in ipso Pylori foramine duo crassa corpora cum iisdem Amicis vidisse memini quæ ingestis aut ante tempus egressuris, aut regressuris obstant. Sed in homine quod hoc munere fungatur nihil ibi constans & perpetuum est, nisi annulus ille (seu major sphincter) ex fibris carnis & assurgente in duplicaturam circumcirca tunica nervea constructus: quem à Willisio tum hic, tum in Figuris ornari, neque à te in subiecta aliqua Nota addi, mirum est. Quæ autem de Ruminantium ventriculis ex Glissonio adducis, ejusmodi sunt ut non satis sit Lectores ad Peyeri Merycologiam remanere, quòd „ ple-

„ nio-

„niorem „ ut dicis , historiam , & explicationem habeant. Etsi enim hæc Glissonii pauca sunt , magis tamen sunt falsa quam pauca . Nam neque pisces unico „ in universum „ ventriculo donantur ; neque animantes pleræque aliæ idèò unico donantur , quia unum os & podicem habent ; neque ruminantium oesophagus magis ad reticulum pertinet quam ad ventriculum primum ; neque omasum transversus , sed secundam longitudinem statuti pellibus stipatur ; ut alia omittam quæ præter hæc in his ipsis quæ affers ex Glissonio , Peyerus non jam supplet , ut manca , sed emendat ut falsa . Omittam pariter non pauca verba quæ ut superioribus Figurarum Verheyenii in Tab. LVI. Explicationibus , sic ultimæ de tuo clam admisces ; illudque unicè quæram , cur hujus ipsius Explicationis initio in quo Ventriculum cum Intestinis annexis „ in naturali suo situ „ in Figura 7. exhiberi , dicis , nihil addas quo verior fiat . Nam si in Figura 2. ut supra dixeras „ partes in proprio situ proponuntur ; „ vel ex sola Figuræ utriusque collatione constat , in hac 7. in naturali situ non exhiberi . Nec sanè ex instituto Naturæ ; ut cætera prætermittam ; aut intestinum Ileum ita in dextrum latus contractum est , aut processus vermiformis (qua de re postea dicam) ita sub Cæci fundo propendat . Monendi igitur Tirones fuerant , hic Intestina tantum ad situm naturalem accedere , quantum studium nonnulla , alioqui non ita bene apparitura , ostendendi passum est . Quæ verò in Explicationibus Tabulæ LVII. quarum primam non totam exhibuisti , notari possent , ea satis ex iis quæ supra de Oesophago , & Ventriculo diximus , intelliguntur .

ANIMADVERSI O V.

Tunicæ Intestinarum carneæ fibras interiores , Willisius docet , esse annulares . Tu verò id tibi „ arguendum „ esse , judicas propterea quia duo alii Doctissimi Viri esse spirales , tradidere . Verum enimverò ut hi duo à Willisio dissentiant ; sic cum eodem ; ut cæteros nunc omittam ; prorsus consentit Verheyenius , in hujusmodi præsertim observationibus diligentissimus , ut par omnino fuisset , te antequam Willisium argueres , rem ipsam , omni præjudicatâ opinione sepositâ , tuis oculis examinare , idque eò magis quoniam alter eorum à quorum stas partibus , non nisi in bobus & ovibus sic se observasse , confitetur ; à quorum structura , quamvis ita se haberet , quam periculose ad humanam transitus fieret , nimirum ostendunt ea quæ supra de Oesophago ex Verheyenio produxisti . Accedit , te ipsum denique agnoscere , duorum quos laudas „ neutrum satis af-

*De Tunica
Intestinarum
Carnea .*

263.

264

251

„ ser-

- 265 „ fectiorem suam demonstravisse. „ Dum verò addis, „ abunde
 „ id præstitisse „ Vallisnerium nostrum; rem affirmas quam non ego
 „ modò, sed Vallisnerius ipse negat. Non enim quia in Struthiocame-
 „ lo duplex Cæcum intestinum spirali extrinsecis ligamento, intrinse-
 „ cus autem valvula (quam ille tamen non dicit *de* ligamento ipsq
emitti) instructum descripsit; non, inquam, idcirco Vir Eruditissi-
 „ mus aut structuram hæcenus inauditam, aut verò ad id quò tu trahis,
 „ pertinentem se existimat proposuisse. Nam haud difficilem structu-
 „ ram jam ante observatam esse, non ignorat, etiam in pluribus aliis
 „ animalibus quæ disertè memoravit, & quibus ego tres præterea
 „ addo piscium species, & in his duas ad Canum genus pertinetes;
 „ ejusmodi spirali valvula, ut cum cum Amicis Venetis vidi, in tubo
 „ intestinali donatas. Jam verò fibras ex quibus eorum Cæcorum pa-
 „ rietes componuntur, ne memoravit quidem; &, ne multis, quam-
 „ vis illos ex carneis fibris spiraliibus constare, docuisset, non tamen
 „ inde aut ipse deduxit, aut deducere alios posse, credidit, sic esse
 „ demonstratum, in humanis intestinis spirales fibras esse admittendas;
 „ Quas ne in cæteris quidem ejusdem Avis intestinis agnoscit, quan-
 „ quam tu vel „ duplicitem ejusdem spiritalitatis demonstrari „ ab
 „ ipso, narres, in valvulis Coli, quarum „ extrema se invicem decuf-
 „ sare „ dicis, quando ille ea extrema nunquam contingere se invi-
 „ cem; valvulas autem, non ad spiræ modum, sed „ transversim „ dis-
 „ poni, affirmat. Non erat igitur cur Willisium argueres: qui si te
 „ arguere vicissim posset, fortasse quereretur quòd aliquot in locis,
 „ nulla ejus rei apposita nota, ipsius verba prætermiseris quibus subla-
 „ tis, Lectiores mirentur quid causæ sit quòd cum tot vasa, & ductus
 „ 266 ad intestina pertinentes enumeret, non nisi de sanguiferis dicat; vel
 „ quòd de Crassis intestinis tam pauca habeat, ut tu ipse qui Intestino-
 „ rum „ explicationem satis accuratam ex illo repeti commodè posse „
 „ 267 supra dixeris, hic repentè è contrario fatearis, ejus verbis „ non sa-
 „ 268 tis accurate describi Intestinatorum differentias, ac ex ipsis Crassa
 „ vix nomine tenus innoscere; „ eaque de causâ te alia ex Glis-
 „ sonio adducere. Ad quæ dum in subjecta Notula admones de Ileii
 „ Diverticulis, & de signorum discrimine, cum haud ipse intestini tu-
 „ bus, sed ea dumtaxat Diverticula intrâ herniæ sacculum coercentur;
 „ in memoriam revocas non ea modò quæ de istiusmodi Hernia jam ab
 „ anno 1700. in Commentariis Reg. Scient. Academiæ Parisiensis à
 „ Cl. Litrio proposita fuerant, sed id quoque quod nos anno 1705.
 „ in Bononiensi Academia disseruimus, videlicet posse illam Herniam
 „ contingere non tantum ab intercepta, & sensim deinde dilatata pa-
 „ rietis intestinalis particula, sed & ea ratione quam Cl. Ruyschius
 „ postea

De Ileii, &
 Reûs Di-
 verticulis,
 & Herniis
 in quibus
 Ileus interci-
 pinatur.

postea edidit. Jam enim videramus ista Diverticula, illudque inprimis quod tunc Academix descriptum dedimus eadem qua lleum, figurâ, & latitudine, & substantiâ, duos autem transversos digitos longum, & cum ejusdem intestini tubo paulò infra mesenterii limbum lato orificio communicans. Num verò ejusmodi Diverticula „ ut plurimum, si non semper, in Ileo occurrant „ alii viderint; mihi certè, & Verheyenio qui jam ante, unum delineaverat, & „ Processus Vermiformis extraordinarii „ nomine proposuerat, non ita sæpe observata sunt; neque item sæpe Riolanus videtur observasse, qui nonnunquam tria notasse se, dicit. Cæterum anno post, herniam vidimus ab intercepto non Diverticulo quidem, sed inferiore tantum pariete Ilei factam qui in semiovaalem cavitatem laxatus erat. Ea tamen hernia cum vomitu, & alui obstructione pertinaci ad mortem usque conjuncta fuerat. Sed de his aliâs. Illud tantum addo, non modò in Ileo, sed & in Recto intestino Diverticula me vidisse. Nam in cadavere mulieris quæ nullo unquam affectu ad eum locum pertinente laboraverat, in postico Recti pariete, tribus ferè digitis supra anum, cellulam vidi minoris fici magnitudine, ex eadem atque intestinum substantia, tunica interna lævissima, & orificio reliquæ cavitati fermè æquali cum ejusdem intestini tubo communicantem.

In Explicit.
Fig. 3.
Tab. 6.
Anthropogr. I. 2.
c. 14.

ANIMADVERSI O VI.

CUM plura in iis, aut ad ea quæ ex Glissonio, tanquam magis accurata, afferens, notari possint, ego quædam tantum attin- gam. Et primum quòd postremam Coli partem „ utrinque fundum „ vesicæ à posteriore parte amplecti, dicit, & postea sursum per „ inguen dextrum prope locum à quo primum ortum sumpserat, „ ascendere; hinc sinistrorsum recurrere, seque inter lleum, & spi- „ nam dorsali immergendo; ad supremam partem ossis sacri perti- „ nere, ibique se in Rectum exonerare; „ hæc omnia Glissonium videre interdum potuisse, agnosco; semper verò, aut plerumque ita habere se, nego. Scilicet ut nonnunquam istam Coli partem tot tantisque spiris convolutam vidi, ut vel alias regiones quas Glis- sonius non memoravit, attingeret; ita haud rarò observavi longè simplicius dispositam. Quod tamen non ita accipi velim quasi nega- rem, Colon priusquam in Rectum desinat, ad angulum inflecti. Ita enim ibi, & præterea in hypochondrio dextero inflecti, scio, ut mirer, cur plures Medici recentiores hypochondriacum illum dolorem cujus sedem vulgus in liene solet comminisci, ideo in pro-

De Coli flexione.
269.

ximo Colo esse, doceant, quòd hoc in sinistro hypochondrio inflexum, facìle propterea recrementa, aut flatus eo in loco moretur; nisi enim alia addantur, cùm inflexio Coli in duobus præterea locis contingat, non satis intelligitur quare is dolor sinistrum potissimum hypochondrium frequentissimè afficiat. Laudantur deinde à Glisfonio qui Colon „ in omnibus animalibus passim veluti in cellulas globosque subinde conformari „ dicunt, obliiti videlicet canum, aliorumque in quibus cellulis caret. Porro id quod dicit earum cellularum esse causam, num sit „ ligamentum, & huic quidem soli intestino proprium „ atque unum, in XIV. Animadversione videbimus. Jam enim & quædam ex multò pluribus quæ idem Glisfoni rectè scripsit, vicissim confirmemus. Nam primò quòd Pingues illas Appendiculas Crassis Intestinis tributas dicit, ut eundem quem Omentum, in lubricandis intestinis usum præbeant; siquis animadvertat, Omento anteriùs, Mesenterio autem posterius sic intestina intercepti, ut maxima tamen Crasorum pars inter illas duas pingues, lubricantesque Membras non excipiat, is facìle intelliget, ob eam causam quam assertit Glisfoni, illas Crassis Appendiculas additas esse. Sic enim nulla horum pars est quæ pinguedinem non habeat adstram, ex qua cum humore à Peritonæo secreto mixtura videlicet componatur illi analoga quæ pariter ex pinguedine & mucilagine inter musculos, ut Havers docuit, apparatur. Nam ut hæc mollibus servandis ad faciliorem motum musculis, ita illa lubricis servandis ad peristalticum motum intestinis conducit, quæ quidem in aperto sanorum animalium ventre si statim contremus, non modò humida, sed etiam uncta invenimus. His de rebus consuli Cowperus potest. Cùm autem Glisfoni doceat, esse „ quasdam in ano Valvulas semilunares „ & intrà hos totos XL. annos vix unus aut alter Anatomicus de iisdem Valvulis sermonem iniecerit; nos quid reapse de illis, & quid præterea observaverimus, eò diligentius adnotabimus, quò magis structura istiusmodi uti ibidem Naturam, animadverimus. Nam ut rara omittamus, ut puta in Recto intestino supra extremam ani oram unum vel alterum transversum digitum bis valvulam à nobis visam admodum extantem, semel in plebejo quodam in quo ad annuli imaginem facta erat, & membranea esse videbatur, iterum in fure de quo capitis supplicium sumptum est, in quo ex fasciculo fibrarum carnearum fiebat, & dimidiatum anulum repræsentabat; certè in viperis ad extremi intestini foramen interior tunica ita replicatur ut speciem valvulæ exhibeat, statum, etiam vi immisum, intrà intestinum coercentis, specillum autem non nisi lenta manu sensim demissum egredi, sinentis,

De Ufu
Pinguis
Appendiculas
Crassarum
Intestino-
rum.

Supra in
Theatro
top. &
seq.

Anat. of
hum. Bod-
ies.

271.
Ani Val-
vula, &
Circulus.

ris, ipsâ prius tunicâ in brevem tubulum in quem producitur, evolutâ, & extorsum protrusâ; ejus enim tubuli inferiori demum extremoque parieti ani foramen insculptum est. Sed ut hîs, aliisque animantibus dimissis, nunc humanam tantum structuram describam; infimum intestini Recti tubum intus ex omni parte columnæ quasi quædam cingunt secundum longitudinem ejus directæ, paulatimque angustiore ad summum fastigio extenuatæ. Hæ quanquam solent esse admodum conspicuæ, nonnunquam tamen minus prominent, certumque numerum minime servant; nam tres aliquando, aut quatuor, aliàs plures numerantur, & præterea minoribus aliis haud raro interpositis earum numerus adaugetur: Fiunt autem ex contracta nervæ intestini tunica, fibrisque insuper carneis instruuntur. Quas columnas etsi aliquis judicare posset ab oculo jam usque à primordiis ani sphinctere, sortitò ceu illas corrugationes fieri quæ sub clausi marispii orificio circumquaque excitantur; ego tamen aliter existimandum esse, censeo. Porro inter basim unius atque alterius columnæ, singulæ membranæ dispositæ sunt non absimili forma valvularum cordis semilunarium. Hæ contra intestini cavitatem conversæ obiectæque sunt, ut reverà adjuvare sphincterem videantur ne facili quidpiam, præsertim cum nimius aut humor ab intestinorum glandulis, aut aer ab reliquiis alimentorum redundat, invito homine elabatur. Non solum autem hæ Valvulæ aliàs plures, aliàs verò pauciores sunt, item majores, minoresve, propterea quod interstitiorum quæ inter columnas sunt, numerum, latitudinemque sequuntur; sed interdum quoque nullas esse, conringit. Cæterum quoties ego hæ Valvulas, inspexi, toties sanè in mentem venit quantum hæ negotii in tenebris exhibeant, dum aut acrium recrementorum ramenta, aut ascarides, aliudve tale inter se atque ultimas columnarum radices potissimum intercipiunt. Descendunt enim in iis angulis velut angusta quædam foramina, per quæ tenue specillum in breves exilesque ductus olim dimisi: horumque unus in vesiculam desinebat à media anteriore parte sphincterem inter atque intestinum delitescentem. Ex ea turbidum humorem expressi: quo etiam credidi eandem ob causam Naturam uti quam ob causam mollia clysmata in tenebris subduntur, ut si quid acre in illis Valvularum angustis resistit, id mitecat, & eluatur. Sed etsi Peyerus, alterque Anatomicus de iis ductibus ita loquuntur, ut credere quis possit, aut semper, aut sæpe observari; ego tamen in aliis quæ postea secui, cadaveribus, frustra ejusmodi meatus, & multò magis vesiculas perquisivi, si juvenem excipias in quo non absimiles ductus, & cellulam in medio à posteriore parte locatam comperi.

*De quibusdam Ani
Canaliculis, & Cellulis.*

*Exercit.
II. de
Gland.
Intest.*

ANIMADVERSI O VII.

272. *De Inest-
tinalium
Glandula-
rum Vici-
tibus.*
- A**D illa autem quæ ex eodem Peyero de Glandulis Intestinalium adducis, & speciatim quoddam ea ex parte qua Mesenterium cum Intestinis coheret, illarum Plexus non occurrant, illud dignum est adnotari quod neque Peyerum latuit, & nos sæpe in canibus mirati sumus. Scilicet cum Plexus ultimus, plerumque (nam & aliquando deesse, vidimus) sua amplitudine totam ferè postremi Ilei superficiem occupet; non sine admiratione animadvertimus, eam tantum parte intermittere quæ Mesenterio respondet. In eadem quoque animantium specie semel atque iterum observavimus, singulas ex quibus Plexus efficiuntur, Glandulas contrario prorsus ordine atque ipsos Plexus decrescere. Nam cum hi quod longius ab Ileo ad Duodenum reverteris, eò minores, ut Peyerus quoque scripsit, occurrant; contra illæ quod longius à Duodeno ad Ileum descendebam, eò minores fiebant, ut postremæ dimidio essent minores quam primæ: quod ideo magis notandum censui quoddam Peyerus, & Verheyenius de his Glandulis generatim loquentes, contrarium videntur indicare. In cuniculo horum Plexuum plures pro diametro intestinalium magnos vidi; in vulpe autem inter singulas Glandulas reticulare quoddam corpus intercedere, audivi, quod etsi Wepferus cujus hic verba adducuntur, omittit, non deesse tamen facile credo, cum vel in homine Harderus, microscopio adjutus, interpositas Glandulas lineas adnotaverit. Quoddam verò hic de Valvulis Conniventibus quædam interjicis, primum tibi videndum est, quomodo Verheyenio, & plerisque aliis satisfacias qui earum *inventorem* Kerckringium credere non possunt, cum præter rugas Intestinalium veteribus Anatomicis notas, alias in iis Conniventes Valvulas non agnoscant. Cæterum in earum rugarum causis hæc esse ponendas, crediderim; ut sic aucta Intestinalium superficie interiore, villi & reliqua propria ejusdem organa ter ferè quibusdam in locis multiplicarentur, utque certis in tractibus Intestinalium in quibus ob acclivem positum ascensus contentorum est difficilior, his additis quasi gradibus & fulcris proclivior redderetur. Non tamen propterea cæteros ipsarum usus inficior, & nominatim quoddam in tractibus Intestinalium declivibus præcipiènt contentorum lapsum morentur, cum in quibusdam quadrupedibus in quibus rugas vidi nullas, multò longissima intestina observasse meminerim. Sed ut tecum ad Peyeri Glandulas revertar; quoddam is fatetur, illas alteras quæ lenticulæ similes sunt, sive mavis Solitarias, non ita expeditum fuisse in quodam cadavere per-

spi-

273. *De Inest-
tinalium
Glandula-
rum Vici-
tibus.*

Certam.
Epit. cum
Muralto
Epit. a.
l. i. tr. 2.
c. 11.

273.
Vid. in
Exercit.
II. Peyeri
de Gland.
Intest.
De Valvulis
Intest.
norum
Conniven-
tibus.

275.
De Inest-
tinalium
Glandula-
rum Vici-
tibus.

Spicere; id, quemadmodum observavi, haud rarò contingit, non, ut opinor, quòd defint, sed quòd aut omni earum succo excreto, subsidant, aut in certis cadaveribus sint admodum exiguae; nam & in cæteris solent multùm ab ea distare quam sæpe in canibus assequi vidimus, lentis magnitudine. Sed haud rarò illæ quoque inconspicuae sunt quæ de eodem genere in Tenuibus Intestinis aliàs observantur. Non enim Crassis dumtaxat, ut Peyerus credere hic videtur, solitariae Glandulae obtigere; sed ut in saniissimo Juvene interempto vidimus, quales per proximum Colon, tales & per Ileum hic illic sparguntur, ferè milii magnitudine, figura, & colore, excretorio autem osculo ita parvo, ut ad primam saltèm inspectionem non occurrat. Id & in aliis pluribus cadaveribus vidi; interdumque accidit, ut per Ileum, & Jejunum creberrimas quidem, sed inaequali magnitudine, multas etiã ovali figurâ conspicerem; aliàs, ut inter minores ex quibus maximus ille & postremus Ilei Plexus componitur, majores hasce hic illic extantes viderem; semel, ut cùm idem Plexus desideraretur, itemque semel, ut cùm in Colo nullæ perspicui possent Glandulae, in Ileo tamen hæ ipse crebrae essent, & longè conspicuae. Quæ cùm ita sint, cùmque non aliis modò, sed & ipsi Peyero in altera quam de hac materia conscripsit, Exercitatione Solitariae Tenuium Intestinatorum Glandulae cognita fuerint; mirum est, te nihil de ipsis hic addere, & cùm ex priore Exercitatione tot verba adducas, ex secundâ nulla proferre.

ANIMADVERSI O VIII.

Super novis Intestini Duodeni Glandulis plurima tu quidem ex Ci. Brunnero exhibes; nos autem ob eam quæ postea indicabitur, causam perpauca adnotabimus. Etsi nos olim cuniculi Duodenum intùs peculiaribus Glandulis inaequale videramus, sensim quòd magis à ventriculo recederes, decrefcentibus; etsi etiã postea ex libro de Cicuta Aquatica noveramus, Wepserum in Duodeno Infanticidæ jam olim insignes Glandulas plurimas dispersas notasse, quæ detracta tunica fibrosâ apparuerint conglomeratæ, singulis dimidiati seminis cannabini figuram, & magnitudinem præ se ferentibus, & quæ aqua maceratæ etiã octavo post illatam mortem die mucum copiosè stillarint; nisi tamen Brunnerus, cujus auctoritas semper apud nos plurimum potuit, novum istum librum edidisset, rationemque earundem observandarum tradidisset; eas tot animantibus, cunctisque præfertim hominibus esse communes, fortasse adhuc ignoraremus. Nunc autem ipsius, quem illarum propterea Inventorem merito agnoscimus,

275.
& seq.
De Glandulis Duodeni.

c. 9.

mus, vestigiis insistentes, quanquam propofita ab eodem seu villosæ, seu fibrosæ tunicæ exacta leparatio non ita facilis est; atramentum (interdum etiam fervente aqua non adhibita) picta ab ipso corpuscula; nisi quoddam tot, ita magna, rotunda, conferta, & orificio instructa vidisse nondum videmur; satis & ipsi vidimus, & aliis ostendenda curavimus. Quoddam autem idem Brunnerus, ubi „villos intestinorum percolationis chyli organa” esse, adstruit, villos in ventriculo, crassisque intestinis esse, negat; molliendum id esse aliqua explicatione, cenfeo. Nam certè in suilli, itemque in canini, sed clariùs tamen in suilli ventriculi incisa hic illic interna tunica, inprimisque ad fundum arque ad pylorum confertissimas quasi lineas ab nervea basi ad perpendiculum ascendentes, affuso præsertim deterfque atramento cujus pars resistans in intervallis illas magis indicabat, me satis memini ostendisse. Hoc unum distinguendi magis quàm contradicendi causa in præclaro hoc Scripto observasse sufficiat. Jam enim valde aveo istam alteram Dissertationem inspicere cui multò plus hederæ suspendis, & quam in ea fermè unica quam Brunnero apponis, notula inculcas. Ubi enim Vir Experimentissimus superiora intestina ab inferioribus *insigni* ait *valvulâ* distinctari, tu continuo Lectores ad istam proximam Dissertationem remittis, cujus Auctor hanc nimirum „Observationem Novam, — seu novum hoc, & nuperrimum, inter alia plurima, inventum suum” proponit quoddam insignis illa „supposita hucusque intestinorum Valvula” nulla sit; sed ejus locum vicesque obrineat quidam musculus annularis. Ego verò, Mangere, etsi quod gravissimè quique Anatomici tandiu docuere, ac quod ipse sæpenumero & vidi, & contrectavi, non facile nullum esse, crediderim; tamen quando tu credere sic videris, Accuratissimum — & Egregium Anatomicum „Amicum hunc tuum pronunciando; age videamus, num paulò melius in hac quàm in ea quæ aliàs excusa est, de Aneurysmate Dissertatione, se gesserit.

276
De Valvula
Intestini
superiorum;
Brunneri Dis-
sertatione.

300.

Adversar.
II. Anim.
39. & seq.

ANIMADVERSIO IX.

301 **P**incipiò eos omnes qui Dissertationem hanc legent suo illo *Polypo dociliores* supponit, dum Anatomicos qui & Bauhini ætate, & ab illa ad hanc usque nostram vixere, omnes præ se uno delicatissimos fuisse homines, disertè pronunciat, ut cum foetorem fordesque intestinorum ferre non potuerint, mirum esse non debeat „si omnes, ut partis factique inspectioni non obligarentur, „lubenter. & protinus Bauhini subscripserint sententiæ, „ Quis tam

ram docilis sit, ut hæc credat, cum posteriorum Anatomicorum in Crassis etiam Intestinis Inventa neminem fugiant; imò quis adeò sit obliviosus, ut se ipsum refutare hunc Scriptorem, non advertat, quando paulò post, atque adeò in hac ipsa pagina „Pavium, Hildanum, Falcomburgium, & aliòs „ Bauhini Valvulam non invenisse, & illam propterea negasse, memorat. Et hic, Mangere, ille Censor est qui eas quæ nusquam sunt, *contradictiones* aliis objecit, cum haud sentiat ipse, conciliari inter se non posse quæ nunc retulimus, & quod supra inculcaverat: Bauhinum in ea re „ cunctos „ Anatomicos assecclas habuisse. „ Sed liceat ipsi secum pugnare, modò alios ita non impugnet ut Eximios Viros ceu præcipites, & læves traducat, velut hic supra cæteros omnes ipsum Bauhinum, quem super Ileï & Coli concursu „ impunè dixisse, ait, quod „ cumque sibi primò oberrarit in mentem, leviter nimirum dicendo „ quòd ibidem magna legitimi generis valvula assideret. „ Quantò aliter Pavius, qui etsi eam quam ex Bauhini descriptione & delineatione animo præceperat Valvulam oculis cernere non posset; in quibus tamen Epistolis hoc ad Hildanum scribebat, in iisdem „ Magnum, & Celeberrimam „ Bauhinum vocabat, & rationem ipsius inveniendæ enixè optans atque postulans; quòd non videret, non Bauhini, sed sui ipsius *defectum* existimabat. Ego verò etsi non omnia quæ scripsit pinxitque Bauhinus, defendo; facile tamen huic tanto Viro, & de re paucissimis tunc notâ, atque adeò sibi novâ scribenti condonandum esse, censeo, si omnia primò videre non potuit. Quod autem rei caput est, & quo nomine hic reprehenditur, quòd Valvulam videlicet ad finem Ileï docuerit esse præfixam, in ea re Bauhinum, vel potius verum non tueri non possum: cui vide, quæso, quibus argumentis vis afferatur. „ In vâ-
 „ riis, inquit, iliâcis, colicis, aliisque affectionibus & sæces remeant
 „ ex inferiori intestinali fistula in superiorem, ~ & injecta ad rectum
 „ clismata - usque ad fauces ascendunt, & intrusa interdum suppo-
 „ sitoria solidiora non minùs supernè rapiuntur, & usque per vomitu-
 „ tum rejiciuntur; ut ferunt per practicas observationes probatæ si-
 „ dei scriptores. Cum autem restituta in consequens ægrotis horum
 „ variis sanitate, nullæ ampliùs retroeant materiæ ex colo in ileon,
 „ sed - eandem recuperent, & teneant arctissimam ad ileon retro-
 „ cessionis resistantiam, ut de facto optimæ, & consuetæ in eisdem
 „ per intestina distributiones servantur; jam patet, nullam unquam
 „ fuisse ad ileon illius generis valvulam, quam aut depingunt, aut
 „ describunt; prout dato - strato hoc valvuloso transversaliter con-
 „ nexo, nec ex colo in ileon corpora præcipuè solida remeare po-
 „ tuil-

301.

Apud Hil-
dan. in
Centur.
Epist. 67.
69.

De Hicæ
Passim.

„ tuissent absque ejusdem laceratione , nec inde perforatâ valvulâ ,
 „ rursus – introitum ex colo in ileon ut antea prohiberi .” Hæc ,
 quæ alii ut objici , sic & refelli posse , viderunt , longum quidem
 examen deposcerent ; sed nos rem in pauca contrahemus . Et pri-
 mum animadvertendum est , eorum qui vomere stercus creduntur ;
 non dicam nullos cum Valeſco de Taranta , sed cum Riverio *varif-*
simos videri verum stercus , sive fæces ex Colo remeantes , evomere ,
 plerisque autem materiam potius stercori similem , corruptam nem-
 pe ac foetidam , qualem in iis quibus Ileum est intrâ hernias artifi-
 simè compressum , atque adeò prorsus oclusum , supra occlusionis
 locum observare consuevimus . Deinde illud est attendendum , eo-
 rum qui stercus vomunt , tam paucos ; si cum iis qui intereunt , con-
 ferantur ; servari , ut Mercurialis Municeps meus „ deterrimum omnium
 „ sententiâ Ilei gradum esse , docuerit , in quo stercora evomuntur ,
 „ ita ut neminem sit videre ex his servari qui stercora vomunt ;
 „ quem quidem locum ideo produco , ut appareat quàm rarum id vi-
 sum sit doctissimo , & exercitatissimo Medico ; non quòd ignorem ,
 multò verius Galenum scripsisse : „ vix unquam eorum aliquem sa-
 „ num evadere .” Nam illud denique non est omitendum , observa-
 tum esse apud Ballonium : multa symptomata comitari illos solita esse
 qui à *Fulvula* liberati sunt ; Sydenhamium autem attestari : hunc af-
 fectum „ præ omnibus aliis esse obnoxium recidivæ : „ quod cum
 aliorum , tum Foresti Observationes etiam indicant , de mulieribus
 illis duabus quæ sæpius intrâ tempus non ita longum scædo hoc mor-
 bo correptæ , eodemque demum confectæ sunt . Hæc verò omnia
 eò pertinent , ut intelligatur , neque ita facile esse , ut post hunc
 morbum „ optimæ , & consuetæ per intestina distributiones serven-
 „ tur , eademque recuperetur , & teneatur artissima ad ileon resi-
 „ stentia , ut nullæ ampliùs materiæ retroeant ; „ neque in plerisque
 in quibus id contingere videretur , certum esse , materierum ex Co-
 lo in Ileon regressum præcessisse . Cæterum neque hæc urgeo ,
 neque hic disputo , quot hallucinationes subesse interdum possint ,
 cum injecta clysmata vomitu reddi existimantur , quando his omni-
 bus minùs niti Censor videtur „ corporum præcipuè solidorum „ re-
 gressum urgens ; „ intrusâ enim interdum suppositoria solidiora non
 „ minùs supernè rapi , & usque per vomitum rejici , ex probatæ fi-
 „ dei Scriptoris „ supra dixerat . Quos utinam nominasset , ut
 constare posset , non id modò num probatæ sint fidei , verum etiam
 num ejusmodi ægrotantes perfectè convaluerint ; qua crassitie , qua
 duritie suppositoria fuerint , cum subdita , qua , cum vomitu reddita
 sunt , & alia præterea de hoc genere hic minimè omitienda . Ego
 certè

Philon.
Pharm. I.
4. c. 34.
Prax. Me-
dic. I. 10.
c. 2.

De curâd.
hum.
corp. Aff.
I. 3. c. 27.

De loc.
aff. I. 6. c. 2.

C661. I. a.
Obf. Med.
Sect. 1.
c. 4.
I. 31. Obf.
21. 22.

tertē ex recentioribus Medicis qui cautiore scilicet esse solent, qui talia viderit exempla, quantum nunc memini, legi neminem. Sed & inter veteres, quorum bene multos magis credulos fuisse, satis constat, duos. serē produci, vidi, Jo. Matthæum de Gradibus, & Antonium Guainerium, quorum tamen neuter affuisse se, scribit, cum suppositoria vomitu redderentur. Quinimo Guainerius diserte confitetur, nisi id sibi Magister suus enarrasset, „ vix fidem datum fuisse; „ neque tamen memorat quid ægro illi postea eveniret, & verba facere videtur de suppositorio „ quantitatem dactylorum nuclei non excedente, „ cum subditum est, & quod certe non nisi duobus post diebus vomitu rejectum fuit. Marcellus autem Donatus ut Mirabilis Historiæ scriptor non semper cautissimus fuerit; priusquam tamen Jo. Matthæi de Grado verba proferat; ipsa „ omnem fidem superare „ confitetur. Et reverā suppositorium validis filis quibus erat semori alligatum, quantum disruptis; sursum raptum esse; suppositorium „ incontinenti quasi; „ suppositorium „ intrā spatium temporis quo diceretur Pater noster cum Ave Maria, per intestina ascendisse ad stomachum, & parum incurvatum „ vomitu fuisse eductum, „ novi ego qui non ita facile sint credituri. Sed ego ut crederem; non tamen invenio an suppositoria hæc solidiora fuerint, & crassa; illud tantum lego „ satis acuta, & longa „ fuisse. At fuerint & solida, & crassa; Highmorus tamen responderi etiam posse, credidit, in hoc casu Valvulam muco fuisse oblitam & Colo quasi agglutinatam, ut sæpius observasse dicit Spigelium; qui revera non id observavit, sed idem existimavit: à qua sanè responsione non dissentit curatio tunc per iuscula emollientia absoluta; qualia & aliis qui stercus vomuerant, salutaria fuisse, narrat Forestus. Quam responsionem ideo commemoravi, ut constaret, non omnibus „ valvulæ lacerationem „ prorsus necessariam videri, iisque præsertim qui Valvulam quidem agnoscunt, sed certa tamen ratione dispositam; non enim omnes ejusdem generis Valvulam „ aut depingunt, aut describunt; „ sed ut ex dicendis intelligi poterit, multi sunt qui ejusmodi Valvulam ponunt, ut in his calibus cedere potius nonnunquam possit, quam abrumpi. Sed cedere, inquit, facile non potest: qua in re probanda auras diverberat; quis enim facile, dicat, cedere? Imò ita primum obstat, ut hinc Sydenhamius eum interdum dolorem deducat qui tunc „ uni „ parti instar terebelli infigitur. „ Cedit igitur & raro, & sero, & magna multaque vi jam adhibita, vel impedimento aliquo ad tempus interjecto, ut ritè occludi non possit; neque adeo necessario abrumpi debet, præsertim cum saluum sit: quæ Valvula non in fun-

C

do veri

In Tra. 7.
s. de Flu. c. 2.

l. 4. c. 3.

Cor. hum.
Disquis. 1.
1. P. 2. c. 5.

De hum.
Corp. fa. b.
l. 8. c. 9.

Obs. Med.
l. 21. Sch.
in Obs. 27.

30r.

Obs. Med.
sect. 1.
c. 4.

do veri Cæci, sed in laterali pariete Coli posita est, „ contra ejus „ Valvulæ faciem impetuosè contenta omnia vibrari. „ At rum-
petur aliquando . Dabo etiam, ut plurimum rumpi. Sed illud pro-
bandum est, in perpaucis iis qui sanantur, abruptam fuisse; eoque
probato, probandum etiam est, fieri nunquam posse ut rursus coa-
lescat, quando Intestinatorum quidem, & præsertim Crassorum, vul-
nera coaluisse interdum, constat; &, ne longior sim, hoc quoque
probato, probandum tamen restat, in rarissimis illis qui hic potissi-
mum & urgentur, & à me attenduntur, casibus trajecti supposito-
rii, rarissimam quoque aliquam, eorumque subjectorum peculiarem
structuram loco Valvulæ consuetæ, non fuisse.

ANIMADVERSIO X.

301. **N**unc alias non rationes, sed *evidentias* (sic enim vocat) at-
tendamus ad eandem Valvulam negandam . Anatomici, in-
quit, neque in numero, neque in figura & habitudine hujus Val-
vulæ describenda conveniunt; ergo „ nemo sat bene eandem vidit. „
Sed ut omitram, plerasque harum dissensionum ex dicendis concilia-
ri facile posse; cur, quæso, hoc potius non intulit: ergo non omnes
sat bene eandem viderunt? Nam si ex discordibus Partium descri-
ptionibus „ evidentiaæ fluere ad earundem denegandam existen-
tiam; „ perpaucissima jam essent in tota Anatome quæ negare non
deberemus . Et profectò neque Bartholinus, neque Blasius, neque
Diemerbroeckius, neque alii qui istas ipsas Anatomicorum dissensio-
nes commemorarunt, hanc propterea Valvulam negavere . „ Mit-
tit ad ejus præsentiam ulterius repudiandam, quòd varii non infi-
mæ notæ Professores eam prorsus negaverint . „ Sed ego hoc
non mitto, imò iis quos nominat, illum quoque recentem Anatomicum
addo quem Cl. Fantonus & memorat, & satis confutat; atque
ex te quæro, Mangete, cur igitur hæc Dissertatio: „ De Supposita
„ hucusque Intestinatorum Valvula Observatio Nova „ inscribatur; si
tot Anatomici hanc Valvulam non supposuerunt, sed negarunt?
Quamquam, ut verum fatear, de tribus quos nominat, Paviò, Hil-
dano, Falcomburgio, nescio quis eandem „ prorsus negaverit .
„ Nam Falcomburgium non vidi; Pavius, ut supra dictum est, cum
rationem ejus inveniendæ doceri se, cuperet, non prorsus negabat;
Hildani autem locum mihi indicari pervelim in quo neget; nam cer-
tè in Annotatione ad Obs. 61. Cent. I. disertè admittit; in ea autem
Epistola in qua dubitanti Pavio respondet, non admittit modò, sed
& pluries „ parvo cum negotio invenisse se „ dicit.

Anat. Di-
scer. 4.

Centur.
Epist. 88.

ANI-

ANIMADVERSIO XI.

AGe nunc videamus, num meliorem Anatomicum quàm Disputatorem se præstet; jam enim missis rationibus ad „ totum „ veritatis factum depromendum „ se confert. Principiò docet, quò magis Ileon ad Colon appropriat, eò densioribus fibris muscularibus investiri, idque faciliè animadverteri per spatium quatuor aut quinque digitorum transversorum à Colo. Id autem ego in quatuor quæ continenter dissecui, cadaveribus non modò faciliè, sed ullo modo videre non potui, etiamsi eà de causà Ileon præterea contra lumen attentè inspexerim. Addit: „ intrat indè ileon in colon ad angulum rectum, seu exactè ad ejus latus, illudque dexterum, quod „ ideo penetrat, & aperit. „ Hic verò errores sunt non ferendi. Ut enim mittam illum ingressum „ ad angulum rectum, „ quem ingressum ego observare ita soleo, ut potiùs supra angulus sit obversus, infra acutus; sic certè notum omnibus apertumque est, Ileon sinistram Coli parietem, non dextrum subire, ut incuria quadam id excidisse homini, libens crederem, nisi & in proxima pagina „ aper- „ turam ilei in colon – ad parietem lateralem dexterum „ rursus poneret, & in ipsà Figura in eodem pariete dextero delinearet, ac denique in hujus Explicatione idem affirmaret. Pergit: *Introitus Ilei notabiliter contrahitur multò infra diametrum, quem* (ne litterulam quidem muto) *per tractum suum longissimum totum aqualiter servaverat.* Quod attinet ad æqualem hanc totius Ilei diametrum, ne longius à postremo hoc tractu digitorum quatuor vel quinque recedam; in hoc ter quæsi, & toties variam deprehendi; nam semel minorem comperi præcedente, semel evidenter majorem, semel denique parem. Quod verò attinet ad ipsum Ilei finem, num sit tantò angustior quantò hic indicatur, & infra pronunciatur, videbimus postea. Nunc enim præstat quod rei caput in tota hac Dissertatione statuitur, id diligenter attendere. Igitur in hoc ipso Ilei extremo „ densus validusque musculus annularis esse dicitur, quem „ duplex fibrarum species robustarum valde &c. componat. „ Ego verò qui sæpiùs hanc Partem diligenter secui, fibras quidem carneas hic agnosco; peculiarem tamen istum Musculum non agnosco. Scilicet quâ Ileum attingit Colon, non ibi celsat, sed propriâ substantiâ cum substantiâ Coli connexâ, atque adeò connatâ intrâ Coli cavitatem producit, atque extat; ut omnes faciliè perspicient qui Ileum hic secundum longitudinem usque ad finem, productâ intrâ Colon sectione, dissecabunt; videbunt enim eam extantem intrâ Colon Ilei productionem ex propria utriusque intestini substantia, quæ

*De Ilei in
Colon In-
gressu.*

302

quod magis procedit, eò magis extenuatur, componi. haque fibræ carnez hic sunt quidem, sed utriusque intestini propriæ, non autem superadditi cujusdam Musculi peculiâres. Quæ cum ita sint, intelligis, opinor, Manete, quod abeat etiam ex hac parte „ novum „ illud nuperrimum Auctoris inventum „ peculiaris videlicet annuli musculosi, qui valvulæ locum vicisque obtineat, eòque magis quòd hunc ipsum annulum „ à pluribus perspectum „ jam esse, concedit. Sed, inquis, eum quidem annulum perspectum ab aliis esse, concedit; „ in propria autem sua functione, hoc est in sua actione occlusiva, seu valvulari, hucusque ab Anatomicis non perpensum „ esse, dicit. Nimirum igitur in ista contractione occlusiva totum hominis inventum consistit. Verum enimverò ne id quidem ipsius est. Nam primùm Riolanus „ circularem hanc valvulam „ ita exitum facibus præbere, scripsit, ut vicissim remigraturas „ clausa & contracta „ ita instar orbicularis sphincteris intercipiat. „ Tulpus deinde, ille Tulpus cujus „ scripta aberrant à vero „ dixit, hunc „ annulum „ animatum instar orificii ventriculi urgente necessitate se se vel aperire, vel claudere. „ Et denique, ut Highmore verba prætermittam, hanc Valvulam „ orbiculatam in modum sphincteris „ esse, tradentis; quis ignorat, Diemerbroeckium disertè docuisse: esse qui „ judicent, illic nullam esse veram valvulam, sed circumculum carnosum, intestino tenui crassum ingredienti circumjectum, idque instar musculi sphincteris contrahentem? „ Hoc erat igitur illud „ novum & nuperrimum inventum, hucusque ab Anatomicis non „ perpensum! „ Atque utinam id ut novum non est, ita saltem verum foret. Sed ut aliquid tribuamus fibræ carneis duorum intestinorum in unum junctis; tantum tribuere tamen non possumus, ut totam „ actionem occlusivam, seu valvularem „ ab ipsarum contractionibus „ unice dependere „ credamus; quando his contractionibus sublatis, ut in cadaveribus contingit, illa tamen occlusio ita viget, ut sive aqua, sive aer in Colon injiciatur, in Ileum transire non soleat, Coto etiam manibus compresso, ut vel olim Piccolhominus, Hildanus, Spigelius, alique (nam in re nota plures addere nihil attinet) experti sunt. Neque enim huic experimento explicando naturalis annuli angustia satis est, etiamsi tanta esset quanta hic dicitur, scilicet ut „ minor digitus in ejus aream introduci vix „ possit; „ ea autem est, ut ego, manu alioqui non parva, in jussu staturæ viro, cum sanissimus esset, intersecto, pollicem sine ul-
302. la vi immittere potuerim; in aliis autem quatuor vel quinque cadaveribus in quibus id experiri libuit, & in his in parva muliere, pollicis apicem facillimè indiderim.

ANI.

Ambro-
pogr. l. 2.
c. 14.

Obs. Med.
l. 3. c. 21.

Anatom.
l. 1. c. 2.

ANIMADVERSI O XII.

ESt ergo ibi omnino admittenda Valvula, præsertim cum ira occurrat manifesta, ut negatam esse, mirer, neque minus mirer, in tunica interna intestinali „ ad annuli crepidinem „ vi digitis trahendo, esse quæsitam, & tot atque adeò talibus verbis impugnata, ut „ videri facta dicatur, ut veter transum corporum ab ileo „ in colon: „ quod etsi ita abnorme est; „ luce tamen clariùs observari „ dicitur. Quænam igitur Valvula est? Res nempe ab iis omnibus qui Valvulam negarunt, maximè perspecta, & inculcata; sed non agnita. Quod quidem ex eo ipso Bartholini folio quod hic citatur, intelligi omnino debebat. „ Valvulam, inquit, non invenierunt, sed potiùs annulum, sive circulum, prominente limbo „ extantem. — At circulus iste præter valvulam nihil est. „ Sed Bauhinus, inquit, non sic descripsit. Inspiciant mihi ejus Theatrum Anatomicum secundò editum, & quo propterea standum est. Videbunt, hanc Valvulam ut „ crassam, orbicularem, & circum „ rem „ non modò à Fabricio ab Aquapendente, ab Riolano, ab Highmore, à Bartholino, ab aliis, sed ab ipso etiam Bauhino esse propositam. At quam, inquit, ratione annulus Valvulæ officio fungi potest? Jam dictum est supra, hunc annulum, idest hanc extremi Ilei productionem intrà Coli cavitatem prominere: quod & in hac Dissertatione agnoscitur, atque adeò hujus prominentiæ „ altitudo esse dicitur transversè digiti ordinarii; „ quanquam ego in plerisque cadaveribus transversè pollicis, imò & aliquantò majorem invenerim. Cum igitur sic promineat, proclive est, intelligere, quomodo materia quæ aut à veri Cæci fundo sursum, ut par est, eat, aut fortè etiam deorsum relabatur, dum vi præsertim qua abdomen ad deiciendum contrahitur, compulsa, aut proprio pondere retracta, in ejus productionis inferiorem, aut superiorem partem incurrit, eandem productionem, quæ nihil demique nisi molle intestinum est, reclinet, & claudat, ut Varolii verbis utar hujus Valvulæ Observatoris faciliè primi, qui propterea eandem *Ilei operculum* sanè „ apposuit, & haud inconcinne „ ut Riolanus, & Tulpus censuerunt, appellavit. Rectèque etiam idem spectantes Highmorus, & Diemerbroeckius hanc Valvulam in structuræ modo, usque ratione compararunt ille quidem „ cum nassis ex viminibus textis, quæ „ faciliè ingressuros admittunt pisces, nullos verò egredi, permittunt; „ hic verò cum longis tubulis ex corio laxo confectis, qui à navium lateribus ita propendent, ut per eos „ aqua desuper in „ naves

De Valvula Bauhini.

Anatom. quart. renov. l. 1. c. 10.

l. 1. c. 17.

302.

Anatom. l. 3. c. 3.

Cor. hum. Disquis. l. 1. p. 1. c. 5. Anatom. l. 1. c. 8.

301. „ naves incidens, facile effluat, sed à fluctibus extrinsecis in tubulos
 „ impingens, quia hi mox plicantur, non ingreditur. „ Hac ergo
 „ ratione Tulpii verba accipiendo, intelligemus, non reprehenden-
 „ dum ipsum fuisse quoddam hanc Valvulam dixerit, „ ante Ilei egres-
 „ sum pendere instar cortinæ, vel veli alicujus laxioris. „ Nam Pa-
 „ bricius quoque ab Aquapendente optimus, si quis alius, harum rerum
 „ existimatur, cum hanc Ilei productionem Valvulæ, sive ut ipse
 „ loquebatur „ ostioli usum præbere „ agnovisset; id præstare docuit,
 „ quatenus „ laxissima, & pendula concidat, & ita foramen obturet. „
 „ Eò autem facilius hoc præstet, quoddam „ apertura ilei in colon, „ etsi
 „ immisso digito in anulum possit conformari, per se tamen, & na-
 „ turaliter nequaquam patet in modum annuli; sed, ut nos in omni-
 „ bus hucusque dissectis cadaveribus, sectione etiam in Colo à pro-
 „ pria sede non dimoto instituta, observavimus, se habet instar „ stri-
 „ gæ cujusdam transversæ, „ ut loquitur Highmorus, sive ut cla-
 „ ritis tradidit Diemberbroeckius, instar „ recti foraminis ab uno ad al-
 „ terum latus quasi cultello incisi, — concidentibus utriusque apertu-
 „ ra labiis; „ ut sic inspecta „ constare ex duabus membranarum sibi
 „ „ invicem oppositis „ ut nonnulli docuerunt, videatur.

De Inte-
sticis.

locis cit.

ANIMADVERSIO XIII.

A Ccedunt duo Corpora à quibus & descriptam hanc Valvulæ
 „ concidentiam in rimæ horizontalis modum, & valvulam ipsam
 „ in sua sede servari, existimo; quapropter illa *Valvula* hujus *Retina-*
 „ *cula*, sive *Frena* appellare consuevi. Hæc etsi ita sint conspicua, ut
 „ aperto, ex adverso Valvulæ, intestino Colo, statim sua magnitudi-
 „ ne in oculos incurrant; eorum tamen descriptionem frustra adhuc
 „ apud Anatomicos perquisivi; quam propterea hic addam. Itaque
 „ oblongæ duæ quasi rugæ singulæ ab singulis descriptæ horizontalis
 „ rimæ extremis & ipsæ horizontales intrà Colon assurgunt, ita ma-
 „ gnæ ut quæ Valvulam contingunt, ipsius æquent altitudinem; quæ
 „ deinceps, ut & crassities, eò magis decrescit, quò magis à Valvu-
 „ la receditur, ut novissimè extenuatæ prorsus deficiant, relicto inter
 „ utriusque extremum intervallo duorum ferè digitorum. Sunt autem
 „ à cæteris quæ intrà Colon, præsertim quæ id contrahitur in cellu-
 „ las, prominent, rugis omnino distinguendæ, non modò ob suam
 „ istam singularem magnitudinem, & constitutionem, verum etiam
 „ quia sublati Coli Ligamenti, arque adeò etiam manibus distrahen-
 „ do, non facile magna ex parte oblitterantur. Quinimo non modò,
 „ extrinsecus inquirendo, præter vasa sanguifera, & adipem tenuis
 „ qui.

Duo cunctæ
Valvula
frena.

quidam fasciculus tendinosus secundum illarum ductum toti ipsarum tractui subesse visus est; sed intrinsecus inspicendo, singulas plerumque vidi quâ rimæ extrema attingunt, evidenter bifurcas fieri, & sic in utrumque rimæ marginem produci; cultroque adhibito, comperi, fibras quibus intus constant, carneas secundum earum longitudinem positas, ad Valvulam protendi, & cum hujus fibris carneis commisceri. Ex quibus licet intelligere, etsi duæ hæ rugæ non sine intestinalium tunicarum replicatione fiunt, ut cæteræ; peculiarior tamen supra cæteras præstare posse, quatenus non modò ut magis extantes, magis fulcire, & promovere ascendentes materias queunt, verum etiam ut hinc cum parietibus Coli, hinc cum Valvula ea qua docui, ratione commissæ, hanc in sede firmare sua, & diductam ab extrusis ex Illeo materiis rimam continuò possunt ad priorem angustiam reducere: quod eò mihi verisimilius videtur, quò sæpius expertus sum, his Frenis utrinque pariter tractis, rimam antea diductam constringi. Et hæc quidem corpora in cunctis cadaveribus observavi. Duas autem illas „exiles membranulas, per „ quas Valvulam alligare Illeo „ docuit Tulpus, necnon „ ovalem „ nescio quem glomum, annulo subjacentem tanquam pulvinar, „ quem Dissertationis Auctor describit, etsi in octo continenter dissectis cadaveribus qua summa potui diligentia, oculis, digitis, cultro quæsi; tamen non ipsa modò, sed quidquam quod ipsorum simile esset, videre non potui. Quòd autem glomus iste ovalis istic dicitur esse aptus „ ad firmiter, propriisq; limitibus superpositum su- „ stinendum Ilei orificium; „ jam satis huic rei & per descripta duo Retinacula, & per Ilei substantiam cum substantia Coli ita ut diximus, connatam Natura consuluit; ut non ita *facile*, quemadmodum iste opinatur „ per levem quæcunque duorum istorum „ intestinorum commotionem, & flexuras mutari possit. „ Itaque supersedere poterat labore huc trahendi illas quoque multiplices Coli intestini colligationes quæ jam à pluribus Anatomicis non modò satis explicatæ, sed cautius etiam descriptæ sunt. Quid enim est quod iste dicit: „ Colon immobiliter sedibus quaquaversum suis „ detineri adeò ut nullimodè à situ, & positione sua ne per latum „ unguem dimoveri possit: — situm ubique suum constanter retinere: „ à quacunque positione sua difficillimè commoveri: „ & quæ sunt ejusmodi? Num ille etiam Coli postremus tractus quem Riolanus dixit, „ omni vinculo solutum errabundo ductu vagari, „ num ille etiam ne per latum quidem unguem à situ dimoveri suo nullo modo potest? At nos certè haud rarò vidimus vel ob solam flatuum copiam quæ verum Cæcum, & pars Coli proxima distenta, interjecta intestina urge-

Obl. Med.

l. 3. c. 21.

303.

302.

Anthro-

pogr. l. 2.

c. 14.

urgebant, ita illum omnem tractum ad sinistram os ilium compulsum, ut continuati etiam Recti magna pars jam non recta esset, sed eidem pelvis lateri sic appressa, ut quare clysmata, vexante flatuum copia, sæpe nequeant admitti, inde esset manifestum.

- 303 Quid præterea est quod addit: „Colon trajici, & assidere perenni-
 „ter ante annulos musculorum abdominis, unde ad scrotum peri-
 „tonæi elongationes procedunt; — è converso ileon ab hisce locis
 „longè dislitum esse? „Suntne hæc ex suis illis „plurimis inventa
 „nova, & nuperrima? „an potius errores qui ne Tironi quidem
 in re anatomica exciderent? Atamen quali re præclare absolu-
 „tâ, magnificè hic quoque concluditur: „Hæc anatomica est con-
 „scriptio ilei descriptio: „quæ quidem talis sit, necne, omnes fa-
 cile cognoscent qui cum ipsa has nostras Animadversiones, & cum
 Anatome utraque contulerint.

ANIMADVERSIO XIV.

POST hæc nimis longum esset, ac minimè necessarium quæ de usu
 descriptarum Partium addit, excutere, & indicare quot iterum
 talia inculcet, aut qualia & quomodo quæsit, ut loquitur, *eluat*,
 non trita modò, sed & falsa miscendo, ut cum materias per tenuia
 303. intestinalia delabentes „nullum cursibus suis reperire obstaculum „di-
 cit, obliuio videlicet tot & rugarum, & flexionum quæ in iis inte-
 stinis à Natura obijciuntur, ne „tam libera celerque via „sit, quàm
 ipse putat, „chimosæ substantiæ. „Sed quoniam, ut ipse in cal-
 ce Dissertationis confitetur, „infelix hic modus est suus, pro pau-
 „lulo inchoare, nec nisi ad exuberans desinere; „hisce omnibus
 non contentus, tribus aliis vix, ac ne vix quidem ad argumentum
 istud suum attinentibus se immiscet quæstionibus, ideòque & nos co-
 git quid in his, ac quomodo sentiat, considerare. In prima ergo
 304. quæstione, „si, inquit, de usibus inquireret appendicis vermifor-
 mis, pendulæ à fundo cæci; pigeret communiorem, & vulga-
 tum annuere. „Cæterum „magis genuinum, & palpabilem „
 304. aliàs se allaturum, promittit. Pollicitus etiam fuerat in quadam sua
 præliminari Exercitatione „plurima hucusque invisâ „circa inser-
 tionem tenuis intestini in crassum; hæc autem quò reciderint, jam
 vidimus. Si ex verbis quæ modò ipsi exciderunt, conjecturam fa-
 cere licet; de isto *palpabili* usu meliora expectanda non videntur.
 Quæ ne sine causa dixisse credamur, sic habendum est: cum omnium
 Appendicæ Vermiformis qui adhuc allati sunt, usum præcipui ad
 duo omnino capita contrahi possint: eam videlicet factam esse vel
 ut quædam excipiat, vel ut quædam præbeat; nobis quidem non
 videri

304.
 De Usa
 Appendi-
 cæ Ver-
 miformis.

videri factam ut quidquam excipiat, non modò quia angusta est, & non facìle dilatabilis, sed etiam, & præsertim quia interdum atque adeò nuper de quatuor hominibus qui dum viverent, nihil vitii in functionibus intestinorum ostenderant, in duobus quidem Appendiculæ orificium insigni quadam ruga in palpebræ superioris modum facta, & disposita ita obductum invenimus, ut nihil omnino sive flatus, sive eò delabentis materiæ subire Appendiculam posset; in duobus autem reliquis cum Cæcum, & proxima Coli pars plurimo flatu distenta essent, nihil quidquam hujus in flaccida & contracta, ut solet, Appendicula observavimus. Non ignoro, imò fateor, in scœtu, atque adeò in adultis nonnunquam ea intrà Appendiculam inveniri quæ ex Cæco necessario provenerint; sed hoc contendo, si id Natura potissimum, & in adultis spectasset, non ita facìle, ac sine noxa qualia modò attulimus, observari oportere. Quò etiam pertinere censéo Observationem Cl. Zambecarii, qui cum Appendiculæ portionem injecta ligatura catello abscidisset, tribus jam exactis mensibus & hanc solutam, & illius fundum omnino apertum vidit, neque tamen ullas fæces in ventris caveam ex illo decidisse, compèxit. Verùm hic longius ab nostra specie non abeamus. Relinquitur ergo, ut siquid Appendicula adultis hominibus præstat, non quidquam excipiendo, sed præbendo potius, præstare videatur: quod & ipsius positus quodammodo indicat, à nostro Censore ignoratus. Non enim, ut ipse dicit, „ à fundo cæci pendula est: „ qua ratione excipiendo facta videretur; sed ita est à superiore parte ad Cæcum inclinata, ut aliquid in ipsum videatur demittere. Quod, & alia præterea, ab eo qui genuinum hujus Particulæ usum tenere se, credat, minimè ignoranda ut patescant; perpaucas hic de eadem, & de eo cum quo communicat, intestino adjiciemus. Cæci igitur intestini magnitudo ea est, ut non facìle determinari possit, non tantum quia alia aliis naturà obtingit; sed etiam quia non secus ac ventriculi, aliorumque intestinorum amplitudo, pro variâ nuper contentorum copiâ producta, aut contracta reperitur. Quòd ergo illud intestinum in hac Dissertatione dicitur „ ultra angulum coitus, „ hoc est infra Valvulam „ per 3. aut 4. digitos transversos inferius pro- pendere „ etsi id in multis verum est; in aliis tamen & minus, & perexiguum invenitur. Quod autem ad locum attinet in quo Appendicula intrà ipsum hiât; de cadaveribus decem in quibus id diligentius observavimus, cum duo Appendiculæ orificium in fundo Cæci, imò in ipsius fundi centro haberent, octo reliqua non in fundo, sed in sinistro Cæci pariete, fundum inter & Valvulam, pleræque aliquantò anteriùs, unum certè aliquantò posteriùs habuere. In

*De eadem
Appendi-
culâ, &
Cæco.*

304

D

nullo

nullo autem eorum cadaverum, aut certe in nullo (nam de his firmitis id memorie mandavi) tex eorum quæ novissimè secui , Appendiculam aut à fundo Cæci, aut à Cæco pendulam vidi, sed contra superioribus ita connexam partibus , ut dum in sede sua esset, nihil subire ipsam nisi ascendendo, nihil ex ipsa egredi nisi descendendo posset. Neque solum obliquè sursum porrectam vidi, sed in duobus ad perpendicularum elevaram, cum unius Colo secundum huius longitudinem sine ulla curvatura sic satis arctè alligaretur, alterius autem ipsi Cæco eà in rerum constitutione quæ hic est minimè prætermittenda. Nam in illa ipsa muliere cujus rarum Ancuryfina in

Animadv. 39. Adversariis II. memoravi, ea Coli pars quæ in latere ventris dextro sedem habet, non in rectum, ut solet, tubum extendebatur, sed ita erat inflexa, ut Cæci intestini fundum, sursum conversum, eam alteram Coli partem attingeret quæ sub hepate transversum ducitur. Erant autem hæc omnia intus forisque sic constituta, ut neque mihi, neque cæteris qui aderant, dubitandum videretur, quin ita se res à primordiis habuissent; & nihil tamen noxæ quod percontando scire potuerimus, in harum Partium functionibus mulier, dum viveret, perpessa erat. Quod ut est ab illis qui earundem usus genuinos velint cognoscere, attendendum; ita ab iis ipsis sciendum est, Appendiculam tamen Vermiformem, quæ si proximæ, ut solet, Coli parti connexa fuisset, deorsum pendula hic fuisset, superiori hic Cæco rectè secundum totam sui longitudinem fuisse alligatam, ut in tanta rerum inversione, ejus unius consuetus situs non inverteretur. Cæterum Appendicula sic, ut diximus, colligari atque suspendi per pingues membranas solet, quas esse portiones non Mesocoli tantum, sed etiam Mesaræi, quod postquam ultimum Ileum fulserat, in contiguam quoque Coli partem extendebatur, interdum notavi. Sed aliæ etiam sunt Appendiculæ connexiones iis qui illius usum inquirent, magis fortasse attendendæ: quæ ut penitus intelligantur, operæ pretium est rem aliquantò altius repetere. Igitur fasciolaræ duæ quarum alteram antè, alteram postè Ligamentum Coli vocamus, non sunt illæ quidem vera Ligamenta, sed fasciculi sunt carnearum fibrarum qui cum ab illis usque carneis fibris propagentur quæ pariter secundum longitudinem dispositæ extrinsecus Rectum intestinum obducunt, suis contractionibus opitulari posse videntur ad recrementa alvi ex Coli cellulis Rectum versis compellenda, ut probè à Cowpero etiam indicatum est: quod fortasse diu ante ipsum Eustachius noverat, qui hæc omnia in Tabula tibi II. Fig. 3. 5. & 6. delineavit. Duos igitur istos fasciculos in Recto quidem intestino principium habere, satis constat; finem verò ubi habeant, non

Ligamenta,
ut vocantur,
illæ, &
verè sunt
et intestini.

Anatom.
of hum.
Bodies.

non æquè omnibus est manifestum. Habent autem non in Colo, non in Cæco, sed in ipsa Appendicula Vermiformi ita ut quando hæc non à Cæci fundo, sed à pariete hujus sinistro originem habet, quod quidem multò crebrius à me visum esse, supra docui, ambo illi fasciculi, ut in octo cadaveribus observavi, sic ad Appendiculæ initium inclinentur, & tendant, ut reliqua inferior Cæci pars, his Ligamenti prorsus carens, à dextris turgeat, atque propendeat. Hunc horum Ligamentorum terminum cum jam observassem, animadverti, Riolanum certè ante me vidisse, cum Appendiculam ex coaliis horum duorum Ligamentorum contextam esse, dicat, & esse „ veluti nodosum coitum eorundem, „ & ex parte etiam Bartholinum, ut qui antè Ligamentum „ à cæco (id est ab Appendiculi Vermiformi) ortum, ad rectum terminari, „ scribit. Sed eorum neuter, neque alius præterea; quod legerim; id quod addam, observavit: Nam cum apud Cl. Fantonum legissem: præter illa duo Ligamenta interjectum his Mesocolon & ipsum secundum Coli longitudinem alligatum, huic „ tertii vinculi officium quodam „ modo præstare, „ sectionem aggressus, comperi, non tam ipsum Mesocolon, quam obductum hujus pinguedine, & propterea hætenus ignotum, Laterale tertium Ligamentum revera adesse, quod Colo tum id officii, tum quod supra diximus, præstaret. Scilicet fasciolam vidi, nisi quod angustior erat, prioribus similem, pariter ex fibris carneis parallelis, & secundum Coli longitudinem dispositis compactam, pariterque ex iis Recti fibris productam: quam (ne quis fortè suspicetur, nihil aliud nisi connexi Mesocoli reliquias esse) frustra in tenuibus intestinis quæ Mesarzo connectuntur, perquisivi. Quod quoniam Ligamentum illud idem esse, non dubito quod Cl. Valsalvam in Academia Bononiensi jam proposuisse, inaudivi; idcirco ejus ulteriorem descriptionem Experientissimo Inventori relinquam, & illud unice quod à me de superiore ejus termino observatum est, addam. Nimirum hoc Ligamentum ubi ad eum pervenit locum quo se Colo Ileon immittit, utriusque confinia à tergo complexum, ad Appendiculæ principium inter duo reliqua Ligamenta, quemadmodum pluries observavi, descendit. Quâ digitis tractâ cum Ligamenta trahantur; credibile est, ipsorum vicissim contractionibus Appendiculam succuri, & sic facilius quidquid illud est quod ab eadem in Cæcum demitti verisimile est, exprimi. Nam quid illud demum sit, eò difficilius, ac longius esset statuere, quò magis constat, non eadem ratione constitutam Appendiculam in cunctis animalibus inveniri, atque adeò non modò in nonnullis brutorum speciebus, sed & quandoque in hominibus desiderari: quod à pluribus scriptum, &

Anthropogr. l. 2. c. 14.

Anatom. quart. re-nov. l. 1. c. 10.

Anatom. Dilect. 4.

Ligamentum Coli Tertium, sive Laterale.

à Cl. etiam Santorino, dum nos Venetiis essemus, in repente mortuo Sartore observatum esse, meminimus.

ANIMADVERSIO XV.

304
De Officium
Tubæ di-
dicatione in
Tubæ.
Hanc igitur „omni quidem jure declarasse Antiquos, perperam au-
tem negavisse Modernos, „pronunciat. Hic primum quæro, Guil-
lielmus Harveus, Isbrandus Diemerbroeckius, Daniel Ludovici,
aliique ejuscemodi *Antiqui* fuerint, an *Moderni*? Hi tamen id non
modò non negarunt, sed & propriis observationibus confirmarunt.
Deinde quæro, Andreas Laurentius, Joannes Valverus, Archangelus
Piccolhominus, Ludovicus Mercatus, aliique tales *Moderni*
fuerint, an *Antiqui*? Hi tamen ossa pubis in partu diduci, negabant,
primumque adeò multis propriis observationibus sententiam confirma-
vit suam. Quid ergo dicendum est? Primum quidem neutra sen-
tentia aut Veterum, aut Recentiorum propria censenda est, cum in
hac re, ut verissimè Blasius affirmat „variè omni ævo Anatomici
„fenseriat. „Deinde non ob unam diductorum ossium observatio-
nem, qua & nos alioqui non caremus, continuò, absoluteque re-
prehendendi ita sunt qui negarunt. Media potius via, quâ cautissi-
mi Viri Spigelius, Sennertus, Veslingius, aliique Veterum, & Wa-
læus, Bartholinus, Blasius, Verheyenius, ac versatissimus in arte
obstetricandi Deventrius, aliique Recentiorum incesere, tenenda est
sic, ut aliàs, & præsertim in partu difficiliore, id contingere, aliàs
verò non idem prorsus accidere, existimemus. Cæterum cum id
evenit, „sensum per cursum gravidationis disponi, non solo maturi
„partus momento produci, „alii, & nominatim Pinæus, jam cre-
diderant; ut hinc appareat quid existimandum sit tum de ejus qui
scribit, tum de quinquaginta eorum Auditorum eruditione, quorum
„plaudentibus cunctorum votis „id se judicasse, homo minimè ma-
gnificus narrat. Restaret ultima Quæstio de vesiculis videlicet ute-
rinæ cervicis, sintne similes à me descriptis, ac delineatis, & sintne
„à prima genesi positiæ. „Sed quoniam hac de re fusius loquitur in
suis illis Animadversionibus quas in me, non jam ut *amicissimum*,
sed magnificum, si Diis placet, hominem, & quæ sunt aliæ ipsius
ineptiæ, te, Mangere, edente, conscripsit; idcirco cum cò perve-
nero, hunc quoque locum examinabo.

V. apud
Laurent.
loc. cit. &
Pinæum
ipsum de
Virgin.
not. &c.
l. a. c. 5.

ANIMADVERSI O XVI.

Nunc ut in antecessum intelligere omnes queant, decuisse hunc hominem magis in Figuris propriis emendandis, quàm in alienis carpendis desudare, hanc Dissertationi adjectam ejus Figuram, hujusque Explicationem inspiciamus. Et primum Ileon „ horizonta-
 „ liter ad Colon excurrere, „ rursus nego. Deinde „ intimas
 „ ejusdem plicas, quæ hic aliquantulum apparere „ dicuntur, vel magis quàm opus sit, apparere, affirmo; nam hic aliquando nullas, sæpius ferè nullas vidimus, certè ita confertas neque ego, neque Glissonius videre consuevimus. Dicit hic aliquis: at in eo cadavere ex quo hæc est Figura deformata, sic esse potuerunt. Fateor; sed hujus sibi excusationis effugium Censor ademit in iis quas in Figuris nostras scripsit, Animadversionibus: quod cum in ipsis Lector cognoscet, tum ne id sæpius sit à nobis inculcandum, satis sit hic semel indicasse. Densiore verò istum Ilei „ muscularem apparat; tum „ non modò rursus nego, sed insuper addo, discretos illos crassosque quos pingit, circellos per Ilei superficiem non tantum non apparere, sed eam inspectantibus, longè magis fibras longitudinales, quàm annulares esse conspicuas. Sed hæc levis ferenda sunt; illa, ut supra etiam innuimus, graviora, quòd „ introitus Ilei in Colon li parietem dexterum esse, „ & pictura, & verbis tradatur, quem omnibus luce meridiana clarius sit esse in sinistram: & quòd ille idem introitus sic effingatur, ut quicumque verum viderit, ab hoc alienissimum esse, vel primo aspectu cognoscat, ac nullam ferè aliam adhuc ab Anatomicis exhibitam ejus esse Figuram quæ huic non sit jure ac merito anteposenda. Nam ut mittam antiquam illam Casterii Figuram, ab Riolano laudatam, quæ discissam, explicatamque hanc Ilei intrà Colon productionem, hoc est Valvulam, egregiè repræsentat, & recentiores tantum Figuras, atque adeò minùs à Censore ignorandas, cum hac ejus delineatione conferam; ex illis ipsis duabus Tulpii Figuris quas supra „ à vero aberrare, „ dixit, minor certè extantem intrà Colon Ilei productionem longè verius exhibet quàm ista sua. Idem quoque longè verius exhibet Figura Verheyenii quæ à te, Mangete, in Tab. LVI. num. 7. producta est. In eo, fateor, Verheyenius deficit, quòd non monet, illam productionem per se, & secundum naturam non sic explicatam atque hiantem in annuli modum inveniri; sed Censor quoque in hoc peccat, eoque gravius peccat, quòd nulla id ratione emendat, cum Verheyenius quidem in altera Figura quæ tibi est Tabulæ LVIII. 8, illam eandem pro-

305.

De Ingressu
in Ilei in
Colon.De Valvula
la Baulini.ad l. 8.
Spigel.
Tab. 5.
Fig. 2.

308

In Explic.
Fig. 2.
Tab. 6.
Vid. &
Heister in
Præfat.
Compend.
Anatom.

productionem, non arte diductam, sed in horizontalem rimam sic latius coincidentem ferè ut solet inveniri, repræsentet: quod & ante ipsum Kerckringius fecerat in eo iconismo qui in Tab. LIX. num. 6. à te proponitur, & Bidlous in suæ Tab. XXXIX. Fig. 5. Neque à Verheyenio in eadem Figura omittitur (quod & Bidlous ex parte fecit) adumbratio aliqua earum quas supra descripsi, rugarum; in quibus etsi tantum desideretur, ut ego postquam jam sæpius illas in cadaveribus observaveram, imò hic describerem, vix denique, silente de ipsis Auctore, in hac ejus Figura animadverterim, nequominus tum hæc, tum alia in ceteris quas hic memoravi, Figuris desiderentur; omnes tamen aliquas veri ideas spectantibus asserunt; ista autem Censoris propemodum nullam. Nam præter omnia quæ hætenus in ipsa notavi, neque ista vero respondet „ angustia ilei. Et „ pellicea ista productio — digitis tracta, — glomusque „ iste quem neque in cadaveribus vidisse, neque in Figura hac intelligere nre, fateor, rem magis confundunt, non illustrant; ut ea demum quæ supra monui de Cæci longitudine non semper tanta, de Appendicula Vermiformi longè sæpius aliunde orta, & cætera de hoc genere prætermittam.

ANIMADVERSIO XVII.

Multa quæ in ista Dissertatione fuerunt necessariò notanda, brevior me esse cogunt in his Capitulis duobus proximis quæ tu ipse, Mangete, addidisti. Perpaucis ergo, quæro primum, quid causæ fuerit quare cum in multis eorum quæ in primo Capite scribis, ita Verheyenium sequaris, ut sæpe etiam ejus verba non mutes; quare, inquam; in certis quibusdam rebus in quibus sane recedendum ab eo non erat, recedere volueris. Nam cum ipse non venas modò, sed etiam arterias mesentericas crebrò inter se communicare, & verbis, & iconismo docuerit, qui tibi est in LVIII. Tabula 16. quo quidem iconismo elegantiores vidi, sed ad mesenterica hominis vasa verè demonstranda aptiores non vidi; tu id quidem de venis dotes; de arteriis autem retices, quasi verò hæc per humanum mesenterium inter se minimè communicarent. Sed hoc levius est; illud majoris momenti, quòd cum ipse, addita etiam observatione, & ratione censeat, eadem vasa esse in Mesenterio Lymphatica, & Lactea; tu diversa vasa esse, non dubites, hac una, si bene asequor, fretus ratione, quòd cum Lacteis, nihil arteriæ habere, beant commercii, „ habituræ, si Lactea eadem essent atque Lymphatica. Verùm enimvero istam tibi dubitationem evellere ex animo debe-

L. t. n. 2.
c. 12.

306.

Utrum in
Mesenterio
Vasa Lym-
phatica, &
Lactea ead-
em sint.

307

debebat Cowperus, qui mercurium in mesaraicas arterias injectum citò vidit in vasa Lactea transisse. Sed tu in eo ipso Virum aliqui accuratissimum „hallucinaturn esse, „ non dubitas, „ quòd intestinorum „ vasa lymphatica à lacteis non satis distinxerit. „ Quod etsi de tanto Anatomico miris est credibile; ego tamen hic tibi gratificabor, & quæ in vasa tunc mercurius transiverit, dubium relinquam. Sed tu vicissim id mihi edisere, quò factum sit, ut quando in Mesenterio alia esse vasa Lactea, alia Lymphatica, non dubitas; ab nemine tamen; quod adhuc legerim; in una eademque Mesenterii parte & Lactea, & Lymphatica simul, eodemque tempore conspecta sint; cum eodem quidem tempore, sed in diversis Mesenterii partibus, utraque conspiciantur ita similia inter se, ut colore contenti humoris dumtaxat differant. Et ipse quidem cum vivum canem ad quoddam habendum circa respirationem experimentum, dissecarem, id inprimis clarissimè vidi. Cum enim cibus ex ventriculo in prima quidem tenuia intestina descendisset, ileon adhuc vacuum esset; pulcherrima ex illis Lactea vasa, at nulla Lymphatica, ex ileo autem æquè pulchra Lymphatica, at nulla Lactea emergebant, ac per respondentes quæque Mesenterii partes reptabant. Illud quoque in eodem carne adnotavi, quòd Lacteorum illorum primum, maximèque conspiciunt statim infra pylorum è duodeni principio veniebat. An verò ut ex primo intestino, ita etiam ex ultimis, nempe Grassis vasa Lactea proveniant, hoc est, ut nos quidem intelligimus, an Crasforum saltem aliqua Lymphatica radículas habeant sic in ipsorum anteriore tunica hiantes, ut Lymphatica Tenujum; rectè quidem in ea re à Verheyenio dissentis, qui dum miris id verisimile credit, videtur ignorare, Needhamium ex Recto canum intestino vasculum non limpidò humore, sed chylo turgidum, atque adeò albissimum, ad cisternam contendens sæpenumerò vidisse. Quo tu exemplo excitatus, quærere profectò in canibus poteras, eò magis quia in ipsis ligamenta quidem, & cellulæ Coli defunt, ipsum verò Colon verbo, non re *prorsus deficiis*, imò ne verbo quidem, si iudicium rationesque Blasii lequamus. Sed adversus Verheyenii sententiam nonnihil etiam facere possunt observationes clysmatum vel nunquam redditorum, vel longo tempore nutrientium, quo in genere maximè admiranda illa est quam cautissimus Observator, nobisque, dum viveret, amicissimus Ramazzinus & sæpe mihi narravit, & hortante me, suis demum Constitutionibus Epidemicis interjecit. Porro in eo etiam lapsus est Verheyenius, quòd cum in homine vasa Lactea nunquam satis, Ductum autem Thoracicum, & multò magis chyli Receptaculum nunquam vidiisset, illi sibi usitatissimo, sed

Quibus in
Istis
Vasa Lactea
etiam
sunt.

l. i. tr. 2.
c. 13.

Disquis. de
loim.
Foet.
Vid. Heut.
confirm.
in equo
Eph. N. C.
Cent. 6.
Obs. 26.
Anat. Animal.
P. 1.
c. 6.

A. 1691.
num. 22.

31. 17. 3. sed fallacissimo sæpe argumento : *par* in brutis, & homine eorum
 E. 13. „necessitas apparet; ergo quin in homine æquè ac in brutis exi-
 „stant, non est dubium: „illi, inquam argumento tantum tribue-
 „rit, ut minimè advertens quod alii, & nominatim Peyerus, scripse-
 „rant: „pisces, & aves multas lacteis carere, „neque nos pleraque
 „istiusmodi rerum causas satis intelligere; de „cisternæ chyli, ejus-
 „que notabilis quidem cavitatis, existentia in homine nequaquam
 „dubitaverit. „Et tamen, ut tu rectè ex Cowpero doces, quan-
 308. quam Lumbares illæ Glandulæ Bartholini (quas ego sæpe tribus
 „plures, imò etiam multò plures inveni) Receptaculi vices non ge-
 „rant; non tamen in homine ejusmodi cisterna est, qualem Verhey-
 „nius animo videtur præcepisse, sed tale est Receptaculum quale vel
 Cowperus, vel Henningerus proposuit. Ex hoc enim Cl. Viro „hac
 „in parte, & in subjecto quidem humano quod curiosi Lectoris
 „oculis subiceretur, haberemus, „etiam si, Cowperus suppetias
 „non venisset; „quinimo sunt quædam in descriptione, & Figura
 Henningeri quæ frustra in iis quæ tu ex Cowpero unicè producis,
 perquirentur. In duas autem Tabulas huic, & sequenti Capiti in-
 terjectas quidem notanda essent, nisi ea possent ex superiori-
 bus Animadversionibus facile colligi. Satis ergo sit ea de re Lecto-
 res monuisse, & præterea addere, ne omnes earum Tabularum Ex-
 plicationes ita prorsus ab earum Auctoribus scriptas credant quem-
 admodum à te exhibentur. Nam ut in Figuris Verheyenii litteras
 quasdam omittis, ex. gr. in Tabulæ LVIII. 8. litteras f f, sic in Ex-
 plicationibus 6, & 7. verba, ut libet, & immutas, & addis. Ad
 Peyeri Figuram quæ Tabulæ LIX. est 2, explicationem Plexus B
 prætermittis. In Explicatione autem Figuræ 6. quæ Kerckringii
 est, cum quædam, ut soles, verba interjicias, non animadvertis,
 inter id quod ille scripserat: „valvulas conniventes cum cellulis pro-
 311. „ponens: „& id quod tu exhibes: „Valvulas Coli Conniventes,
 „cum Cellulis per eas efformatis, proponit: „non, inquam, ani-
 „madvertis, tantum inter hæc discriminis intercedere, ut qui eam
 Auctoris Observationem cui ista est subjuncta Figura, imò qui istius
 ipsius quam tu affers, Explicationis eam partem quæ ad litteras F.
 F. F. pertinet, legerint, Kerckringium sibi non constare, sint cre-
 dituri, ut qui modò ajat, „Coli Cellulas per Valvulas conniven-
 „tes, „modò verò dicat, easdem „per externum ligamentum ef-
 „formari. „Sed & Figurarum Cowperi Explicationes quas te
 ex Actis Eruditorum Lipsiensibus sumpsisse, video, quicunque cum
 eorum Diligentissimorum sanè Collectorum verbis contendent, in-
 telligent facile, te quædam mutasse, nonnulla omisisse. Idem quo-
 que

Exercit.
 II. de
 Gland. In-
 test.

Append.
 ad Eph.
 N.C.Cet.
 III. & IV.

Spicil.
 Anatom.
 Obs. 39.

A. 1699.
 M. febr.

que mirabuntur, à te illam Cowperi Figuram esse prætermiffam quæ allatas antecedit, quæ videlicet „ Receptaculum chyli in fitu natu-
 „ rali cum partibus adjacentibus relictum „ demonftrat; ego verò
 „ minùs miror, cum in tua priore Tabula; quam „ de Mefenterio
 „ agere „ proferis, vel Mefocoli ipsius iconifmum videam præter-
 „ mitti.

309

ANIMADVERSI O XVIII.

Sed & in iis quæ in proximo Capite ex Vallifnerio nostro vertis,
 te paulò magis diligentem fuiſſe, decebat. Non enim inquit
 Vir Clariffimus, te ante orificia glandularum primi in Struthiocame-
 lo ventriculi membranulam obſervafſe, „ quæ illa orificia ita claude-
 „ ret, ac cooperiret, ut liberum ac continuum fluxum fucci in glan-
 „ dulis contenti — permitteret, „ ſed ut „ earum fucci reditum in
 „ ipſas impediret. „ Neque, ut alia modò prætermittam; idem am-
 „ biguè dixit, „ in multis piſcibus adnotari canalem biliferum ad ven-
 „ triculi cavum tranſmiſſum, „ ſed „ unum canalem biliferum. „
 „ Cæterùm dixit ille quidem, humorem ex memoratis modò glandu-
 „ lis exſillantem „ prorfus eſſe inſipidum; „ tu verò quomodo id con-
 „ cilies cum ſubacido illo tuo fermento cum particulis ſulphureis
 „ volatiliſſatis „ unito, etiam quantum tibi liber „ immutato, „ non
 „ ſatis dicis. Præterea etſi libens fateor, multa, & valida à Doctiſſi-
 „ mo hoc Viro pro fermenti vi diſſolvente adverſus ventriculi exte-
 „ rentem, ſeu *trituranſem* motum producta eſſe argumenta; decuiſſet
 „ tamen, te cum eorum, & jure quidem meritoque his tribuiſſes,
 „ aliquid viciffim eorum quæ è contrario dici poſſent, conſiderationi
 „ tribuere. Nam (quod Viro, ſiquis alius, veri ſtudioſiſſimo, cuique
 „ meus erga ipſum perſpectus eſt animus, non modò non ægrè feren-
 „ te, ſed etiam ſinente, non quidquam definiendi, ſed exempli addu-
 „ cendi cauſa hic licet memorare) ſi avium ventriculus mufculis ita
 „ firmis, & lacertofis inſtructus eſt, ut eoſdem in gallo indico Borel-
 „ lus non dubitaverit cum potentia librarum 1350. comparare, atque
 „ adeò ſi in Struthiocamelo ii tam fortes, ac denſi ſunt, ut „ aliquibus
 „ in locis tres circiter uncias craſſitudine ſua æquent; „ quomodo
 „ eoſdem datos eſſe, judicabimus ad „ motum leniter compreſſivum
 „ commiſcendis ciborum particulis, iſſque ad invicem allidendis „
 „ dumtaxat idoneum, cui quidem motui non multa fibrarum ſtrata
 „ ſufficeſſent; ad motum autem iſſdem valide exterendis aptum datos
 „ eſſe, non judicabimus, præſertim cum aliquid in avibus agnoſcamus
 „ necceſſe ſit quod actionem ſuppleat deficientis in ipſis maſticationis?

312.

310.

317

Nam Ven-
 tricular
 ingreſſus ſue-
 co diſſolu-
 ventis, cu
 motu po-
 tius exte-
 riore conſi-
 ſtat.

De Mot.
 Animal.
 P. a. Prop.
 191.

320

321

E

Ate.

- Atenim in Struthiocameli ventriculo clavus ita inventus est transversum infixus, „ ut impossibile esset, ut ejus parietes satis ad invicem „ accederent, ut vi suâ compressivâ corpora dura inibi contenta „ frangerent; „ quæ tamen inerant „ corrosa & consumpta. „ Ego quidem Viri, cujus fides mihi inprimis est spectatissima, magis credam verbis, quàm adjectæ Figuræ, quæ sic satis videtur ostendere, si non in parte ulteriore, at saltè in priore eos parietes ad se invicem accedere potuisse; faciliè tamen fieri potuit, ut interjectum illud *MAGNUM VACUUM* dura ipsa corpora completerent, & sic actioni se contrahentium parietum satis subjicerentur. Atque utinam Peyerus paulò fusiùs scripsisset quid ipse observaverit cùm „ in ventriculis vacci- „ nis vidit aliquando hærentes ac infixas casu clavorum particulas, „ aciculasque plurimas ventrium motu ferè consumtas, atque detritas. „ Sed quando id ipse non fecit, prætermittendum non est Thomæ Cornelii experimentum, qui cùm „ gallo Calicutano com- „ plura ærea, atque argentea numismata in canalis formam convoluta ingessisset, ea post decem dies in ejusdem ventriculo inventa „ esse, dicit, singula duodenâ ferè ponderis parte diminuta: fuisse „ autem exteriorem, seu convexam illorum numismatum superficiem „ insignitè attritam, at interiorem tamen, seu concavam omnino integram permansisse. Unde, inquit, palam est, istiusmodi corpora in Alitum ventriculis non liquefcere, aut dissolvi; sed collisum „ potius exteri, atque comminui. „ Porro Auctor Epistolæ, Cl. Pitcarnii Opusculis subjunctæ monet, „ in ventriculo etiam humano „ ejusmodi deprehensam fuisse in unius nummi latere convexo abrasionem, cùm lateri concavo nihil detritum appareret. „ Harum re, Mangete, observationum vim fortasse credes posse declinare, si dicas; ut lacertæ illæ è viperarum ventriculo educæ, ea tantum parte quæ „ proximè hujus fundum contingebat, erant erosæ; „ sic illis etiam in nummis evenisse, ut interiore superficie qua fundum videlicet ventriculi contingere non poterant, minimè erodi potuerint; quasi verò alterum quod continuò subjicis, Cl. Vercelloni experimentum *multoties* repetitum tibi istam responsionem de manibus non extorqueret. Vicissim namque cum ipso admittis, eâ ingestorum parte quæ canini ventriculi parietibus inhærebat, omnino intactâ, istam quæ in illius centro, sive medio erat, eodem esse tempore colliquefactam. Neque verò adductam ex Ingeniosissimo Pitcarnio difficultatem satis dissolvis, dum „ non omnes succos in omnia corpora „ ipsis objecta eadem vi agere, „ respondes, & exempla profers aut eorum humorum qui „ solidissima etiam metalla dissolvere possunt, mollioribus corporibus intactis, „ aut fermenti pistorii „ ma-

„ nus

„ nus eorum qui pastam subigunt, „ non affligentis, aut multi fer-
rum promptè satis consumentis, sed „ pedes, ac totum corpus ad
„ usque caput immersum vel minimè contrumpentis. „ Non enim
id potissimum querit Pircarnius, cur „ liquidum ventriculi, solvens,
„ coquensque cibos, non etiam coqueret, solveretque ea quæ non
„ sunt solidiora cibis illis; „ sed addit „ & quæ si ex simili animali
„ alio eximantur, ventriculoque ingerantur, statim coquantur in eo „
id est cur succus ventriculi ex. gr. canis ingestum alterius cujuscun-
que canis ventriculum statim coquens, illius ipsius in quo est, canis
ventriculum nunquam solveret; hoc verò est quod potissimum qua-
rit, urgetque Pircarnius. Sed hæc alii viderint. Nobis enim qui
multa admodum super Ventriculo, Intestinis, Viisque Chyli adnota-
vimus, non modò est ad ulteriora pergendum; sed ut eò breviores
jam simus, videndum est, quò hætenus fuimus prolixiores.

323

327

ANIMADVERSI O XIX.

ET commodum accidit, ut in ea quæ de Pancreate vel ex Graa-
fio exhibes, vel ex tuo jam in Bibliothecâ Anatomica in ea-
dem edisio Argumento hic rursus adducis, perpaucissima adnotare
satis sit. Quod igitur attinet ad bilem intrâ Ductum Pancreaticum
interdum deprehtensam; quod alioqui aut ea quæ à Graafio ratione,
aut alia non absimili est explicandum; & nos meminimus, dum he-
rinaceum dissecaremus, intrâ eum ductum bilem vidisse, ^{nam} certè
humorem ex viridi flavescentem. Quod autem spectat ad Pancrea-
tici Succii saporem, rectè illud quidem tu admones: eum à pluri-
bus Anatomicis minimè acidum inventum esse: quod & nos non le-
gendo modò, sed & Spectatissimos Viros qui id in pluribus canibus
experti erant, alloquendo, comperimus. Cæterum an „ totum
„ serum, totusque adeò, ut tu affirmas, sanguis particulas acidas in
„ se contineat, „ aliis discutiendum relinquo. Illud autem Lecto-
res moneo, cum in Tabula LX. in Graafii Figuris nonnulla omissa,
tum verò in Graafii, arque Bidloi, ejusdem Tabulæ Explicationibus
plura, ut in cæteris, verba addita, vel mutata fuisse. Perpauca
hic quidem etiam de Liene adnotabimus, præsertim cum tu ne unum
quidem verbum hic addas ad ea quæ vel Argumenti, vel Adnota-
tionum loco in Bibliotheca Anatomica jam edideras. Quod ergo at-
tinet ad illa quæ in tertiâ Adnotatione ex Kerckringio scribis; nobis
qui dem contigit, ut semel in homine, bis in canibus plures Lienis
obserbaremus, nunquam, ut nullum; quamvis id semper optaveri-
mus, quò videlicet simul animadvertere possemus, quamam ejusmo-

330

De Succo
Pancreati-
co.

340-

357

De Liene,
ejusque
Uso.

di animalia usi essent valetudine. Quinimo cum eo tempore quo eramus Bononiæ, in Concionatore quodam, itemque in Virgine post longas gravesque ægrotationes mortuis, Lien tam parvâ inventus esset magnitudine, ut in hac castaneam, in illo nummum argenteum majorem vix æquaret; nihil inde tamen colligere licuit propterea quia nonnulla etiam alia viscera in utroque vitiosa erant. Illud verò à Cl. Valsalva accepimus, quod in eo cane quem sine liene à se inventum esse, docuit, nihil vitii est, dum viveret, animadversum. Huc pertinet Cl. Litrii observatio de homine sexagenario, & ex causa quidem mortuo, cujus Lien omnino erat petrificatus. Non vacat eorum omnium historias inquirere quos sine Liene inventos esse, apud Schenckium indicatur; quæ tamen ab ipso assertur, celebris videlicet illa Ortelii, non tatis cerram existimo, cum quod Malignus in eodem viro de hepate, idem ego de Liene etiam suspicer, sub illa fortasse carnosæ substantiæ qua intestina ambiebantur, larva latere potuisse. Cæterum quod attinet ad illud Experimentum à quo istius adscribendæ Adnotationis occasionem habuisti; quæ in suo cane observavit Malignus, eadem in aliis quibus pariter splenica vasa obligata, aut exsectus etiam Splen fuerat, à plerisque observata esse, scio, inprimisque à Cl. Brunnero (quæ quidem, atque alia præterea nonnulla ingeniosè, & ex ipsa Anarome explicata esse, video in elaboratis Cl. Boerhaavii Institutionibus) ut mirer fuisse qui dicerent, ejusmodi canes neque cibum appetere, neque dormire. Nonnulli etiam affirmaverunt, canes Liene exsecto infœcundas fieri, cum tamen quam ego ante hos decem annos cum Experimentissimo Vallisnerio hic secui, ea frœcundissima fuerit. Quod verò in eadem, cæteris rectè se habentibus, unicum vitium observavimus, bilis videlicet cysticæ colorem non illum quidem flavum, sed ex subrubro ita obscurum, ut si aquæ in qua caro recens lota esset, multus nicotianæ pulvis misceretur, id nempe cum Virorum Cl. Bohm, atque Orlobii observationibus conjunctum, faveret conjecturæ Sagacissimi Maligni, à Liene bilis secretionem juvari, opinantis. Cum hæc scripsissem, in calce demum hujus Capituli præter expectationem illud unum inveni quod tuis olim editis Adnotationibus addidisti, verba ista videlicet in quibus pro Summo Anatomico Maligno adversus Nobilissimum Profectorem Ruyschium commemoras, ab Exercitissimo Meryo in muliebri Liene Glandulas fuisse observatas. Sed quando Ruyschius in humano Liene non Glandulas modo, verum ipsas etiam Cellulas esse, negavit; addere etiam poteras, ab Diligentissimo Cowpero ostensum esse, qua ratione in humano Splene eadem Cellulæ conspici possint. Cæterum in Tabu-

In Theat.
Tom. II.

391.

Hist. de

l'Acad. R.

des Scien.

1700.

Observ.

Med. I. 3.

Ibid.

Exercit.

de Hepa-

ticæ.

Vid. supra

344.

num. 327.

Vid. in

Ephem.

N.C. Cæ.

III. Obs.

37.

Circ. Ana-

tomie.

Fig. 18.

Hist. part.

D. II. 16.

360

364.

363.

Anatom.

et hum.

Bodies.

la

12 LXL. Figura 2. litteræ E. E. E, & Nervus G, qui istuc vas potius quoddam esse videtur, num rectè fuerint ex Bidloi Archetypò descripta cùm hoc in præsentia caream, ignoro; illud scio, ple- rasque reliquarum ejus Figurarum quas hic exhibes, Explicationes, non iisdem prorsus verbis in ipsius Autographo esse perscriptas.

ANIMADVERSI O XX.

CUM ejus Scriptoris cujus de Aneurysmate, & de Intestinatorum Valvula Dissertationes excussimus, „ turgescens jam super so-
 „ rores alias (ipsius enim verbis loquar) ejus petulca studiorum
 „ filia – prurigne exarsuaret – fruendi jam liberè primogenituræ
 „ insigniis, „ hoc est cùm ejus „ Historia Hepataria prelis jam esset
 „ nascenda; „ nonnulli quidem „ Medicinæ Studentes cecinebant: „
 „ Ergo suos victus deponat Willis honores,
 „ Malpighiusque suos, Glissoniusque suos.

Vid. Præf.
 Historia
 Hepat. &
 Caruina
 ante Præf.

At verò illà eadem Historià jam edità, te potissimum, Mangete;
 non dubitasse, quin relictis „ accuratissimis „ Hepatis Scrutatoribus
 „ Celeberrimis Viris Francisco Glissonio, & Marcello Malpighio, 365.
 „ in describenda hac Parte, ac ipsius Ufibus „ Historia potius
 „ Anatomici istius perquam eximii uteretur; „ minds quidem mi-
 „ randum esset, si verè, ut tu dicis, „ illa omnia ab ipso summa dæ-
 „ Betæ confecta nobis occurrerent; nec esset quòd aliquid pro Hepa- 366
 „ tis plena descriptione, post Peregregii hujus Viri in id adhibitam
 „ sedulitatem desideraretur. „ Verùm num res quidem ita se ha-
 beat, mecum pro communi veritatis studio recognosce. Et pri-
 mum multa quæ pertinent „ ad organicam hepatis constitutionem
 „ extrinsecam, eorumque inprimis causas, & habitudines, „ iste ip-
 se Scriptor se faretur omittere. Igitur in prima statim pagina quæ-
 dam „ pro hepatis plena descriptione desiderantur. „ Sed in iis
 ipsis quæ non omittit, haud rarò quiddam præ cæteris necessarium
 desideratur, nempe ut quid dicat, Lectores intelligant, velut in
 hac ipsa prima pagina, cùm scribit: „ explorata tandem hepatis 366.
 „ servili profapia, proscripto-que roris chylosi commercio, eum e cor-
 „ poris principatu deturbent; „ quemnam, obsecro, Mangete? ra-
 remne chylosum, ut vult grammatica, an hepar, ut res ipsa videtur
 poscere? & paucis versiculis interjectis, cùm de Nuckio dicit: „ va-
 „ sa prope ligamentum suspensorium unita percipit, eumque de-
 „ cem, vel duodecim ramificationibus perreptantia; „ quid, ma-
 lum, est istud eum? Alia autem habet quæ Lectores quidem fa-
 tis intelligant; sed an probare satis possit, dubiteat, ut cùm dicit:

„ p1-

367 "patere de facto, non in omnibus animalibus, immò nec in omni-
 "bus ejusdem speciei individuís ad hepatis concavum glandulas sem-
 "per inserti conglobatas; "non apparere omnibus, fortasse cre-
 "dent, non esse, dubitabant. Quod autem subjicit: "cùm tamen in
 "omnibus animalibus præsentia sint hepatis lymphatica; "de hac
in omnibus præsentia magis dubitabant. Eo denique addente: "In
 "quibus autem observabiles sunt hæ glandulæ, eadem solum su-
 "perscandi à lymphaticis, non intímè penetrari, manifestè adnota-
 "vimus; "hic verò non cæteros modò, sed te, te, inquam, ip-
 "sum dubitaturum esse, credo, huicne potiùs uni, quàm Nuckii,
 "quàm Malpighii, quàm Reverthorstii; at quorum hominum? experi-
 "mentis, & observationibus credas, quando horum vel verba, vel
 "Figuras contrariam probantes sine ulla addita dubitatione & supra
 "exhibuisti, & infra es exhibiturus. Cæterùm "nullum vas lym-
 "phaticum nasci à glandula - in partibus animalis omnibus: vasa
 "hujusmodi omnia ab hepatis cava illa parte prodire, in qua ape-
 "ritur capsula ad portæ ingressum; "contra atque ostendit Rever-
 "thorstii Figura: "quæ autem super convexam hepatis partem ter-
 "punt, iter habere "per suspensorium ligamentum usque ad glan-
 "dulas lumbares; "quando idem Reverthorstius in altera Figu-
 "ra aliud ostendit, & docet: denique "lymphæductus cystis felleæ
 "huic etiam categoriæ adnumerandos venire; "quos aliud iter ha-
 "bere, vel illud significat, quòd injecto trunco venæ portæ circum-
 "jectique membranæ vinculo, illi turgescant: atque alia de hoc ge-
 "nere vereor ut multi sint credituri antequam hic Scriptor "demon-
 "stret, - & germanos hepatis lymphaticorum, aliarumque partium
 "icones exponat "in eo Opere in quo etiam "de usu nervo-
 "rum hepatis, non minùs ac partium animalis aliarum omnium
 "fusiùs, & rectiùs quam hucusque decantatum fuit, forsitan disse-
 "ret. "Quæ & alia quæ subinde ipse minatur, tu autem, Mangete,
 "studiosè omittis, quæ, inquam, antequam præstet, monendus pro-
 "fectò multa esset, imprimique ut loqui ante disceret; deinde ut
 "Auctores attentius legeret, nam ex. gr. Viri Exercitissimi Willi-
 "sius, & Vieussenius de nervis hepaticis neque ista eadem prorsus,
 "neque ista eadem ambo unanimiter tradidere quæ hic ab ipso tradi-
 "disse narratur, novissimè ut de aliis, ac præsertim undequaque
 "majoribus ipso Viris non ea diceret quæ si de ipso dicerentur, fer-
 "re graviter deberet, velut hic cùm: "Alii, inquit, Glissonius scilicet,
 "Malpighius, & Kerckringius ad suæ quoque venarum glo-
 "riolæ, &c. " & alibi generatim in iis quæ tu, Mangete, sapien-
 "ter omisisti: "per inanes postulatum, & theorematum geometri-
 "cas

Tabul.
Theatr.
LXI: I. Fig.

Fig. 2.
189

367.

Hist. Hep.
P. I. c. 7.
5. 4. 5. 6.

Ibid. in
Præf.

cas abstractiones, frivolas linearum, & angulorum potestates, aut
 ampullosas authorum citationes, &c. Tortores hi veritatis, & fuci
 cavillationes seminant in foliis, confusiones in lectore; difficultates
 altioribus in tenebris recondunt; & principem in authoris cerebro
 vanitatem revelant. Sed hæc ipse viderit; nos enim & hæc, 368
 & alia multa prætermittimus; ut cum dicit: „portam per capilla-
 menta sua sanguinem torum viscerum naturalium residuum hauri-
 re; „ non quarimus, num etiam renum, & vesicæ? cum addit:
 „resonasse apud Antiquos venam portæ ejusque propagines pro plu-
 stro sanguinis ab Hepate ad viscera cætera in eorum alimoniam
 delati; „ non rogamus, num etiam ad modò nominata, & ad
 omnia superiora? & denique (nam quis possit illiusmodi omnia vel
 numerando percensere?) cum dicit: arteriæ ramum „pergrandem
 satis, & notabilem „jecur subire; hoc quoque prætermittimus. 368.
 Verum cum subjicit: ejusdem arteriosi rami „diramationes univer-
 sas in (valorum hepatis) involucra unice impendi, ibidemque
 terminari, idque se pluries ostendisse, se pluries (sic enim loqui-
 tur) observatum „esse; etiamsi nos minime contra dicamus, asse-
 rentes, injectâ in eam arteriam liquatâ, & coloratâ cerâ, nos ipsius
 ramusculos per membranam hepar investientem eleganter ductos vi-
 disse; tu ipse tamen contradicis, id ipsum ex Cl. Ruyschii obser-
 vatione in Tab. LXIII. Fig. 11. confirmando, quinimo in proxima
 statim, atque altera pagina Præstantissimorum Virorum Malpighii,
 & Litrii testimonium proferendo, quorum alter ejusdem arteriæ
 propagines in hepatis glandulis terminari, vidit, alter in Regia
 Scient. Academia Parisiensi, nullo etiam microscopio adhibito, osten-
 dit. In iis autem quæ sequuntur, etsi pleraque abnormia sunt;
 nobis tamen vel magis licet connivere, quando non tu, aut alius
 aliquis, sed ipse sibi contradicit. Scribit enim ex. gr. sanguinem af-
 portare e ramis „in truncum cavæ, trajicientis per hepatis fo-
 veam, ad hoc idem opus in regione ejus ima, & postica, expres-
 se excavatam. „At non multis interpositis verbis „introitum in 369
 „hepar ramorum cavæ ad posticam, & superiorem ejusdem visce-
 ris faciem conspici, „fatur. Hic nervos hepatis *vasa* appel-
 lat *nervosa*. At in II. Historiæ Parte „ea se vocare, dicit, hepatis c. 3. §. 1.
 „vasa, quæ liquido palpabili devehendo apta nata sunt, eoque ju-
 re nervos ab hepatis vasis libenter proscribere. „Hic vasa
 hepatis lymphatica, & quæ dixit nervosa „pari passu cum Poro
 „Bilario, & Porta, paribusque diramationibus excurrere, stricti-
 que invicem contiguitatis adhærentia perfrui per totum ramorum,
 „ac ramusculorum tractum, usque ad ultima stamina, „sine ulla
 dubi.

Arteria
 Hæc patet
 rami qui
 perungit.

§ 367

dubitatione, quasi vidisset, historica asseveratione affirmat. Attamen eadem lymphatica, supra falsus erat, se intrā hepar, per quinque, „ aut sex digitos, nec ulterius, insequi potuisse; cultri scilicet & „ visus aciem iis indē omnino effugientibus. „ Hic denique ipsa etiam lymphatica „ communi capsulæ tegmine, tanquam vagina „ quaquaversum involuta „ esse, dicit. At supra eodem in loco ista ipsa lymphatica „ non in capsula communi, sed supra ejus dorsum „ reperire, — & extimam solam ejusdem capsulæ superficiem perambulare, „ contendit. Novissine unquam, Mangete, hominem qui magis Adversario contradiceret, quā hic sibi? & in uno quidem eodemque libello; imō in eadem propemodum pagina; addē in uno eodemque versiculo. Ingressum enim venæ portæ esse, dicit, „ ad hepatis sinistrum latus, seu concavæ regionis centrum. „

ANIMADVERSIO XXI.

*Directiones
quibus Ve-
na Cava,
& Porta
rami in he-
pate dispo-
nuntur,
commen-
tia quædam
propositio
convincit
lat.*

infra § 366

*l. t. ff. 2.
c. 17.*

infra § 388

Ibid.

Hinc tamen incipit ejus rei fundamenta jacere qua nihil magis in Historia hac tota inculcat. Cum enim, inquit, Vena Portæ ejusque propagines ad posticā hepatis regionis centrum ingrediantur; rami autem Cavæ ad superiorem ejusdem regionis partem introeant, „ eādemque indē directionum proportionē in minutissimā per totum organon diramationum stamina sobolescant hæc vasa; sequitur necessariō quod cavæ radices in quacumque hepatici parenchymatis portione cum ramis portæ ea habitudine concurrere debeant, ut se se invicem transversim, seu ad rectos angulos, „ aut saltem in decussim quandam interfecerint. „ Sequitur id certē necessariō; sed ex eo sequitur, quod supponit: quæ directionum proportio inter majores utriusque venæ est ramos, eandem inter minores, atque adeo minimos, ultimosque earum ramusculos servari. Quid verò, si hoc ipsum ejusmodi est, ut non mihi modò, sed neque Summo Viro Lancisio „ ullo pacto probari possit? „ At enim id, inquit, „ pluries in deglubatis exactē hujus visceris tanalibus observavimus. „ Observavit nimirum (nisi potius deceptus est, ut infra patebit, & discors „ maximē circa extremitates „ Verheyenii descriptio indicat) observavit, inquam, ita se habere eas „ diramationes à grandiori statu usque ad ultimam sensibilitatem, „ ut in responsione ad Amplissimum Lancisium consistetur; hic autem queritur, ut ex dicendis patebit, de verē ultimis, atque adeo insensibilibus. At „ non incongruum, inquit, videtur exemplar naturæ hujusmodi illis & surculis conferre, qui, per facilitatem „ suam, jam sensus eludunt qualemcumque solertiam. „ Verū id quod

quod sequitur ex eo quod non incongruum dumtaxat, videtur, non sequitur certe *necessariò*, ut supra fuerat pronunciatum. Nam eadem tantum spectatà ratione neque incongruum videri posset, minores quosque Arteriæ Magnæ, & Venæ Cavæ inferiores ramos ad idem exemplar esse dispositos ad quod earum inferiores trunci, majoresque rami disponuntur; & tamen non modò id *necessariò* non sequitur, sed contrariam omnino rationem in cruribus, pedibusque servatam videmus, nempe ut rami, non quidem venosi arteriosis, sed arteriosi venosis obducantur. Quid? quòd ipsam ramorum sensibilibus directionem haud eam esse quam contendit, vel ex ejus confessione probari potest. Nam quod observavit ipse, id „ luculenter „ etiam haberi, constat, in Glissonii paginis, & præcipue in ejus „ dem iconibus, atque adeò ad eandem demonstrationem collimant, re „ Figuras Kerckringii. Verum Glissonius, ubi „ de venæ portæ, & cavæ in hepate connexionibus „ verba fecit, earum propages non tantum ad decussis formam, non tantum ad angulum rectum inter se dirigi, sed etiam lateribus conjunctis parallelas pergere, & verbis, & interjecto verbis iconismo luculentissimè docuit. In iis verò Iconibus quos Historiæ Scriptor inavit, ramos quidem earum venarum majusculos decussatim positos exhibuit; minimorum autem, qui huc magis pertinent, bene multos ferè parallelos, nonnullos etiam prorsus parallelos delineavit. Kerckringii demum Figuræ cum singulæ singulas eas Venas ostendant, neque ad rem faciunt, & siquis alteram alteri superimpositam animo concipiat, pleurosque non modò minimos, sed & majores ramos inter se parallelos commonstrant. Quæ cum ita sint, cumque in his *paginis*, & *Iconibus* luculenter haberi confensus sit quod ipse observavit; illud quidem *necessariò* ex hac ejus confessione sequitur, ramorum etiam sensibilibus utriusque Venæ directiones in quacunque parte hepatis easdem non esse. Hoc autem convulso fundamento, quot unà commenta convulserimus, infra apparebit.

ANIMADVERSI O XXII.

Pergit porro „ ad propriam hepatis, & principalem substantiam „ Ab hac, inquit, ejusque „ functionis modo exponendis se se suaviter exemit „ Glissonius. Quid verò „ Famigeratissimus ille „ apud Nationes omnes Doctor Bononiensis „ Malpighius? quid de ejus in hepate laudatissimis inventis, quid, quælo, videtur? „ In „ hunc, inquit, scopulum allidens, nec melius expeditit se se, nec, 369 „ ab alio prætermisra prædicta majoris elucidationis facere donavit „

E

Dicet

Hist. He-
par. c. 5.
§. 1.

Ibid. §. 2.

Dicit aliquis : At Glissonius propriam illam hepatis substantiam nihil aliud, nisi sanguinem cum bile coagulatum, esse docuit, huiusque separationem per attractionem explicandam esse, censuit; Malpighius verò illam substantiam esse glandulam, ostendit, bilis autem separationem, ut eam quæ sit in cæteris glandulis, per congruos in ea substantia insculptos poros explicare consuevit. Verum noster de istiusmodi explicatione quid sentiat, satis superque in iis Capitibus ostendit quæ contra non *Fermentiflas* modò, sed & *Poriflas* præmisit, & quæ tu, Mangere, ut pervulgatis contritiisque argumentis plena, bene ac sapienter tota omisisti. Ibi igitur istam hypothese[m] etsi „ simplicioram, naturalique idèò rerum ordini conformiorem „ esse, „ falsus erat; quod quidem satis est, ut maiorem lucem as-
ferre, intelligamus quàm ignotas, & non intelligendas Faculta-
tes; eandem tamen „ falsitatis ream – absque refugio „ pronuncia-
vit. Ad detectam verò naturam glandulosam quod attinet, „ iure
„ omni judicandum hic censet, Malpighium nil in hepate innovasse
„ præter novi vocabuli introductionem, glandulam scilicet appellan-
„ do quod hactenus sub parenchymatis nomine accesserat; „ quasi
verò Malpighius ita Hepar *Glandulam*, ut ipse Ductus Lacrymales
Novus, nuncupasset, quia sic visum esset, non quia substantiam he-
patis reverà esse glandulosam, primus ostendisset. Adde certam in-
ventam glandulæ structuram, certasque partes, lobulos videlicet il-
los suos, atque acinos, quos hic nescio contemptum magis, an im-
peritè commemoret; „ Lobulis, inquit, licet suis in medium addu-
„ ctis, totumque hepatis corpus complementibus, qui in acinos inde
„ disperiantur exagonos, conflatos tandem ex subovalibus glandulis,
„ quas intrent omnis generis capillamenta vasorum. „ Non dixeram
ego, monendum esse hominem, ut Auctores attentius legat? Ecquan-
do Malpighius acinos à glandulis hepaticis distinxit? Ecquando aci-
nos ex subovalibus glandulis conflare, dixit? Ecquando omnis generis
capillamenta vasorum, hoc est etiam lymphaticorum pervenire
istuc, docuit? Et hic nobis de Malpighio, quem ne intelligere qui-
dem valuit, tam libera judicia feret! Et quod magis mirandum est,
inveniet tamen qui ipso potiùs quàm Malpighio se „ uti posse, ar-
„ bitretur? „ Et cum accuratissima Malpighiana hepatis anatome, ir-
hac Historia quatuor istis, non amplius, verbis non sine tribus in-
tolerandis erroribus exhibeatur; invenietur, Mangere, qui hic „ il-
„ la omnia à perquam eximio isto Anatomico summa *exesse* con-
„ secta esse, dicat, nec esse quòd aliquid pro hepatis plena descri-
„ ptione post Peregregrii huius Viri in id adhibitam sedulitatem de-
„ sideretur! „ Vidimus quid de aliorum Inventis censuerit; nunc
quid

*Hepatis
communis
in Stru-
ctura ob-
scuratur.*

quid ipse invenerit, videamus. Cum nulla, inquit, corporis anima-
lis assignari possit pars solida, quæ ex tenuissimis vasculis aggregata
non sit; sequitur, „ hepatis parenchyma glandulæ conglomeratæ no-
„ mine donatum nuper, non nisi ex vasorum capillamentis glome-
„ ramen esse. „ Hactenus nihil novi; hactenus nihil contra Malpi-
ghium. Non enim quia membranz glandulosos hepatis acinos com-
ponentes, ex tubulis totæ, & canaliculis (quales ii cunque sint) con-
stant; hinc sequitur, aut eos acinos nullos esse, aut inter extrema
venarum Portæ, & Cavæ interjectos non esse; Adnotationes autem
quas adscribis, magis acinis, ut à Malpighio concipiebantur, fa-
veant, quàm istorum quos tu dicis, tuamque sententiam „ pro virili
„ confirmant, „ candidi Lectoris judicium esto. Illa autem; sic
pergit dicere; vasorum capillamenta quorum glomeramen hepatis
parenchyma esse, posuimus, „ à cava solum, porta, & ductu ex-
„ cretorio possunt propagari. „ Attende quomodo id probet. Nam
„ lymphatica, inquit, in hepate non à glandularum substantia, sed
„ ab earum interstitiis enasci, superius exhibuimus. „ Si exhibere
est quidquid lubet dicere; id supra exhibuit; si verò est vel leviter
probare, non exhibuit. „ Nervi autem nullam, inquit, trahunt pro-
„ priè canalicularem structuram. „ Vide novam *contradictionem*;
nam paulò ante nullam assignari posse, dixit partem solidam, quæ
ex vasculis aggregata non sit. Arteriæ autem „ soboles solas vaso-
„ rum tunicas lambunt in organo. „ Quod quidem supra ex nostra
aliorumque observatione falsum esse, ostendimus. „ Nec ulteriora in
„ hepate vasorum genera. „ Sensibilem, concedo; insensibilem
autem ex quibus parietes acinorum, cæterasque hepatis membranas
compingi, verisimile est, quis audeat concedere? Ipse tamen, quasi
hæc omnia probata, & manifesta essent; „ deventa (sic loquitur)
„ jam mens ad compositionem glandulæ, in qua dicta terminantur
„ vasa, invenit principii cavæ apertionem lateraliter concurrere ad
„ finem ultimæ propaginis portæ. „ Novum, Dii boni! Anatomæ
genus, in quo non oculis, sed mente ad quæsitam Partium structu-
ram devenitur! facile præterea, & valde securum! Nam mens ideo
sic invenit, quia quodcunque in mentem venit, pro vero statim ar-
ripitur. Nunc demum intelligo, cur Malpighius, qui anxie & scrupulose
omnia quæ poneret, pensitaret, & qui nisi quod videret, in
re anatomica nihil crederet, tam parvos, si hunc audiamus, imò
nullos in hepatis structura revelanda progressus fecerit. Nimirum
hujus no væ methodi prorsus erat ignarus. Verum, credo, rem
exaggero, atque amplifico. Cur quæso, Mangete, „ principium ca-
„ væ lateraliter concurrat ad finem portæ? „ quoniam, „ ut vidi-

370

F 2

„ mus

- mus superius „ , utriusque venæ rami vel *minimi* sic inter se, in
 „ quacunq[ue] hepatis parte ultimò assignabili „ diriguntur. At hoc
 „ est illud ipsum fundamentum quod supra nullo negotio convulsimus;
 „ illud ipsum est quod Sapientissimus Vir Lancisius „ sibi nullo pacto
 „ probari posse, „ testatus est. Quomodo præterea glandulosa hu-
 „ jus novæ structuræ pars illa altera in qua inventum est, „ primam
 370. „ ductus excretorii hepatici radicem directè concurrere in glandula
 „ cum fine furculi portæ; „ quomodo, inquam, ea mihi potest pa-
 „ tere? Percipies, inquit, „ facile, si supponis, ramum quemcumque
 „ excretorium non cum locia sua portæ propagine hoc ritu inoscu-
 „ lari, sed cum alia directionis ex diametro oppositæ. Concipe
 „ hæc per totum hepar, & patet jam tibi quid sit hepatis paren-
 „ chima, seu quid ejus glandula, & quid intima ejusdem compo-
 „ sitio. „ Et hanc, Mangete, Historiam Hepaticam, non Divinatio-
 „ nem appellabimus? Historiam autem? imò Demonstrationem; hæc
 372. enim ipsa postea dicet, se in hoc loco *demonstrasse*. Præclarum ve-
 „ rò & inauditum genus Demonstrationis! *Suppone*, inquit, *hoc ritu*
 „ rem se habere. *Concipe* id quod mihi probandum est, verum esse;
 „ Verum est igitur. Dices: „ lex contrariorum asserere id co-
 „ git. „ Nam si capillamenta cavæ quæ *ad decussim* veniunt cum por-
 „ ta, lateraliter cum hujus fine concurrunt; capillamenta ductus hepa-
 „ tici quæ parallela pergunt cum porta, directè cum hujus fine de-
 „ bent concurrere. Ego verò primam eam decussationem, eumque
 „ concursum cavæ, & portæ negavi. Deinde fac, me non negasse.
 „ Cur non negassem? Quia verisimile esse, concessissem, quod con-
 „ tingere decretur inter omnes ramos sensibiles, id quoque inter in-
 „ sensibiles contingere. At si id verisimile esse, vultis; cur verisimile
 „ non erit, cum rami omnes sensibiles portæ, & ductus paralleli sint,
 „ insensibiles quoque atque adeò extremos eorundem fines esse paral-
 „ lelos, non autem, ut concipitis, seungi, ut ad alios „ directionis
 „ ex diametro oppositæ „ utrinque inclinentur. Et hic mihi legem
 „ contrariorum narratis; quæ si hic attendenda est, cum per vos ca-
 „ va ad angulum rectum cum porta concurrat, ductum ad angulum
 „ acutissimum cum porta concurrere, satis est: quod & Amplissimo
 „ infia 386. Lancisio placet qui rectum istum quidem concursum „ sibi nullo pa-
 „ cto probari posse, „ disertè affirmat. Cui operæ pretium est hic
 „ attendere quid noster ad extremum respondeat. Videlicet affirmat,
 „ posito etiam eo concursu ad angulos acutissimos, separationem bilis
 388. haberi posse. Addit: „ Nilque mutat de hypothefi, concipere-glan-
 „ dulosum concursum, seu folliculum, ut vas idem cum porta, &
 „ ductu bilario; aut ut ab utrisque distinctum. „ Concludit: „ o
 „ quan-

quantum fat est, in summa demonstrandi penuria, frustulum con-
ceptus emere ratiocinii pretio, qui si non saturaret, pascat saltem
esurientem (non enim audeo, ut tu, Mangete, ejus verba mu-
tare) pascat saltem esurientem ingenium. Quinimo oh

*quantum mortalia peiora cæce
Noctis habent!*

Hæc ergo illa *historia* erat! hæc illa erat *demonstratio*! Quid?
quod ne conjectura quidem est ejus quod fieri possit. Nam si con-
cipere debemus rem sic esse, ut quæ currit ad latus hepatis dex-
terum propago portæ, concurrat cum ramo excretorio per latus
sinistrum protenso; sequitur illud necessario, ut si hepar in al-
tero tantum latere penitus sit obstructum, aut funili gravissima affe-
ctione vitium, nulla in toto hepate bilis secretio fieri possit. Sic
enim sinistro ex. gr. latere vitio, non modò obstructi sint hujus la-
teris ductus excretorii, sed rami quoque portæ qui dextro lateri
prospiciunt, sint obstructi, necesse est. Verum jam me pudet in
hujusmodi commentis refutandis diutius versari, quæ tu historicæ Mal-
pighii descriptioni anteponeere non dubitasti.

ANIMADVERSI O XXIII.

Sed ecce adest jam modum expositurus secretionis animalis in
genere, & biliosæ in specie. Attendamus, quæso, quid
proferat. Nam in iis quæ tu omisisti, Capitibus; obsoletis jam
inanibus Veterum commentis, & penitus exutis Recentiorum
præjudiciis, hoc est duabus illis sententiis generalibus, in quas
circa causam secretionis dirimitur hodie Moderniorum popellus
(sic enim homo minimè magnificus de omnibus qui fuerunt, &
qui sunt, reverenter loquitur) ipse secretionis principium evidens,
mirabile, & simplex nobis statim sub oculis objiciendum spon-
derat. Quid quæris? spe statim excidimus. Sic enim incipit:
Cognita glandulæ hepaticæ structura: ut intelligamus (quod
etiam modò dicebat) se illam suam commentitiam structuram sup-
ponere, non modò in hepate veram esse, sed esse applicandam
proportionaliter cæteris glandulis conglomeratis. Itaque cum
ejusmodi fundamento se uti velle, significet, & reverà utatur; satis
constat, non esse cur in cæteris sigillatim perpendendis tempus con-
teramus. Præstabit igitur pleraque obiter perstringere. Cum ad
præparandas ad extricationem ab reliquo sanguine particulas in glan-
dulis fecernendas, conica, & ramosa arteriarum figura necessaria di-
catur, quatenus sanguis ad concurrentes harum parietes, & ad an-
gulos

*Commenta
quodam de
Secretione
Animali
& specia-
tim Bilis
confutatio-
ne.*
Hist. He-
par. c. 3.
§. 1.
Ibid. c. 5.
§. 6.

- gulos ex ramorum partitione resultantes alliditur, & sic discerpitur; cùmque ad bilis particulas ut pote magis implicatas, extricandas, extraordinarium, & ulterius hujusmodi artificium necessarium esse, aseratur; permirum est, magnam hujus artificii partem in eo poni, quòd sanguis ex quo bilis secernenda est, „ per tot arcus
 371. „ portæ, longosque meandros usque ad ejus truncum, & rursus ab „ ejus trunco per novas, & longas in ipso hepate ramorum divaricationes feratur. „ Nam à portæ radicibus ad truncum inversa illa figura est quæ in arteriis ad allidendum ita opportuna dicebatur; à trunco autem ad ultimos in hepate ramos etli illa figura restituitur, maximè tamen, ut in tota porta, debilis est ea vis à qua sanguis allidatur. Prætereo admissam in sanguine sine ulla dubitatione fermentationem; prætereo admissam observationem notabilis in sanguine portæ præ alio venoso amaritudinis, quam alii, ut Verheyenius, non admittunt, & eorum qui admittunt, nonnulli malunt, inde redditum bilis ex intestinis, quàm extricationem biliosarum particularum comprobari. Hæc, inquam, aliaque prætereo; non enim ego illi contradicere magis possum, quàm ipse sibi in II. Historiæ hujus Parte contradicat, cùm hunc ipsum portæ sanguinem quem hic adedò solum esse, contendit, ibi contendat, „ multò minùs „ solum esse in partibus suis quàm cruorem celiacæ, „ & illas portæ proprietates quas hic ad solvendum sanguinem adedò utiles deprædicat, easdem ibi inculcet, „ liquidi derivati lentoribus multum „ contribuere, & juvare ad sanguinem, non magis attenuandum, „ sed magis implicandum. „ Verùm ea quæ supra de artificio dixit ad bilis particulas adedò implicitas extricandas comparato, confirmari à contrariis, existimat, per artificium ad urinæ particulas adedò liberarè evolendas adhibitum. Contrarium enim hoc artificium esse, distitit, primum quia „ brevissima omnium via est à corde ad „ renales glandulas; „ quasi non esset brevior ad cellulas cordis adiposas, ad glandulas pericardii, asperæ arteriæ, aliasque hujusmodi; Deinde quia „ nullis penè est flexuositatibus, angulivæ præter majusculum unum, emulgenti, & aortæ interpositum, exter-
 403. nè divaricata; „ quasi hic angulus non esset ferè ex maximis, aut in Disertatione de Aneurysmate ipse non agnosceret: „ resisten-
 197. tiam eò notabilem esse in trunco Aortæ super aliam quamcumque „ arteriæ partem, quòd arcus ejusdem canalis non longè à corde notabiliter acutus fluentum sanguineum subito, & violenter inflectit; „ Tum quia „ internè, seu in renis corpore compendiosa est, „ & directà via usque ad secretionis locum; „ quasi verò, ut tu infra ex Malpighio ostendes, arteriæ intrà renes in arcum non cur-
 varen-

varentur, deinde in rete quoddam non implicarentur, tandem ad latera non reflecterentur. Itaque perinde ac si res *satis* elset *comprobata*, ad ulteriora strenuè pergit, dictitans: „ Ex ratione hac biliosæ, & urinosæ secretionis contraria, inferre hinc possumus re- 372
 „ spectu ad alias omnes animalis secretiones inter eas mediantes,
 „ ex varia emunctorii distantia à corde, — indèque & varia median-
 „ tium ductuum sanguinem devehentium angulositate, divaricatio-
 „ ne, & cavitare, præcipuè autem ex majori indè, aut minori in
 „ sanguine purgativæ fermentationis libertate, varias hinc solutio-
 „ nes fieri in sanguine, ut diversorum hinc generum liquida aut te-
 „ nuiora, aut crassiora sejungantur in itinere à tota malsa, ante-
 „ quam scilicet idem cruor ad colatorium appellat. „ Quæ quidem
 „ verba difficilior mihi fuit exscribere quàm sit cuilibet confutare.
 „ Quis enim est qui non videat, neque viam à corde ad jecur esse
 „ omnium longissimam, neque viam à corde ad renes esse omnium
 „ brevissimam, neque ut quisque discernendus humor tenuior, aut cra-
 „ ssior est, ita ad ejus secretorias glandulas brevior, aut longior
 „ à corde esse viam; quinimò eodem serè à corde intervallo & te-
 „ nuiora, & crassiora secernei, velut pericardii humorem, & circum-
 „ jectum cordi adipem, velut urinam, & circumjectam renibus pin-
 „ guedinem, velut denique (nam ad salivam ipse provocat) in eo-
 „ dem ore & crassior, & tenuior salivam. Neque effugium va-
 „ riorum angulorum, & flexuum, aut variz (quam tamen Viri be-
 „ ne multi doctissimi, & experientissimi nullam agnoscunt) in san-
 „ guine fermentationis usque adedò prodesse potest; quando is sanguis
 „ qui à corde ad meatus auditorium fertur, non modò non ita
 „ longa, sed neque ita flexuosa, neque ita ad remorandum apta fer-
 „ tur via ut is qui ad jecur deducitur, & tamen ex utroque ma-
 „ teria lenta, flava, amara separatur; imò velut infra agnoscit, ex illo 374
 „ magis *spissescens* bilis separatur quàm ex isto, contra atque fieri de
 „ ejus sententia oporteret. Sed „ totum, inquit, comprobat placi-
 „ tum analogia ex plantis deducta: „ quo in loco ejus in Plantarum
 „ Anatome peritiam singularem cum multa demonstrant quæ necesse
 „ non est hic attingere, tum verò in re ipsa Botanica quantum habeat
 „ usum, illud unum quo hic potissimum nititur, satis ostendit; „ Di-
 „ versâ, inquit, ramorum habitudo in arboribus diversæ speciei, 372.
 „ essentialis est adedò, ut dum in ejusdem speciei arboribus eandem
 „ semper perlustras diramationem, duas non invenias disparis fruti-
 „ cationis plantas, quæ ordinem distributionis ramosæ eundem præ-
 „ se ferant. „ Hujusmodi fundamentis, atque aliis quæ partim
 „ supra convulsimus, partim infra quàm parum firma sint, indicabi-
 „ mus,

- 373 mus, ejus est hypothesis imixa. Quam ut „ luculenter firmet „ exemplis, „ assumit: „ lactea vascula transversè ad angulos rectos, „ aut rectis parum dissonos cum fistula intestinali concurrere, „ nihil dubians, ut opinor, ea vascula à mesenterio intrà intestinum rectà pergere, non verò per ejus superficiem totam variè inflecti, atque diduci, ut in II. Adversariis ostensum est. Sed & Capsulam Cliftonianam, quam supra in descriptione „ ex tunica hepatis à peritonæo oriunda prognatam „ statuerat, vix addens: „ reie musculari compositam volunt Moderniores aliqui; „ hic, velut ipsi commodum est, „ secundum Accuratiores indagines verum esse muscolum, „ pronunciat; quasi verò Cowperus, qui eam pro peritonæi productione habet, nec ubique hepaticis vasis advolutam credit, inter Accuratiores non esset habendus; aut illud reverà, ut tu, Mangeat, adnotas, Bellinus *demonstrasset*; quod, ut de me fileam, certè Doctissimo Fantono non videtur. Quid attinet singula notare? ut cum vix sentit:

Nil agere exemplum licet quod licet resolvit:

- sive obscurum per obscurum dilucidare non licere, modum videlicet quo fit bilis secretio per modum quo fit nutritio: Ut cum à sensibilibus vasorum renalium directione insensibilium directionem infert, quod & fallax esse argumentandi genus, supra, ubi de vasis hepaticis agebatur, ostendimus, & multò hic fallacius ostendere possemus, cum illam vasorum directionem, ut renum propriam supponat quam horum anatome ex parte falsam, ex parte aliarum glandularum inspectio plerisque communem esse, convincit: Ut cum „ bilem hepatica subtiliorem „ in renibus ordinariò secerni, statuit, „ unde inquit croceus naturaliter urinæ color; „ cujus quidem colorem naturaliter croceum non esse, sed dilutè flavum, etiam si Medicus non esset, ignorare tamen non deberet; à bile autem non esse, ex Belliniana urinæ evaporatione didicisse poterat: Ut cum „ bilem declinato hepate „ per intestinales glandulas in cholera morbo effundi, „ pronunciat; quod vel me silente; ipse, ut solet, „ sibi parum constans, impugnat in II. hujus Historiæ Parte, multis verbis affirmans, „ succos limphaticos hoc in morbo foras è latibulis suis per exprimens stimulum elicitos, eo pingi colore, quem bilis ab eadem expressione eructata, eisque confusa adducet ex hepate, ejusque folliculo in duodenum, ita ut merè biliosa appareant hæc liquida. „ Atque hætenus indicata, „ cordatis, foliæque rei anatomicæ Cultoribus, „ ostendere satis arbitror, num melius fecerit, quòd hoc Caput ita concluderit: „ Et ecce simpliciter exposita secretoria, & excretoria glandulæ hepaticæ, ejusdemque

Animadv.
50.

369

Anatom.
of hum.
Bodies.

Anatom.
Diss. 6.

De Urinis
Part. I.

c. 4. §. 3.

374.

„ que secretionis modus, quoad circumstantias omnes, probatus; „ an verò quodd proximum Caput sic inceperit: „ Bilis igitur, in cu- „ jus secretionem explicanda, tantus profuit strepitus in Capite an- „ tecedenti, &c. „

ANIMADVERSI O XXIV.

Nobis quidem ea quæ hætenus notavimus, esse ejusmodi vi-
dentur, ut quamvis alia non adderemus, vel tibi ipsi tamen,
Mangere, tandem aliquando constare posset, quæ ἀρεστέα hæc Hi-
storia conscripta sit. Quapropter de multis jam pauca notabimus,
& pleraque quàm paucissimis. Quod ergo attinet ad bilis „ supra
„ totam cruoris substantiam toties decantatam crassitiem „ satis mihi
erit, Amplissimum Lancisium quid sibi ea de re videretur, ostendisse, infra 377.
cùm scripsit: „ profectò imposuisse tibi videtur crassities bilis,
„ jam à sanguine secretæ. „ Quod verò attinet ad usum bilis;
postquam eam opinionem in qua Vir Summus Franciscus de le Boë
Sylvius aliquid humani passus est, *deliramenta* (infra etiam *vanilo-* 378.
quia, & *fabellas* vocat) humanissimè nuncupavit, de propria autem
sic demissè locutus est: „ Nos simpliciora amplectimur; usumque 375
„ bilis inus exposuisti tam clarum, tam patulum, tam simplicem,
„ ut idem futurum sit ingenuo, & sapienti legere, & comprobare; „
post hæc, inquam, de saliva, quasi de hujus usu se esse acturum,
promississet, bene longum sermonem instituit. In quo nihil serè est
nisi tritum atque vulgatum præter nonnulla quæ ipsius, ut opinor,
peculiaria sunt, ut illa non obscura *contradictio*, cùm scilicet fateri
primum videtur, „ principiorum salivæ panspermiam, seu multipli-
„ cationem variam -- ob tantorum generum alimenta ab hoc latice,
„ tanquam à menstruo universali, soluta; „ deinde solutionem istam
haberi agnoscit *per humidum* salivæ, instructum dumtaxat „ salino al- 375.
„ calico volatili principio: „ Vel dum Ingeniosissimi Pitcarnii illi su- Animadv.
pra memoratæ quæstioni, cur à succo *digestivo* vel devoratos bru- 18.
torum ventriculos solvente, ventriculus ipse in quo assidue est ille
succus, non solvatur, dum, inquam, illi quæstioni satisfacere se,
credit, respondendo, devorata „ jam attrita fuisse in oris molendi-
„ no, & à corticibus suis, seu tunicis cingentibus discerpta, sicque
„ penetrabilia reddita ad actionem in ventriculo solutivam; „ quasi
verò eorum quæ non sic discerpta devorantur, nihil solutum, sed
omnia *inalterata* excernerentur, quando in piscium ventriculis aliorum
qui *integri* devorati sint, piscium non aliæ tantum partes, sed ossi-
cula, & *iquamæ*, & is ipse, „ qui vivus eludit solventis efficaciam, „

- ventriculus colliguatus consumptusque invenitur; cujus rei accuratam inprimis observationem attendi eam velim quæ à te, Mangere, ex
 si. pra 19a Cl. Brunnero est allata; vel quasi, si fortè ventriculus ab ingestorum asperitate, aut alia ratione nonnunquam intus aliqua ex parte excoriatur, tunc nihil ampliùs causæ sit quominùs ipse, vivens adhuc, solvatur, & concoquatur. Adde alia, ut cùm „ primum, & ul-
 376 „ tum chylificationis instrumentum in ore, ventriculo, & intesti-
 „ nis salivam „ pronunciat, obliis videlicet, ut nunc alia præter-
 mittam, virium aeris quem deglutimus unà cum cibis, atque adeò cum saliva ipsa, sortasse ad ejus particulas implicandas, & ad ventriculū secum rapiendas visciditate quadam donata. Sed leviora hæc sunt; illa verò nullo pacto ferenda, quòd salivæ idem humor,
 376. & pancreaticus „ per lacteorum orificia introducti, & imbibiti to-
 „ tam percurrant, & saturent galaxiam per lacteas duplicis generis,
 „ glandulas lumbares, ductumque thoracicum; — ideoque in chyli
 „ absentia viæ hæ omnes lacteæ limpido solum liquore hujusmodi,
 „ videlicet salivari subtiliori, turgidulæ se se offerant vîsui, — liqui-
 „ dum solum salivale vascula hæc lactifera perenniter adimpleat. „
 Quibus in verbis non multis quàm multi, & quàm graves errores sint, vide. Primum in partium *galaxia* enumeratione glandulas lumbares pro chyli receptaculo se habere, non obscurè ostendit. Deinde dum omnes vias istas lacteas, absente chylo, *solis* istis duobus succis turgere, dicit, non modò succi qui à ventriculi, & intestinorum tubulis, & glandulis destillans, tenuiorem sui partem immittere in lactea vasa potest, obliviscitur, sed tot lymphatica vasa quæ in chyli receptaculo, ductumque thoracicum lympham invehunt, ignorare prorsus videtur. Novissimè dum iisdem succis lactifera vascula *perenniter adimpleri*, affirmat, omnes omnium Anatomicorum observationes refragantur, ex quibus nemini non constat, eadem vascula perenniter, jam non dico, non adimpleri, verum sæpiùs ne tantum quidem humoris continere (etsi aliquo semper humectari, nemo inficiatur) quantum satis sit, ut oculatissimi & exercitatissimi homines, ubi ea sint, dignoscant. Quibus in omnibus erroribus eò minùs est convivendum, quòd hunc longum de saliva sermonem locus hic minimè requirebat, ut vel ipse constiteret, dum sic illum tandem aliquando concludit: „ Sed indignantem nimis salivam (imò „ verò bilem) movet exuberans hic rerum salivarium sermo. Veniamus jam ad rem nostram; ad bilis negotium. Ecquid jam igitur bilis in intestinum descendit? Hic cadentem expectabam. Attende. „ Attendere nos jubet suum illum bilis utum „ tam clarum, tam patulum, tam simplicem, ut idem futurum sit inge-
 „ nuo,

Ubi quæ-
dam bilis
impugna-
tur.

377

supra 366

Observ. 6.

De hum.
corp. fab.
L. s. c. s.

„nuo, & sapienti legere, & comprobare. „Ego verò qui ut can-
dore nemini, ita sapientia libens omnibus concedo, affirmare non
dubitabo, me legisse quidem, sed non probasse. Nam ideo bilem
in intestina immitti, ne horum parietibus chymus faciliè agglutinetur,
Sapientes fortasse probare poterunt; ego qui eundem chymum aut
ventriculi, aut superioribus duodeni parietibus, etsi nulla bilis inter-
cedat, ita agglutinari tamen, non video, probare faciliè non pos-
sum. Et sanè harum Partium omnium parietes assidue de se destil-
lante humore sic madent, ut naturaliter constitutus chymus, acce-
dente præsertim peristaltico earundem motu, non faciliè ipsis agglu-
tinari posse videatur. Neque verò quæ ad comprobandum hunc
usum profert, ejusmodi sunt, ut ab aliis ad longè alios usus potius
comprobandos adhiberi non possint; imò quædam ejusmodi sunt, ut
jure meritoque possint redargui. Quid enim est scribere: „in stru-
„thiocamelo, in quo bilis exoneratur immediatè in ventriculo, „vis
„insidet celeriter adeò digestiva, ut tolerata quadam hyperbole di-
„catur ferrum devorare, & digerere; „quid, inquam, hoc est,
nisi in tota hac re ita hospitem ac peregrinum se ostendere, ut tu
ipse, Mangete, qui in Theatro hoc tuo eas tibi partes sumpteras,
ut illius dicta „pro virili confirmares, „in adscripta Nonsula dissen-
tias, Cl. Vallinerii nostri objiciens anatomen accuratissimè iteratam.
Atenim sic „foras, addis, non minus commodè liquor bilarius in
„animalis ventriculum devenit. „Primum quando hoc accidit; cur
non & illud commodè explicare conaris quod vel pueri atque mu-
lierculæ falsum esse, non ignorant, videlicet struthiocamelum non
revera ferrum devorare, sed tantum „tolerata quadam hyperbole
„dici ferrum devorare. „

Dic aliquem fodes, dic, Quintiliane, colorem.

Deinde etsi potest bilis in ejus ventriculum devenire; non tamen
devenit, ut iste dixerat, *immediatè*. Denique, ut deveniat, illud
tamen quærendum restat, num tanta illa *vis digestiva* bili in ven-
triculum admixtæ accepta sit referenda. Nam & in Comite à Ca-
brolio dissecto porus choledochus ita prope pylorum egrediebatur,
ut non minus ventriculo, quàm intestinis bilem transmitteret;
sed hæc causa illi fuit non cur melius, cuiusve digereret, verum,
ut inquit Cabrolus, „cur sæpius nausearet, vomereturque. „At ve-
rò, inquit noster, „ex choledochi insertione in Remigis ventriculi
„fundo apud Celebrem Anatomicum Vesalium, summa in hoc vi-
„ro aderat voracitas, & chilofoeos promptitudo. „Quid? si de il-
lius Remigis voracitate, & chylofi apud Vesalium ne verbum qui-
dem; agnoscesne tum demum, Mangete, quam „Peregregius hic

- „ Vir in hac conscribenda Historia sedulitatem adhibuerit „? Nimirum ex quibus multa, in hoc præsertim Capite, desumpsit, ex iisdem hanc quoque summam illius Remigis voracitatem, Vesalio minime consulto, descripsit. Eorundem tamen Cl. Virorum contrariis rationibus, ut par erat, non satisfacit, antequam pronunciet, bilem „ sensiles intestinorum tunicas proritare ad defectionem acore „ suo; „ sic enim quasi bilis acida esset, contra non Latinorum modò, sed & Medicorum consuetudinem ejus acrimoniam vocare solet. Sed quid iste aliorum rationibus satisfaciendum sibi esse, ducat, qui J. A. Borelli, A. Nuckii, N. Reverhorstii, & aliorum sententiam (non quæro hic an tenendam; etsi post editam hanc Historiam Vir quidam Ingeniosissimus eandem tamen secutus est) qui summorum, inquam eorum Hominum sententiam „ modernorum alicqualium informia „ nuncupare non dubitaverit; neque id verbo negare quod tu supra in medio reliquisti; Vir autem Cl. Brunnerus experimento planè demonstratum censuit, videlicet „ in „ intestinorum cavitatem hiare meseraicas. „

ANIMADVERSIO XXV.

- 378 **V**erum enimverò repente me hinc abstrahit, & ad sui commiserationem transducit bilis, quam meatus cysticus „ tanquam vorago viam occupans, trajicientem ibidem placide, hujusque veluti præcipitii nesciam, deglutit, & per propriam cavitatem rap-
tat. „ Relinquebatur ut pro sua in *style historico* peritia, quo quidem „ hæc omnia se explicare, „ in Præfatione edixit, bilis calamitatem hanc tantam deploraret, aut ipsam deplorantem induceret, quid enim posset in eo genere, satis superque in II. Historiæ hujus Parte ostendit, ubi de Fluxu Hepatico scribens, repente se vertit ad Antiquorum Codicum infelicitatem deplorandam, ipsosque adeò suam causam agentes produxit. „ Miseri, inquit, Antiquorum Codices! „ Ecquid tanta vestrum sedulitas in signis veridicis hujusce morbi, „ plenèque distinctivis exarandis; ebuccinantes scilicet, defectionem esse sætidam, &c.? Ecquid; Dum Recentiores nostri turpissimam potius ignorantia obcæcari malunt, morbum palpabilem negando; quam vestros lectione dignari sudores? Eja: Dicite illis, „ quòd, siquidem audire vos nequeunt, audiant saltem Sodales suos, „ &c. „ Recentiores verò nostri non sunt tanta, ut ipse putat, ignorantia obcæcati, ut bilem ab hepate ad intestinum descendentem penè totam divertere in cystum, ita *indubitabile*, ut ipse postea dicit, existiment; ut cystum „ dividant communiter in collum, cervicem,

„cem, & fundum; „cū n ejus cervicem, & collum idem esse, com-
muniter doceant; ut de canali cystico „à cervicis apice ad ductus
„fellei insertionem verticaliter producto, & ascenso, „hoc est af-
cendente facile concedant, cū Bellinus non verticaliter eò produ-
ci, sed oblique, tradat, & ita quidem oblique, ut angulum cum
illo ductu contineat acutum ad partes jecoris, obtusum ad partes
intestinatorum; Cl. autem Ruyschius, ut infra tu ipse refers, in plurimis
vesiculis felleis humanis observari doceat, colli ipsarum, ut & du-
ctus cystici „reptatum esse serpentinum. „Cætera, & multò qui-
dem graviora, quæ Recentiores nostri non facile admittant, infra
videbimus. Est enim hic aliquid de quo, Mangete, inter me,
& te convenire non potest. Nam multa sunt quæ de cystis anato-
mie tradi possent quorum hic nonnulla vix memorata, pleraque non
determinata, nonnulla etiam prorsus omīsa comperit. Ea de re
ipsum quidem non ita reprehendo; ut qui profitetur, se „de hisce
„omnibus aliisque cystim spectantibus ulteriora non asserre, prout
„largissimè ab Anatomis Historicis venditata; ideòque hic superva-
„canea. „Te verò quomodo excusum, qui à principio pronuncia-
sti, te ipsius opera uti-propterea quia „non est quòd aliquid pro
„Hepatis plena descriptione, post Peregregii hujus Viri in id adhi-
„bitam sedulitatem desideretur? „Sed jam ad ipsum redeamus,
qui præter ea quæ ad vesiculam pertinent, cur structuram quoque
ductum bilis, de qua alio in loco dicemus, & hanc quidem sine ul-
la excusatione, prætermiserit, non video, nisi fortè quòd totus ef-
fet in quibusdam *observationibus*, ut ipse dicit, *nervosissimis*, quæ
tamen reverà non sunt magis nervosæ, quàm novæ. Prima est „obli-
„qua ductus biliferi in intestinum insertio, firmæ caruncule circu-
„lo armata, „quam censet, „liberæ in intestinum bilis percola-
„tioni, usque aded obliquitari, ut *facile* bilis retroacta, *ad subeu-*
„dum cystis meatum *compelli possit*; oblitus videlicet præter cætera,
se infra agnoscere, ductus *hepatis - cysticos*, obliqua licet insertione,
& tuberculo „adinstar prædictæ fibrosæ annularis caruncule „do-
natos, bilem nihilominus „semper in folliculum devehere. „
Altera observatio nequo est, neque aded esse perpetua potest; &
præterea animadvertendum est, ut intestino quidem esse jugiter
fuccos qui diluant, & motus qui promovèant bilem; non autem
in vesicula. De tertia nondum constat, utrū in homine, de
quo potissimum quærimus, locum habeat; & si etiam haberet, aliud
tamen probaret atque id quod in prima quæstione positum erat.
Quartam ut ex Doctissimo Bohnio facile exscriptis, ita animadverte-
re poterat, iudicio Gravissimi ejus Viri nihil aliud probare, nisi à
ductu

De Mo:
Bilis
Prop. 32.

320.

378.

346

381. 372

379

Circul.
Anatom.
Prog. 17.

De viis bi-
lis in Viper-
ra.

Blasii
Tab. 60.
Fig. 9.

Exercit.
de Hepa-
te.

ductu hepatico *aliquid* bilis folliculo infundi. Restat observatio quinta: in Viperis scilicet vesiculam ab hepate prorsus disjungentem, ac solo meatus sui cystici interventu cum poro bilario communicantem, „ judicandum relinquere, non tantum bile impleri ductum hepaticum rigante, sed insuper totam penè ejusdem ductus sarcinam „ ad eandem vesiculam devehiri. „ Cui quidem observationi satis esset opponere, in aliis verò animantibus, & nominatim in multis avibus ductus cysticum, & hepaticum seorsum pergere, & seorsum intestinum pertundere, ut in iis bilem ab hepatico in cysticum ire non posse, manifestum sit. Veruntamen de ipsis Viperis hoc quoque addam: me nunc quidem descriptionem, aut iconismum quibus illæ earum Partes magis ad vivum exhibeantur, non habere, quam quæ Blasius in suæ Anatomies Animalium Parte V. quæ est de Serpente, edidit, nisi quod in Viperis non observavi, ductum hepaticum, & cysticum communicare per ramulum *i*; sed manifestò vidi (qua de re in serpente ipse dubius hæret) in communem ductum coire, interdum postquam corpusculum *e*, quod & ipse Pancreas iudico, jam attingere, alias vero paulò ante quam ipsum attingant, scilicet ad *i*. Quæ cum ita sint, ex ipsa Blasii Figura intelligi potest, quam difficile sit, *totam penè* bilem quæ per hepaticum ductum descendit, per cysticum ad vesiculam ferri; non enim ea via est, ut in homine, brevis, & declivis; sed proportionem observatà valde longa, & maximè acclivis. Huc adde, me nonnunquam in Viperis id observasse quod ante etiam in Cuniculo videram, & non raro in Canibus Malpighius adnotaverat, plures videlicet ductus hepaticos, vel ut exactius in Viperà loquar, ex hepatico proficiscentes, infra cystici concursum in communem ductum consfluere. Alia prætermittimus cum ex iis quæ hætenus cursim adnotavimus, cognosci satis possit, num ex istis *nervosissimis* Observationibus conficiatur, totam penè bilem ex ductu hepatico in cysticum digredi; quanvis hic magnificè concludatur: „ Quod erat probandum. „

ANIMADVERSIO XXVI.

- 380 **P**orro ut bilem, quam penè totam in vesiculam detrusit, inde extrudat; huic operi congruam potentiam dicit se *invenisse*, pervulgatam scilicet in hanc rem ventriculi per vices turgentis compressionem, quam non modò ab ingestorum mole, sed sine ulla dubitatione etiam „ à fermentativa rarefcentia quadam „ deducit. Et hic pariter „ circa ventriculi actionem ad bilis bursum, faventes
- 380- „ habet tres observationes conspicuas. „ Prima est, „ quod in ani-
„ ma-

„ malibus post longam inediam evisceratis, cum flaccido, & concide-
 „ dente ventriculo, exuperanti semper bilis copia turgescens, & ple-
 „ na cystis offenditur; in aliis autem „ contra. Non hic dicam,
 non videri ipsum id observasse in canibus ex inedia denatis, ut in
 quibus infra scribit, se „ vesiculam fellis „ (non quidem bile ple-
 nam) sed tantum „ bilem adhuc continentem „ vidisse. Illud po-
 tius dicam, supra ipsum scripsisse: „ in animalibus fame extinctis in-
 „ testina copiosa bile referta adnotari; „ Cum ejusmodi autem ob-
 servatione non sanè ita *conspicuum* est quomodo ista altera consen-
 tiant, in iisdem semper turgentem, & plenam bile vesiculam inveni-
 ri, aut quomodo cum eadem consentiat, non dico id potissimum
 quod supra statutum ab ipso est: obliquam ductus communis infer-
 tionem, adjectamque carunculam, „ biliosæ quantitatis in intestina
 „ influxum nullo alio naturaliter præterquam chylosoos „ (quæ hic
 quidem nulla est) „ tempore permittere „; sed dico id inprimis
 quod statuerè nunc intendit: nisi accedat ventriculi (qui hic quidem
flaccidus est) turgentis compressio, nullam vel in distenta vesicula ef-
 se vim, qua possit bilem extrudere, & objectis omnibus obstaculis
 victis, in intestina compellere. Secunda observatio est, quòd
 „ cervus, equus, aliaque bruta, quæ – penè continuò devorant, si
 „ eis sinitur, – fellis vesicula carent, prout perpetua stomachi tur-
 „ gescencia eam receptionis biliaris imparem, ideoque inutilem red-
 „ deret; dum cæterum ob ejus defectum profluit indefinenter per
 „ ductum hepaticum absque diverticuli interruptione bilis ad intesti-
 „ num, ibidem ad continuam penè functionem necessaria. „ At si
 bilis „ profluit indefinenter; num bruta de quibus hic loquitur,
 obliquâ illâ ductus infertione, & carunculâ etiam carent; an verò
 usus huic infertioni, & carunculæ supra adscriptus est nullus? Præte-
 rea si in istis brutis bilis „ profluit indefinenter; „ quomodo infra
 scribit: „ de facto in animalibus cysti destitutis, ut columbis, equis,
 „ mulis, cervis, &c. canales bilarii suppleant hanc vicem recep-
 „ tuculi; non secus ac in avibus cloaca supplet vices vesicæ urina-
 „ riæ; „ nam ex avium quidem cloaca, renum excrementum *inde-*
finenter non profluit. Non ergo ita *conspicua* est hæc secunda obser-
 vatio, sed ne id quidem, quid sibi velit. Nam cum statuat, colum-
 bas etiam cysti carere; num id quoque conspicuum esse dicet, in
 his „ perpetuam esse stomachi turgescencia; „ in tot autem aliis
 avibus quæ cysti non carent, non esse? Verùm enimverò quibus
 tandem animalibus turgentia ista major, aut diuturnior contingit,
 quàm ruminantibus? His tamen cystim datam esse, non negat. Sed
 addit, ob id ipsum quòd ruminant, non assiduam, sed „ interpola-
 „ tam

379

372.

379.

380

380.

381.

„ tam in iis esse biliosi affluxus necessitatem . „ Fateor; sed illud tamen contendo, aut non minorem, aut etiam majorem esse à nondum ruminatis, ut pote plus spatii occupantibus, quàm à ruminatis cibisurgentibus ventriculi; Igitur ante tempus cylindri comprimet, & bilem in intestinum extrudet . Postremo quæ bruta sunt cane, aut lupo voraciora? Columba tamen cysti caret; ipsa non caret: imò (idque in tertia observatione ponitur) lupos, atque ursus illam habent „ proportionaliter grandiores, & antiquam magis ventriculo . „ Non quæram hic, utrum id verum sit; quanquam in uno à Parisiensibus observatum sciam, vesiculam fellis longè esse quàm in leone minorem, in quo Borrichius observavit esse mediocrem; dabo, esse grandiores; sed illud quæram, num hæc animalia quæ agnoscit esse „ voraciora, & vegetius chylicificantia, „ minus sæpè voratura sint quàm cervus, quàm equus, in quibus tamen ob id ipsum nullam vesiculam, esse vult; quam in uno, & lupo contendit esse grandiorem . Nimirum ita *nervosa*, ita *conspicua*, ita inter se consentientibus observationibus utitur; qui etiam dum comparationem illam addit : „ sicuti valida extensio aortæ, per alternas „ diaholes ad glandulas lumbares facta, impetit aded cisternæ vicinæ parietes, ut liquida contenta per perpendicularares vias thoracicas – propellat; sic etiam robusta stomachi per vices expansio &c. „ nonne pergit nervosa, conspicua, & sibi constantia proponere? Nam quid nervosius, quàm ab arteria magna ad ventricululum in re hac transilire? quid magis conspicuum, quàm per extensionem aortæ ad glandulas lumbares factam, cisternam vicinam comprimi; quasi verò chyli receptaculum ipsum per se aorta non contingeret? quid denique magis constans, quàm supra in enumeratione viarum chyli à glandulis lumbaribus ad ductum thoracicum transire; hic autem præter lumbares glandulas cisternam addere? Eiusdem constantiæ est *annulam* cystis *fibrosum* supra censuisse vix ac ne vix quidem esse attendendum; hic autem eundem „ potens ex se satis retinaculum esse, „ dicere : hic agnoscere, „ perfici quiescentem bilem, & ad chylosoos operam præparari, evectis, explicatis, ac nobilius fermentatis activioribus elementis suis; „ supra autem, in cervo, equo, aliisque brutis „ ad continuam penè eandem functionem, „ indefinenter abque diverticuli interruptione bilem ad intestinum „ profluere . „

Apud
Blaf. Anat.
Anim. P.I.
c. 40.
Ibid. c. 37.

326

479

३३८.

ANL

ANIMADVERSI O XXVII.

JAm verò tranſeamus ad Ductus Cyſt- hepaticos, five mavis Hepati - cyſticos, quos „ patienti curioſitate, & exactiſſimo ſtatu, „ cultri, oculi miniſterio „ perſcrutatum ſe eſſe, dicit. Sed ut melius æſtimare poſſimus, quantum denique in his proſecerit, animadvertenda ſunt duo, alterum: etſi ipſe diſtinet: „ horum omnium „ canalium uſum ad unicam bilis in recipiens ſuum deportationem „ decantatum fuiſſe; „ re tamen vera plures ante annos conſeſſum eſſe à Verheyenio: cuſmodi „ ductum ſe ſe nonnunquam exonerare in ductum hepaticum; quando nimirum veſicula per meatum „ cyſticum non tempeſtivè deponit ſuam ſarcinam; „ alterum: quòd hic dicitur: „ in grandiorum animalium jecinore reperta primò fuiſſe „ ſe hæc vaſa, ad humanum indè & hepar appropriata; „ id etiam poſt improbos hujus labores verum eſſe; ut qui bruta, in quibus ſe ſe exercuit, memorat; humanum autem jecur ne in tota horum ductuum deſcriptione memoret, diligenter cavet. Itaque ſic habendum eſt: quamvis in humanà etiam veſiculà certa quædam oſcula, aliquam ſtyli portionem admittentia interdum ſaltem videamus; graviſſimos tamen Anatomicos, & in his Cowperum, dubios hære an ſemper occurrant, multòque magis an cum hepatico ductu communicent; nam neque ea quæ in brutis, in homine ad id oſtendendum valent artificia, & familiare illud Verheyenio argumentum: ita in brutis; ergo & in homine: quàm ſæpenumero fallax ſit, liquet. Igitur etſi fieri poſeſt, ut hæc omnia in cæteris etiam animantibus, ipſoque adòd homine retégantur; interea tamen tota hæc commentatio in perpaucis tantum brutis locum habet. Et in his quidem deprehendiſſe ſe fateatur, minutos etiam illos ductus ad ipſam hepatis ſubſtantiam deſinere creditos, *non minùs* ac reliquos, „ ex ipſiſ „ met pori bilarii ramis exoriri. „ At quid aſſert quòd id credere poſſumus? „ In hepate, inquit, ſuillo, quod erat ultimò præ manibus, „ - duos ſolum ad pori propagines - inſequi poteram. „ Quot autem reverà ſunt? „ Numerofiſſimi, inquit, ſed ob exilitatem inquisitionem anatomicorum operam facile eludentes. „ Is ergo mihi ſe inveniſſe abſolutè confirmabit, minutos etiam illos ductus cum ductu hepatico communicare, cum in ea quam unicam aſſert, obſervatione de tanto ductuum numero duorum, non ampliùs, communicationem ſe viſiſſe, fateatur? Age nunc aliud videamus quod *præcipuè*, atque *attentiùs* obſervari ſe, dicit. Minuti, inquit, iſti ductus „ ramofitates habent ſuas „ ad ductum hepaticum, & „ ad

De Duſtibus
Cyſt-
hepaticis,
five Hepa-
ti - Cyſti-
cis.
381.

J. I. tr. 2.
c. 17. quod
in I. Edit.
cit. c. 15.

Anatom.
of hum.
Bodys.

loc. ſuper
citat.

382

H

„ mi-

„ minus duobus principiis ex eo pullulant ; quæ indè ramositates
 „ ante vesicæ contactum in cespitem coalitæ , eo indè unico in eam
 „ aperiuntur . „ Cæteri ductus „ è contra truncum habent suum ad
 „ ductum (hepaticum) diramationes autem quâ parte communicant
 „ cum vesiculâ ; in quam non unico trunco , sed intrant principiis ad
 „ minus duobus . „ Insuper *solum* primi illi ductus „ obliquè in cy-
 „ stis tunicas inferuntur , ac tuberculo ad eorum hiatum donantur ;
 „ non autem cæteri . „ Primos illos infra appellat *Hepati - cysticos* ,
 „ cæteros *Cyst - hepaticos* . Hisce observationibus innituntur quæ de-
 „ inde proponit , ea scilicet ex quibus „ maximam in animali machina
 „ utilitatem animadvertere se , „ dicit . Mittamus quæ supra dixi-
 „ mus , hæc contrahenda esse ad bruta illa perpauca , & priorem ob-
 „ servationem non satis esse probatam . Has tantum ultimas cum Ob-
 „ servationibus comparemus Viri in his persequendis ductibus exerci-
 „ tati , & cujus peritia , ac diligentia nobis aliquantò magis spectata
 „ sit quàm istius Scriptoris . Verheyenius igitur , quemadmodum exhi-
 „ bet in ea Figura quæ tibi 16. est in Tabula LXIII , sic observavit ,
 „ atque descripsit . Ductum illum D , quem iste appellaret *Cyst - hepa-*
 „ *sicum* propterea quia truncum habet c ad ductum hepaticum , ra-
 „ mos autem ad vesiculam , in quam non unico trunco , sed intrat
 „ principiis duobus 1. & 2 , ductum , inquam , illum ad duos illos suos
 „ hiatus in vesicula singulis ad singulos *tuberculis* donari , vidit : quod
 „ non nisi primo ductuum generi , hoc est Hepati - cysticis conveni-
 „ re , iste dicitur . Contra , ductum istum alterum D , cujus id omni-
 „ no proprium esse , contendit , quoniam ex eorum genere est qui
 „ uno orificio in vesicula aperiuntur , scilicet ex Hepati - cysticis ;
 „ Verheyenius vidit maximo quidem orificio 3. hiantem , sed minus
 „ conspicuo , quia *non* , ut duo illa orificia priora , *tuberculo promine-*
 „ *bat* . Et si nulla videantur proferri posse quæ isti magis advenien-
 „ tur ; unum tamen adhuc observavit Verheyenius , atque ex parte
 „ descriptione , ex parte Figurâ eâdem luculenter ostendit , quod
 „ istius cogitata omnia funditus evertit : rivulorum videlicet qui in
 „ utrumvis genus istorum canalium plurimi confluunt , illos quidem
 „ qui ductui hepatico sunt viciniore , eo modo in istos canales ten-
 „ dere , ut transitus ab his in illum facilius appareat ; eos autem
 „ qui circa alterum canalium extremum influunt , sua insertionem ma-
 „ gis ipsam vesiculam respicere . Provocet jam iste ad Doctissimum
 „ Bellinum , atque ajat , esse ab hoc in Dissertatione de Motu Bilis
 „ demonstratum : bilis cursum „ infallibiliter à cavitatibus minori-
 „ bus in majores dirigi , seu à ramis „ in truncum , non autem è con-
 „ tra . „ Nos quoque ad eundem provocabimus , atque admonē-
 „ bimus

Ibid.

himus esse ab ipso in eodem loco demonstratum: bilis cursum dirigi per truncum *versus obtusum* influentium rivulorum *angulum*, non autem contra, idest eam versus plagam quam ramusculorum in ductus hosce convenientium insertio magis respicit, non è contrario. Itaque judicandum videtur: intrà hujusmodi truncos bilem ex una quidem parte in vesiculam, ex altera in ductum hepaticum fluere, nisi tamen causa quæpiam nova interdum totam cogat in alterutram partem fluere: cujus rei gratia credibile est, truncos ita esse factos, ut hinc in vesiculam, inde in ductum hepaticum desinant. Non est igitur „ hoc curiosum (sic enim vocat) vesicæ fellæ, ductuum, „ que biliariorum commercium ita duplicatum, „ & constitutum, ut existimat.

Prop. 30.

ANIMADVERSI O XXVIII.

Hic juvat me ab istiusmodi Hepatica Historia desesum, quasi in aliquod peropportuno diversorium, ad subiectam à te Notulam paulisper digredi. Bidloum in suis Vindicis observare, scribis, Cystis fellæ Calculos aquis innatare, atque igne totos comburi. *De Cystis fellæ Calculis.* Eos *aque innatare*, jam olim Fernelius (cujus deinde ipsa ferè verba, quamvis nomen omiserit; exscripsit in Anthropographia Riolanus) in Pathologia adnotaverat: quod & nos aliquoties experti sumus. *l. 2. c. 22. l. 6. c. 5.* Igne verò totos comburi cum multò sæpius experti sumus; nonnunquam tamen aliquantò aliter rem se habere, deprehendimus. Qua de re, & de calculorum eorundem structura non injucundum est pauca scribere, fortasse etiam non prorsus inutile. Cum enim hujus naturæ calculos interdum per alvum exturbari, observatum sit à Medicis, & nominatim ab eodem Fernelio, cumque adeò ipse annis superioribus apud V. Cl. Vallisnerium nostrum unum ejusmodi viderim, qui ut, præcedentibus ventris cruciatibus acerbissimis, dejectus fuerat, ita quid esset, & unde esset, non omnes faciliè intellexerant; idcirco non frustra hic ea attingentur unde faciliùs, cum excreti fuerint, dignoscantur. Quodd ergo aquæ immergi, non ut ii qui de urinaria vesica extrahuntur, in imo subsideant, sed innarent, supra dictum est. Quodd verò non utcumque comburantur, sed flammam alant, sic olim Bononiæ deprehendi. Extraxeram de fellea mulieris cujusdam vesica centum & viginti ferè calculos superficie omnes sic satis firma, & lævigata, sed varia magnitudine, atque etiam figura, quanquam omnes, uti ferè solent, à cuboidæa longissimè non aberant. Mecum erant, ut plerumque, pro communiter naturalium studio; & singulari inter nos amore Jacobus Bar-

tholomæus Beccarius Professor Bononiensis Eruditissimus, & Heraclius Manfredius Clarissimorum Virorum Eustachii, & Gabrielis Frater, ætate minor, non ingenio. Hi ex illis calculis unum cum lucernæ fortè admovissent, turgere, & ebullire primò calculus, & nihil ingratum olere, tum flammam concipere, atque servare, in guttas colligatus decidere, & subinde inter arandum cum levi crepitu scintillare, denique ad extremum usque flammam alere, ut neque ita perstantem, neque ita claram ea alar cera quæ ad epistolas obfigandas ex usu est. Alios flammæ admovimus; & omnes eadem præstiterunt. Exinde ego observationis confirmandæ percupidus, quos primos in alia vesica fellea comperi calculos, eos statim lucernæ admovi; sed leves quidem crepitus edidere, flammam autem non servavere. Quod quidem peculiari vitio ejus in qua concreverant, bilis accidisse, arbitror; cum hi calculi non modò in flamma non liquefierint; & quod capilli olent combusti redolerent, ac longè friabiles essent, sed præterea intus, forisquæ ita nigricarent, potius ut carbones quàm calculi esse viderentur; quando illi primi tum omnia quæ ante docuimus, post annos duodecim adhuc præstant, tum intra plura flavescentia plerumque strata, & tot quasi lineolis ad centrum tendentibus distincta, flavam bilem (primis diebus mollem, post in nucleum ex obscuro croceum concretam) manifestò, atque eleganter concludunt. Quinimò cum paulo post mihi ad manum rediissent subvirides quidam calculi, quos duorum & septuaginta numero in alia cysti fellea tribus ante mensibus inveneram, nucleum ejusdemmodi biliosum continentes; hi flammam aluerunt, & cætera omnia quæ primi illi, observanda nobis præbuerunt. Aliud quoque, discindendo primos illos, & hosce ultimos calculos, & discissos conferendo, animadverti, videlicet secundum calculorum primorum stratum viride esse, primum verò ex albo flavum, quod cum nondum hisce ultimis calculis superinductum perfectè esset, hinc subvirides apparebant. In nonnullis autem ex primis illud etiam observavi: ea strata se se alternatim excipere, videlicet ut primum ex albo flavum, & secundum viride erat, sic tertium ex albo flavum; quartum autem viride esse. Ex eo tempore de omnibus quos in vesicula inveni, calculis (tot autem, & toties inveni, ut ego quidem, Mangete, non dubitem, quin si omnes qui inveniuntur, ab Anatomicis alservarentur, pro usu Medico posent sufficere) qui sub flavis illis; aut subviridibus fuerunt similes, ii flammam servavere; qui autem nigris illis; quo ex genere invenisse unum memini qui nigredine, granosa superficie, ac magnitudine morum repræsentaret; hi flammam non servavere. Calculos autem nigros in bile ex atro
flava

flava, cæteros illos magis obvios in pallida sæpius memini deprehendisse. Et mihi quidem fortè contigit, ut ex neutris ullam unquam peculiarem noxam, sed ne ictericum quidem colorem iis in quibus comperi, indutum esse, observaverim.

ANIMADVERSI O XXIX.

Sed redeamus ad Historiam Hepaticam, in qua posthac, ne infanti simus, ex pluribus quæ notanda essent, quædam indicabimus potius quàm notabimus. Et primum inter causas motum sanguinis per venam cavam urgentes „ valis amplitudo, ~ & brevis à 384 „ motus impulsus distantia „ ponitur. „ Ad ductus bilarios in hepatis concavo nullæ occurrere dicuntur musculares potentie; „ quasi proximi diaphragmatis alternus motus nihil valeret, nihil posset. Modus quo Boyleus, & Papinius ossa in liquidam substantiam solvunt, „ familiare exemplum „ esse dicitur. Affirmatur; 384 „ ventriculū digestivæ elixationis tempore, jam in inferiori orificio à sphinctere, & mechanica tortuositate occlusum, in altero insuper, seu superiori orificio ab adjacentibus visceribus, sinistrorsum à lienis corpore, dextrorsum, & præcipue à grandiori, & magis accumbente Hepatis mole premi adeò, & constringi, ut „ tanquam operculis strictè apposis occulus transpirare non sinat „ activiores menstrui salivaris particulas à digestivo confictu exaltatas, ac extricatos jam ipsiusmet malsæ cibariæ spiritus. „ Quæ si ita traduntur perinde ac si ab his visceribus superius orificium tam occludi posset, quàm inferius est occlusum; animadvertendum est, inferius ipsum orificium non ita esse occlusum, ut non modò spiritus, sed & satis elaborata ac tenuior chymi portio subinde illac non egredietur; lienem verò præsertim, ad orificium superius non sic pertinere: si verò hæc ita traduntur, quasi ea viscera ventriculi parietes sic obducerent, ut eos spiritus non sinerent egredi, profectò neque eosdem parietes totos obducunt, & per eos parietes per quos ipse paulo post docet ingredi „ halitus illos calidos humidosque ex 385 „ calido humidoque hepate expirantes, qui inde in ventriculi cavum penetrati, ad ciborum solidiorum eliquationem unà cum saliva „ facessant, „ per eosdem, inquam, quare spiritus non egrediantur? „ In vipera scribitur & summè energeticum esse stomachi munus, „ & hepar non tantum supra, & circa ventriculū, sed „ usque ad duodenum protendi. „ Sed primum non probatur; imò permirum est, inter voraciora animalia viperam recenseri, quæ, Redio teste, ad decimum usque mensem inediam toleret; alterum num

Degli
Animali
Viventi,
& Osserv.
int. alle
Vipere,

num ita sit, dubito. Negatur, quidquam „ claris illustrare pos-
 „ se parrium fistulæ intestinali adjacentium munus ad digestorium
 „ opus humido earum calore fovendum, quàm omenti v. g. diffun-
 „ ctionem à dicti canalis incubatu in variis morboſis caſibus ſucce-
 „ dentem, quàm indè notabilis excipit indigeſtionis habitus. „ Et
 Anthrop. tamen ipſe olim Riolanus adverſus ejuſmodi omenti uſum inſurgere
 l. 2. c. 15. non dubitaverat propterea quia „ multoties in vulneribus, & herniis
 „ viderat magnam omenti portionem abſciſſam ſine ullo depravatæ
 „ coctionis incommodo, & apud Foreſtum legerat, juvenem, abla-
 „ to omento, abſque ullo ventriculi detrimento vixiſſe. „ Deni-
 „ que „ Celiaca primum aortæ emiſſarium „ eſſe dicitur, quod evi-
 „ dentiſſimè falſum eſt. „ In Portæ autem trunco, & diramationibus
 „ tertiam circiter partem totius ſanguinis in homine exiſtentis con-
 „ tinuò reſidere, „ ſine ulla dubitatione pronuntiatur, quod ſaltem
 „ maximè incertum eſt. Hæc tamen duo ex iis ſunt unde illud erui-
 „ tur: „ uſum eſſe hepatis ſecundarium, ut ſanguinis diverticulum „
 „ ſit, ideo nominatim *neceſſarium*, quia ob „ exercitia fortiora, aut
 „ irregularia animi pathemata ſanguis turgelcit, „ quaſi verò hepa-
 „ tis ſubſtantia promptè, ac pro re nata ad modum laxiorum mem-
 „ branarum valde cedere atque extendi poſſit. Ne id tamen in du-
 „ bium revocare quis audeat, ejus ſubjicitur, non demonſtratio tan-
 „ tum, ſed plena demonſtratio, ſcilicet ubi ſcribitur: „ Uſum huius-
 „ modi Hepaticum plenè demonſtrant hemorrhagiæ narium in levi-
 „ bus etiam hepatis, & lienis obſtructionibus ordinariò accedentes. „
 „ Quæ quidem num ita *ordinariò* tunc accedant, omnium, quicumque
 „ medicinarum faciunt, judicium eſto. Eorundem quoque erit judica-
 „ re, num „ facilitùs quàm hætenus fuerit, iſte morboſus hepatis omnes
 „ internolcat, inter ſe ſe, ſedeſque ſuas, differentias, & cauſas di-
 „ ſcriminet, „ quemadmodum inter initia II. huius Hiſtoriæ Partis
 „ non obſcurè pollicetur. Certè cùm toties hallucinatus ſit in iis, „ quæ
 „ ad hepatis theoriam ſpectant, „ in hætenus examiatâ Parte I;
 „ non eſt difficile arguere quòd I. ejusdem Partis *manuductione* perducì
 „ potuerit in II. „ complectente ea quæ ad hepatis morboſos pertinent; „
 in Praefat. in quorum tamen „ ſignis nihil immoratur, „ hac videlicet addita
 „ admiranda ratione, quòd „ ſtylo utitur hiſtorico. „ Sed quoniam
 „ tu iſtam totam II. Partem ſapienter omiſiſti, & nos multa quæ in
 „ eadem notanda eſſent, omitemus. Quæ tamen ne qualia ſint, quæ-
 „ ras; de multis quàm pauciſſima ſic per tranſennam indicabimus; Ut
 „ c. 1. §. 3. „ oſſa quædam duriora ad tantam redigi mollitiem poſſe, ut inſtar
 „ cere verſari facilimè poſſint in omnem ſenſum in ſano quòd ad cæ-
 „ tera homine, „ hoc eſt ſine ullo *vizio fluidi* univerſalis: Ut „ De-
 „ ſcen-

scensum, sive Prolapsus hepatis, ligamentorum ejus omnium relaxationi deberi; „ quasi verò ipse venam umbilicalem inter hepatis ligamenta non posuisset; aut hujus umbilicalis ligamenti relaxatio ad prolapsum hepatis pertineret: Ut „ vesiculæ fellæ per-
 „ rptionem sæpe in cadaveribus occurrere: „ Ut „ suspectam jure
 „ esse dicere apertionem ad exteriora hypochondrii ad abscesum
 „ Hepatis eo tramite foràs elutriandum; „ & perpaucis paginis
 interjectis, ubi de cadavere agitur in quo ingentem hepatis *melice*. Ibid. §. 11.
videm comperorant „ intempestivam increpare Chirurghi formidinem
 „ à se in tumoris invalescentia sæpius ad apertionem stimulatam: „
 Ut non ferendâ non modò etymologiæ; verùm etiam medicorum
 vocabulorum ignoratione docere: „ Atheroma dici à Medicis à ma- Ibid. §. 10.
 „ teria sua sevo simili; Scheatoma autem ab humore lento, & glu-
 „ tinoso pultem, aut cremorem referente: „ Ut in generalibus vi- Ibid. §. 14.
 „ scerum abdominis obstructionibus quemvis legitime affirmare pos-
 „ se, primogenitam fuisse obstructionem Hepatis: „ Ut „ præci- c. 6. §. 1.
 „ puam ad vitam animalis facientem secretionem biliosam esse: „
 Ut denique (ne cùm perpaucissima hic promiserim, plura profe-
 ram) „ status eo frui in animalibus imperio, ut liberè per univer- c. 11. §. 4.
 „ si corporis ambages, non secùs ac vermium seminia, celerrimè
 „ que expiari possint. „ Itaque ut sapienter fecisti, quòd hæc
 prætermiseris, ita sapientius fecisti quòd iis quæ attuleras, Amplissi-
 mi Lancisii Epistolam subjeceris. Ex hac enim, quamvis incredibili,
 ut is solet, humanitate scripta, Lectores tamen attenti faciliè intel-
 ligent, Virum Gravissimum, Historia Hepatica perlecta, nihilomi-
 nus disertè ea ipsa affirmare quæ in illa negantur. Non enim credit,
 nihil in hepate Malpighium nisi nomen glandulæ innovasse, sed veras
glandulas, veros *glandularum folliculos* adhuc agnoscit. Non 386.
 credit, lymphatica vascula „ in extrema solum superficie capsulæ „
 subsistere, sed censet, lympham quæ antea bilis particulis intermixta 387
 erat, absorbere. Non credit in primis id quod in Historia maximè
 inculcatur, ea ratione bilem secerni qua Auctor proposuerat; sed
 ipsius *diligentiam* non obscurè desiderat, imò apertissimè „ duo illa, 386.
 „ in quibus totam explicandæ rei rationem posuit, sibi nullo pacto
 „ probari posse, dicit, ac minimè decere diligentem, solertemque
 „ Anatomicum „ in rebus *hæere* istiusmodi. Quid multa? homi-
 nem cogit non modò, velut supra dictum est, ut quæ „ demonstra- 372.
 „ ta à se esse, jactaverat, „ vix pusillâ conjecturæ face evadere,
 „ agnoscat; sed ut postquam significavit, velle se „ invios quaterere 388
 „ ulterius recessus, „ incipiat ab iis ipsis quæ incalsum scripserat in
 „ Historia, iterandis. „ Cætera autem quæ addit, quàm nihil sint,
 hic

388.

hic ostenderemus, nisi ex his quæ scripsimus supra, id colligi satis posset. Ex quibus eò facilius spero te quoque, Mangete, collecturum, esse quæ „ pro Hepatis plena descriptione post Peregregii „ hujus Viri in id adhibitam sedulitatem desiderentur; „ quod apertius id fateri in hoc demum loco te, video; nam quæ „ ex elaboratissima Historia Hepatica excerpisti, ita sufficere dicis pro vi- „ sceris structura, & muniis intelligendis „ ut tamen „ alia ad eandem explicationem ulterius facientia „ in duabus proximis Tabulis continuò subjicias. De quibus jam nonnulla dicemus.

ANIMADVERSI O XXX.

ET primùm Tabulæ LXII. Figuram 1. ut apud Bidloun, ita apud te esse inversam, ajo. Quo de Bidloi errato si Scalptores tuos monuisses, longè ipsis facilius fuisset in ea Figura describenda illud vitare, quàm sequi. At quando Scalptores non monuisti, utinam Lectores saltèm monuisses, & Tirones præsertim, qui haud satis scient, magisne huic, an tertiz quæ est ex Reverhorstio, Figuræ, imò an quartæ quæ ex eodem est Bidloo, credendum sit. Eisdem quarta hæc ipsa Figura aliquid negotii faceret propter errores, alios quosdam Bidloi, à te diligentius, quàm ejus verba servatos; nam litteras C, & S non simplices, & uno in loco, sed duplices, duobusque in locis exhibes; pro Canali autem Venoso de quo ad litteram S, cum ut ego cenleo, & Glissonii, ac Kerckringii Tabulæ satis confirmant, id quod est inter G, & H, ostendendum esset, id quod est inter H, & F ostendis. Illud tamen vel Tirones ipsi in hac Figura animadvertent, quàm parum ramusculorum Venarum Cavæ, & Portæ inter se directiones cum iis consentiant quæ ab Austore Historiæ Hepaticæ proponuntur; nec mirum, cum ipsa quoque Bidloi verba adversentur, quæ in Explicatione Figuræ 1. ad litteras K. K à te proferuntur. In iis autem Figuris quæ in proxima Tab. LXIII. ex eodem Bidloo exhibes, etsi est ubi tuam diligentiam desiderem; nam neque 3. est satis accuratè descripta, & in 4. frustra id perquiritur quod ab ipso ad E litteram monstratur, contra atque in 17, quæ ex Verheyenio est, in qua, perperam geminatà litterà C, Ductus etiam Communis pro Ductu Hepatico ostenditur; tamen hæc missa faciam, & ad nonnulla quæ ex Solertissimo Ruyschio exhibentur, descendam. Ex Figura igitur 7. ejusque Explicatione intelligere omnes poterunt de iis Glandulis quas olim Malpighius in suilla, & ovilla vesicula observaverat, quid Ruyschio videatur. Nimirum ab Summis duobus hisce Anatomeis, vel

Vid. &
Heister. in
Eph. N. C.
Cent. VI.
Tab. V.
Fig. 1.

390

Exercit.
de Lien.
supra 160

vel aliud agentibus, ex Glandulæ jam olim fuerant luculenter propo-
sitæ de quibus Historiæ Hepaticæ Auctor in prolixo, & ea inscriptione
ornato Opere vix obiter fecit mentionem, & iis quidem verbis, ut
cum, utrum ipse admittat, ignores, tum illud certè satis intelligas
quod addit: „ Bilem per hæc glandulas fecerni, ridicula est aliquo-
rum confabulatio. „ Qui humanissimus loquendi modus quàm
gratus sit futurus, haud scio, non modò Sylvii Sæctatoribus, de quo
fortasse ille intellexit, verùm etiam æquis æstimatoribus Malpighii,
& Ruyschii quibus illa eadem verba non satis cavent, ut qui licet à
Sylvii opinione longissimè abjerint, portionem tamen aliquam ejus
bilis quæ in vesicula continetur, ab iis Glandulis prodire, existima-
runt, ut ex Adnotatione à te supra exhibita, & Malpighiana de Lie-
ne Dissertatione satis constat. Structuram autem intimæ superficiei
Vesiculæ, imò & Meatus Cystici, Ductuumque Hepatici, & Com-
munis ne memoravit quidem; de qua tamen non modò hic Ruys-
chius, sed & Malpighius in eadem Dissertatione verba fecit, illam
in bove, sue, equo, piscibus, & homine ipso parum ab ea differre
docens quæ in ventriculo, & intestinis piscium, & boum observa-
tur, in quibus scilicet cellulæ quædam, seu inæquales areæ ex pa-
rum assurgentibus, & se se intersecantibus parietibus spectantur. Et
sanè elegantissimum illud rete, quo etiam in homine memoratorum
Ductuum, & Vesiculæ nominatim superficies instruitur, non ex sim-
plicibus fibris, sed ex membranulis tenuissimis constructum, describi
aptius non potest, quàm cum Ruminantium Reticulo comparando.
Aliæ hujus Tabulæ Figuræ quàm discrepent ab Historiæ Hepaticæ
commentis, supra indicatum est. Itaque ad alia transeamus.

378.

379 380

380.

ANIMADVERSI O XXXI.

TUa sequitur Renalium Glandularum Historia non modò nullis,
quod ia ejusmodi Theatro mirandum est, subnexis earum Fi-
guris, sed iis ipsis quas eidem Historiæ, in Bibliotheca Anatomica
ex Warthono (quamvis parum acturatè descriptas) interserveras,
detractis. In describenda etiam earum structura deficiis. Nonnulla
enim post Warthonum in iisdem observavit Malpighius, nonnulla
etiam Fantonus; quorum Solertissimorum Hominum ne nomen qui-
dem hic reperio. Nec verò, quod dicis, „ in earum descriptione
„ præcipuam non consistere difficultatem, „ ita verum fortasse est,
& quando esset, non tamen propterea ad „ totius Anatomie ideam
„ non parum accuratam, „ qualem quidem in Præfatione vel per
ipsas Tabulas pollicitus eras, exhibendam, quidquam de structura
Par-

Epist. de
Gland. su-
pra 227.
Anatom.
Diss. 7.

392.

De Renum
Succentim-
vatorum
U/su.
l. 1. tr. 2.
c. 19.

Partium decebat omittere. Nec prætereundus facile erat Verheyenii dissenſus, qui diſertè „ errare eos dicit qui ſcribunt, humorem „ earum Glandularum abſumi à venis, & ſanguini miſceri in vena „ emulgente, cùm venæ non hient in illarum cavitatem; „ quapropter ſe alienum non eſſe ab eorum ſententia, oſtendit, qui pecu-
395. lieres earum ductus *adhuc incognitos* eſſe, exiſtimant. Ac quamvis nihil hic ego diſturus ſim quod ita accipi velim quaſi inter eas, & aliorum, atque adeò tuam ſententiam judicarem; diſſimulare tamen non poſſum, ſi iſtæ Glandulæ „ inſerviant ſanguini à renibus poſt „ lotii ſeroſi ſeparationem redeunti, ideòque minùs fluido, à coa-
gulatione, & coitu ſervando, „ ut tu cum Sylvio exiſtimas; ſatis non intelligi, cur ita in foetu magnæ ſint, quando ab hujus ſanguini plus ſeri per renes ſeparari, non eſt veriſimile, neque cur earum humor ibi ſanguini non addatur, ubi hic ſubſiſtere, & coire faciliùs poteſt, videlicet intrà renes, ſed demum intrà emulgentis venæ ramum, imò intrà ipſum (nam eò ſæpe iſtarum Glandularum venæ influunt). Cavæ truncum, in quo ab reliqui ſanguinis copia ſatis diluitur. Atenim *Natura Glandulas hæſce* prope renes *perpetuò collocavit*; quaſi verò eaſdem prope alias ullas Partes præterea non collocaret, ac nominatim prope Chyli Receptaculum, Duſtusque Thoracici initium. In quæ ſi eas conjicerem per vaſa lymphatica continenter lympham immittere aut ad chylum diluendum, aut ad vias patulas, lubricaſque ſervandas; non ita fortasſe mihi officeret memoria earum in foetibus magnitudo, cùm in his aut nullus ſit chylus, & ſic majori lymphæ copia ad eas vias apertas ſervandas opus ſit, aut ſit quidem chylus, ſed perpaucus, ſed ſub otiante diaphragmate, & ſic ad eum promovendum multò plus lymphæ requiratur. Verùm id qualiſcunque exempli potiùs, quàm conjeſturæ proponendæ gratia dictum ſit.

ANIMADVERſIO XXXII.

JAm verò de Renibus dicendum eſt; de quorum *generali deſcriptione* quidquid præmitis, id ſerè omne ita ex Verheyenio exſcriptum eſt, ut plerumque ne verba quidem ipſa mutaveris. Per-
396. pauca interſeris, ſed ne hæc quidem tua, Renum videlicet Etymologiam in libris Anatomicorum vulgatam, & alia ejuſdemmodi, qua ſunt exempla Renum numeri interdum vel imminuti, vel auſti, quæ ſerè omnia, atque alia præterea jam olim collegerat, atque edidit Blafius: quo in loco admirandum eſt, te de „ unico tan-
In Appen.
ad Hellen.
de Renib. „ tùm reperto „ Rene dicentem, eas minimè obſervationes memo-
rare,

rare, in quibus is non in medio, sed ab altero latere inventus est; cum tamen hæc ita sint præ illis frequentiores, ut quo nos tempore Bononiæ fuimus, non modò à Cl. Valsalva acceperimus, id sibi & in Monacho, & in cuniculo visum, verum etiam is quem supra laudavimus, Manfredius in Adolescente, & nos ipsi in caretella observaverimus, ita omnes quidem, ut manifestissimè constaret, alterum renem non morbo absumptum fuisse, sed à primordiis defuisse. Malletem, aliquid Verheyenio addidisses ex quo ejus sententia eluceret, ubi dicit, *inequalem* ut plurimum in homine renem, situm eorum munerì convenire; tu autem hanc non modò non illustriorem, sed & obscuriorem reddis, dum ita exscribis, ut num de hepatis munere, an de renis dicatur, incertum sit. De Renum figuræ, superficie, ac magnitudinis varietate quædam nemini (non dicò Anatomico aliquantulum exercitato, sed lectori) non obvia interferis; illud autem faciliè tuum, quòd Renum, longitudo super quatuor prope vertebrae extendatur; illud quoque tuum, quòd interior Renum tunica sine adhærentis substantiæ laceratione avellatur; nam Verheyenius quidem scripserat, „abique notabili substantiæ adhærentis laceratione. „ Protrita sunt quæ de connexionē addis; quod autem de nomine arteriarum & venarum emulgentium; videlicet sic ab officio vocari, id verò ad venas præsertim quod attinet, inter Recentiores est inauditum. Tandem aliquando Verheyenium nominas, quasi istic solùm ab eo sumeres, à quo quæcunque supra, arque infra habes, serè omnia sumpsisse, omnes deprehendent qui utriusque verba conferre voluerint. Atque ut reliqua prætermittam, num magis ipsius peculiaris est observatio, in qua ipsùm nominas, de emulgentium numero, an verò altera, in qua haud nominas, de isto eorundem vasorum ramo qui ab rene ipso egressus cum vasīs spermaticis videtur communicare? Nam quem Eustachius in Tabula tibi I. Fig. 4. ad litteram *a* & Fig. 5. ad litt. *b* delineaverat, ad Tunicæ Adiposæ vasa pertinet, quæ quàm ad Renem ipsùm non attineant, illa etiam caretella in qua nos alterum deesse renem, vidimus, confirmare poterat; nam cum ipse quidem ren suis cum vasīs deesset, ejus tamen exterior membrana quæ plerisque in canibus vix dici potest adiposa, tanta adipis copia redundabat, ut primo aspectu subesse renem, crediderimus. Cæterùm num ille ramus reapse ita, & semper se habeat, tu quidem videris; quemadmodum num facilius sit ea ratio ostendendi vasa Renum lymphatica quam pro Verheyenii ratione subtilius. Nam de nervis quod addis, ne ipse quidem ignorabat, ut alibi luculenter ostendit; quod autem de aucto interdum Ureterum numero à te observato, id verò, neque illi, ut

I. i. cr. 2.
c. 18.

396.

Ibidem.

397

De Renum
Pelvis.
Ibidem.

ipse nosti, neque cæteris inauditum, nobis etiam ipsis aliquando observatum est. Cùm autem ajo, quæ tu addis, vulgata esse, haud sanè propiærea improbo arque contemno; hoc dumtaxat volo, non esse ranti, ut ob hujusmodi pauca interjecta additamenta descriptio- nem istam, non ut Verheyenii, sed ut tuam proponere deberis. Nam ista dempta observatione, quid demum de istis quoque Ureteribus hic affers quod ex Verheyenio non exscripseris, nisi illud fortè quòd cùm is ita scripsisset: Ureteres quæ Pelvim constituunt, „ facile ad amplitudinem pollicis expandi; „ tu ita scribis: „ in am- „ plitudinem pollicis ad minimum capacem extendi. „ Re autem vera quod ille scripsit, tantò minùs à vero abesse, crediderim, quan- tò certius memini, de sex Pelvibus, à me nuper in variis cadaveri- bus examinatis, unam pollicis capiendò parem, cæteras autem prorsus impares fuisse. Erat tamen aliqui quod hic melius Verheyenio posses tum, ut alibi dicemus, addere, tum etiam in ejus dictis mutare. Non enim ita verum est, Ureteres in Pelvim expandi *in renibus*, sive, ut tu loqueris, „ antequam ex renibus egrediantur, „ & Pelvim esse cavitatem reni inrinfecam; „ Siquidem Ureteres jam antequam Renem attingant, incipere solent sensim in Pelvim dilatari. Hujus autem divisio in duos primùm, interdum & tres majores ramos etsi plerumque intrà eum oblongum sinum, seu quan- dam quasi fissuram quæ in concava Renum parte ad vasa etiam exci- pienda secundùm longirudinem insculpta est, delitescit, parietibus cum Renum substantia non cohærentibus, sed interjecto adipe abea- dem disjunctis; tamen id, quod etiam Eustachium vidisse, video, tum Cl. Santorinus, tum ego non ita rarò observavimus, ut illa quoque ipsa Pelvis divisio extra eum sinum extaret, ramis non ampliùs in unam caveam (nam Malpighius id aliquando videtur vidisse) intrà Renem coeuntibus. In his autem omnibus rebus ita fre- quens varietas est, ut sæpe in uno eodemque cadavere neque initium Pelvis, neque amplitudo, neque ramorum numerus, neque ipsius divisionis locus in utroque Rene, quamvis secundùm naturam constituto, ad eundem modum se habeant.

Tab. ad
Theatr. 1.
Fig. 9.
liv. 7.
Exerc. de
Ren. infra
404

ANIMADVERSIO XXXIII.

QUæ sequuntur, jam in Bellinianæ Dissertationis Argumento in Bibliotheca Anatomica edideras, in qua ea quoque omnia vi- deo quæ ad Malpighii Dissertationem hic adnotasti, excepto uno vel altero verbo quod de celebratissima illa Cl. Lirrii Observa- tione addidisti „ qua nulla hætenus, inquit Eruditissimus Fantonus „ in da-

402
Anatom.
Diff. 7.

„ indagandæ renum structuræ majorem lucem videtur attulisse, „ & de qua ego memini cum alios bene doctos Malpighii Sectatores, tum nominatim Ingeniosissimum Virum Dominicum Gulielminum, ita loquentes audivisse, ut quicumque eam observationem perpendissent, eos ad Malpighianæ Renum structuræ comprobationem nihil præterea desiderare posse, judicarent. Verum neque Gulielminus, neque Fantonus, neque alii qui ad hunc modum censuere, satis esse existimaverunt de illa observatione ea tantum novisse quæ tu profers. Vis enim ipsius potissimum est non in istis quas exhibes, sed in aliis quas omit-
 tis ejusdem Litriæ Tabulæ Figuris, vel potius in exacta illa intima vesicularum structuræ, ac canaliculorum in ipsas influentium, & ab iisdem descenditum descriptione quam Litrius quidem proposuit; tu verò ne uno quidem verbo attingis, aut indicas. Ex illo enim structuræ modo non obscuro, non abnormi, non dissimili, sed perspicuo, sed summo artificio atque elegantia perfectò, sed in am-
 bus renibus uniformi & constanti, ac denique observato jam in fanis corporibus à Malpighio satis consentaneo, ex eo, inquam, col-
 ligendum illi existimarunt, non fallacem, & quæ vi morbi fortuito contigerit, phasim eam fuisse, sed certam, naturalemque structuram ab retento intrà molles adhuc, atque adeò cedentes particulas lorio amplificatam solum, atque detectam. Hæc igitur ea sunt per quæ Malpighii Asectæ apparere satis, credunt inter arteriarum capilla-
 menta, & eos canaliculos ex quorum fasciculis renales papillæ com-
 pinguntur, Glandulas, hoc est vesiculas intercedere, non autem istas solum vasorum contorsiones; „ quorum dilatactioni, aut etiam per-
 „ ruptioni „ istiusmodi structuras cum tu deberi dixisti, satis putas omnia conciliasse: quod ut nonnulli fortasse credant qui eam Litrii observationem apud te legerint; illos certè qui apud ipsum Litrium legent, non faciliè esse arbitror credituros. Nam ut de me ipso fa-
 tear; si fortè illas grandiores Cellulas quas aliquoties vidi sub pro-
 pria membrana Renum altè intrà hos conditas, irregulari figura, nullo manifesto orificio pervias, & urina, aut certè humore urinæ simillimo plenas, si illas, inquam, Cellulas ex obstructis, & sic di-
 latatis, aut etiam disruptis excretoriis canaliculis deduceres, non valde repugnarem; de ista verò tam elaborata structura quam Litrius vidit, non faciliè adduci possum ut assentiar. Cæterum ex ista Li-
 trii observatione aliquando mihi venit in mentem: si in canibus, aut aliis animalibus recens natis, & in quibus idèò facilius cedere Partes
 queunt, ureter, aut alius etiam Glandulæ ductus excretorius ligaretur, & deinde animal quò diutius liceret, vivum servaretur, ma-
 jorem fortasse ab hoc experimento fructum ad Glandularum structu-
 ram

De Renum
 Structura.

370

De quibus-
 dam mor-
 bosæ Renū
 Cellulis.

Ad Renū,
 alteriusque
 Glandula-
 rum stru-
 cturam mo-
 nifestandā
 Cogitatum.

ram cognoscendam capi posse, quàm ex ligatura venarum, aut etiam eorumdem ductuum in adultis instituta capiatur. Sed & ea quæ Malpighius in illius suæ de Renibus Dissertationis calce attingit, nunquam legi, quin animadvertierim, siqui fortè sint qui ad seminis præparationem tantum Renibus tribuendum putent quantum olim Viri plures Doctissimi tribuerunt quorum nomina, atque argumenta Bartholinus commemorat, & tueri conatur; in eorum sententiæ examine prætermittendum non esse illud alterum experimentum in quo, rene altero exempto, animal, ut Experientissimus Zambeccarius ostendit, in vivis servatur. Iusto enim spatio temporis interjecto, quid in subiecto teste, aut ovario, horumque contentis accidisset; siquid ramen accidisset; observari posset, dummodo (quod interdum facile, & præsertim in sinistro rene eximendo, posset contingere) nulum de vasis spermaticis læsum esse, constaret.

ANIMADVERSIO XXXIV.

QUOD reliquum est; in adjecta Tabula LXIV. primum lætor, Figuram 1. jam non hic, ut in Bibliotheca Anatomica, inversam exhiberi. Deinde vasa sanguifera quæ secundum Pelvis, & Uteris longitudinem tum in hac, tum in proxima, aliisque Cl. Ruyschii Figuris pinguntur, talia nullo calculo in Uterere subsistente, nulla injecta cera, vidisse me, memini in nonnullorum cadaveribus qui sine ulla sanguinis effusione repentinam mortem obierant, in quibus etiam, dum Renem comprimerem, sanguis per ea vasa deorsum ruebat, eademque magis expandebat. Quod autem Ruyschius (cujus tu Figuras duas num. 3. notatas exhibes, sed unam tantum explicas, oblitus videlicet alterius in qua papillam ex tribus papillis compositam pingit) quodd, inquam, Vir iste Oculatissimus pluribus Figuris in Renum superficie vascula sanguifera ostendit in modum vermiculorum contorta, id multò magis dubia ea reddit quæ à Vetheyeno & descriptione, & iconismo traduntur de iisdem vasculis ibidem quasi stellulas representantibus. Et Malpighius quidem „miros vasorum ramos sub extima renum superficie „latitantes quandoque conspici, „supra docuit eo ipso in loco, ubi „rotunda quædam, & brevissima corpora ad instar exiguorum vermium circumvoluta „in eadem Renum superficie apparere, dixit. Sed hæc omnia ille quidem oculis microscopio instructis observavit. Ego autem inermibus oculis in terrestri, & marina testudine Renum superficiem quasi ex tot contortis intestinalis cerebri anfractibus imitantibus compactam observasse, memini, eandemque stru-

405
Aliud ad
examinan-
dam semina-
tionem quo-
rundam de
Renum in
semine præ-
parando
utilitate.

Tab. 110.
F. 34.
De Pelvis,
& Uteris
Vasa san-
guifera.

De Renum
superficie,
hæcque
Vasa.
L. 1. tr. 2.
c. 18. Tab.
12. Fig. 1.
lit. B.

398.

stutam, quæ in terrestri certè testudine interiùs etiam spectabatur, in viperarum quoque renibus vidisse. Humanorum autem Renum superficiem quotiescunque inermibus oculis inspexi, eorum quidem substantiam in confertos & compressos quasi globulos minutissimos distinctam videre visus sum, quos singulos circumvoluta ad ipsorum basim sanguifera vascula ambirent. Quorum vasculorum ut pleraque ad hunc modum vidi plerumque disposita, sic eorum nonnulla semel tantùm atque iterum aut uno dumtaxat in loco, aut certè in paucis inveni stellulas imitantia, non tamen exactè, sed ea prorsus ratione qua non modò in facie interna urinariæ vesicæ interdum vidi, verùm etiam in superiorum Tabularum LL. Figura 11. circa medium, & LIX. Fig. 7. ad supremam litteram C, ac LIII. Fig. 11. ad litt. D; ut alias omittam; spectantur. Ex quibus intelligere omnes poterunt, istam Verheyenii; qualis ea cunque est; observationem nec esse perpetuam, & multis etiam aliis Partibus esse communem.

ANIMADVERSIO XXXV.

Quid attinebat in superiore Capite Ureteres describere, quos hic eras iterum descripturus? At de ipsis ibi, inquis „egi-
 „ mus uno verbo; hic autem specialiùs. „ Uno quidem, vel
 altero tuo verbo (nam pleraque Verheyenii fuerunt) descripsisti; verùm id ipsum cùm supervacaneum fuit, tum etiam admirandum est, quòd eorundem canalium bis data descriptione, ipsos tamen neque rectè, neque plenè, neque constanter descripsis. Non enim rectè describis, cùm „ à renibus proficisci, & egredi, „ utrobique dicis, quasi verò ipsa infima cui continuantur, pars Pelvis extra Rēnes esse, atque extare non soleret. Non plenè describis; ut enim mittam eorum in ipso extremo, quo in vesicam hiant, orificio coarctationem, & carnea duo corpora in quæ ipsos produci, in I. Adversariis admonui; utrobique omittis ab aliis etiam proposita, ut eam diametri inæqualitatem de qua dictum est in Adversariis II. quæ videlicet causa est cur sæpe inter descendendum ad vesicam, in ipsis Ureteribus subsistant calculi: ut eam pro cavitatis ratione parietum crassitudinem, qua etiam, opinor, efficitur ut hi aliquantò faciliùs obstruere distensis intestinis, atque utero possint, ne urinæ viam pre-mendo intercludant: ut demum Glandulas lentum quandam ac lubricantem humorem secernentes quo Ureteres adversus urinæ injurias muniantur; quæ quidem Glandulæ in dilatatis Ureteribus interdum à me quoque observatæ sunt. Non denique constanter describis,

397

407

De Ureteribus.

num. 9.

Animad.

47.

- 397 scribis; supra enim dixeras, „ nervos accipere à trunco intercostali,
 407. „ ac lumborum medulla; „ hic autem „ nervos ais admittere à sex-
 „ to pari, & à lumbis: „ quo in loco ut inconstantia in re ipsa re-
 prehensionem effugere fortasse possis; in vocabulis quidem rerum
 satis effugere non potes; quâ ex unâ inconstantia summa apud Lecto-
 rum multos obscuritas hic existat, necesse est. Ex iis autem quæ
 subjicis de Vesica, quot demum sunt quæ ex Bartholini Anatome
 11. c. 10. quantum renovatâ non sumpseris? Quod dum cupis aut res transpo-
 nendo quasdam, aut verba hic illic mutando dissimulare, non semel
 laboris. Ita enim intentus es ad ea quæ ex Borrichio duobus in lo-
 cis ille adducit, in unum jungenda, ut quæ de Vesicæ vasis interjici-
 cit, prorsus excidant, atque ita in tota Vesicæ Historia nihil de ejus
 nervis, de ejus vasis sanguiferis nihil dicas. Num autem quod ille
 scripserat: „ De fibris sphincteris accuratius quæ observavit Borri-
 „ chius noster merentur expendi; „ num, inquam, tu rectè sic
 mutaveris: „ De fibris sphincteris accuratius hæc observavit Borri-
 408. „ chius; „ si quidem Bartholini sententiam sequi voluisti; judicent
 Grammatici; si verò ab eadem recedere; judicent Anatomici.
 Hæc te, Mangete, ex quo hanc ipsam Ureterum, & Vesicæ Hi-
 storiam in Bibliotheca Anatomica edideras, intrâ tot annos haud
 animadvertisse, eò magis mirandum est quòd hanc eandem Histo-
 riam te nuper recensuisse, constat ex duobus potissimum locis in
 quibus Bartholini verba non dispari felicitate mutavisti. Cum enim
 ille scripsisset: „ adè ut quæ pulmonem non habent animalia, ve-
 „ sicam quoque non habeant, „ cumque tu olim hæc ipsa verba
 descripsisses, nunc eadem sic rescribis: „ adè ut quæ pulmonem
 „ non habent animalia, si quæ talia dentur, vesicam quoque non
 „ habeant; „ quasi verò constare tibi possit, an Vesica non sit in
 iis animalibus, quæ ipsa an sint, non constet. Ille etiam scripse-
 rat: „ cervix carnosâ est, quæ vulnerata propterea coalescit, cum
 „ cætera vesicæ vulnera sint lethalia ut plurimum ex Hippocrate. „
 Hæc tu olim his verbis exscripseras: cervicis „ substantia cum præ-
 „ cipuè carnosâ sit, incisa faciliè coalescit, ut id quotidie qui cysto-
 „ tomiam passi sunt, experiuntur, secus quàm in vesicæ vulneribus,
 „ quæ ut plurimum lethalia sunt, accidit. „ Nunc istud *utpluri-*
num in aliquando mutavisti, non animadvertens scilicet, cervicis
 etiam vulnera aliquando esse lethalia, atque ita omnem istius com-
 parationis vim concidere, atque evanescere. Sed alia aliàs fortas-
 se notabimus. Nunc ad tuæ istius finem Historiæ properemus.

ANIMADVERSI O XXXVI.

QUI acus, & olera, atque alia istiusmodi ab ore in vesicam descendisse, tradiderunt, iis, fraudem factam suspicaris, cum hæc per aliam forsitan semitam, ipsam nimirum urethram, in vesicam clanculum seu in viventibus, seu in mortuis intrudi poterint. Ego verò, Mandete, etsi in plerisque ejusmodi narrationibus subesse fraudem, faciliè suspicer, ut qui res istas nonnquam in matulis præfuisse, aliàs etiam à libidinosis mulierculis in vesicam ea ipsa qua tu credis via intrusas esse, deprehenderim; nimis tamen durum existimo de narrationibus iis omnibus idem judicare, inprimisque de illis ex quibus constat intrà viventium virorum vesicam non ita parvas acus fuisse. Non est enim virilis urethra *nonnihil* tantum, ut tu supra de ejus parte hic potissimum attendendà scribis, *contorta*, sed adedò inflexa est, ut iis qui ipsam in sua inspexerint sede, non ita proclive sit intelligere qua ratione illac ad vesicam pervenire acus potuerint. Quæ tamen dum scribo, cave credas, me ex eorum esse numero qui pro urina, ut vocant, potus promptè ad vesicam deducenda, ductus quosdam à ventriculo, & intestinis ad vesicam tendentes comminiscuntur. Hos enim ductus qui ponunt, eos nunquam credo quid contingat illis animadvertisse qui ob suppressam vitio renum urinam decedunt. Cum enim his tot poriones à multis sæpe Medicis ingerantur; quæro quid causæ sit cur nihil earum per hos ductus in vesicam descendat? Hærent enim calculi, aut aliæ ejusmodi causæ in renibus quare nihil quidem urinae, ut vocant, sanguinis haberi possit. At in ventriculo, at in intestinis quid causæ tum hæret quare per eos saltèm ductus ita, ut putant, crebros, ita patentes nihil urinae potus delabatur? Attramen ejusmodi ægri nihil mingunt, & postquam demum obiere, omne (si quidem cadit sub sensus) in renibus vitium, nullum in ventriculo, nullum in intestinis, & nihil urinae in vesica observatur. Quid ergo est? Eas acus aut per vias quas ex intestinis ut aliò etiam interdum, quemadmodum observatum est, ita in proximam vesicam sibi sensum faciant, aut per alias quas cum tot præterea rebus homines ignorare, non est mirum, eò pervenire, libentiùs crediderim, quàm aut per virilem urethram, aut per eos ductus, quos commentitios esse, satis, ut opinor, ex iis quæ sunt dicta, intelligi potest. Quod reliquum est, non mirari nequeo, te qui in naturali Vesicæ constitutione, quæ ad tuum institutum unicè pertinebat, describenda vix *paginam* paginam impleveris, ejus morbis quinque, aut sex paginas tribuere.

De acubus
intrà Vesicam
sem repen-
dit.

Vid. in
Ephem.
N.C. Cët.
V. Oöl.
26.

Non perva-
lentes via
pro urina
ut vocant
potus ad
Vesicam
sunt admi-
scenda.

De Dilata-
tionibus
quibusdā,
& quāsi
Herniis
utriusque
Vesicæ.

buere. Atenim vesicæ Casauboni historiam proferre placuit, cuius fabrica, ut à communi discreparet, non tamen tota credita est morbo, sed primævæ etiam constitutioni deberi. Ego quidem eò potius adducor ut totam morbo deberi credam, cum in strenuo quodam Potatore in quo ad summam vesicæ partem duas à dextris subrotundas cellulas inveni, singulas cerasi majoris capaces, singulis orificiis lupini diametro cum vesica, cui parietum structura consimiles erant, communicantes; aliarum ejusmodi cellularum initia in reliquo etiam fundo observaverim; nam in quibusdam quasi arcis quæ à majoribus vesicæ lacertis ambiebantur, tunicæ jam extorsum cedere incipiebant. Ejusdemmodi quoque cellulam cum selles mulieris cuiusdam vesicula communicantem vidisse, memini, & certis ex notis morbosam judicasse. Itaque à laxiore quibusdam in locis parietum structura, & ab nimia interdum retenti humoris copia ejusmodi Vesicarum Dilatationes, atque, ut ita vocem, Hernias deduco.

Anatom.
quart. re-
nov. l. 2.
c. 20.

Sed quando alii aliter maluerunt, fac, cellam istam Casauboni vesicæ adnatam à primordiis præexistisse; nonne poterat, ut Bartholinus, eam totam fabricam perpaucis verbis proponere? Cur ergo tot alia, curque duas præterea Epistolas „ de Calculi, & Caruncularum Vesicæ extractione, „ quas cum priore in Bibliotheca Anatomica edideras, hic iterum addidisti? Nimirum Librorum moles nullo labore sic crescit; cui rei magis quàm susceptæ spartæ pro tua virili portione ornandæ nisi tu, Mangete, studuisses, non his profectò istam quoque „ Mechanismi in Vesicæ Collo „ ab Historiæ Hepaticæ Auctore *detestæ* non minus fabulosam quàm prolixam *Explicationem*, quamvis tibi „ honorificentissimè inscriptam „ superaddere voluisses. Num enim ista „ sit apprimè utilis, num apprimè demon-
414 „ stret id quod Diligentissimus, ac Curiosissimus ille Anatomicus „ intendit, haud scio an proclivius tibi fuerit pro tua facilitate verbo affirmare, quàm mihi sit pro veri studio prolatis rationibus, atque observationibus contrarium ostendere.

ANIMADVERSIO XXXVII.

415 **P**incipiò „ fundi vesicæ, cervicis, colli, & urethræ „ pro sua auctoritate *confinia legitima* statuit; pronunciatque ideo, „ in „ foeminis urethram non adesse. „ Si id sibi concedi postulasset, ut in hac Explicatione uti divisione illa, & nominibus ita posset, non erat facile concedendum propterea quia istiusmodi appellationes tam imperitè selegit, ut earum usu *confusionem non declines*, sed augeat; quis enim assuescere possit longè alii rei intelligendæ, cum *vesicæ collum*

collum legerit, ac cum legerit *cervicem vesicæ*? At non id postulat; sed, ut dixi, securè statuit, atque pronunciat; quasi verò qui vim vocum non intelligit, eum cæteris præscribere verum esset quæ ratione loquerentur. Sed cum tu ipse, *Manete*, in tua superiore Vesicæ descriptione ne verbum quidem mutaveris, ut ad hujus præscriptum loquerere; tantò minus cæteros id existimo esse facturos; itaque ad ulteriora veniamus. „Rumpunt, inquit, in scopulum cum-

„*Et* Anatomici: describunt vesicæ sphincterem, & non reperiunt. „ Quid ergo? Num Falloppius, num Cowperus, num Fantonus quod non viderunt, describere? num quod se vidisse, testantur, non videre? Nolo quidquam gravius dicere, præsertim cum manifestum sit, tantis Viris mea defensione, meæ observationis confirmatione opus non esse; quis enim de ejusmodi Hominibus id possit existimare? Illud tantum dicam quod longè credibilis est, quodque aded de isto musculo scripsit Falloppius: „inexercitatis dissectoribus non „ adesse potius, quàm adesse videtur. „ Atenim Falloppius, & cæteri quod non est, viderunt; quod autem est, non viderunt, „ non „ advertentes scilicet movere prostates, & abraderè, ut statim oblatus sibi, passumque subter—notabilem musculum videre possent; — faciem internam, & totam prostatarum corpore lambentem suo, — in quo fibrarum ordines — distinctè circulares, fasciales, seu annulares observantur, „ quem hic *verum, seu legitimum sphincterem* nuncupat. Ego verò qui vel olim prima statim perquisitione illum Falloppii Sphincterem & vidi ipse, & aliis ostendi; in tribus cadaveribus continenter dissectis, quorum vel minimæ quæque fibræ carnes longè erant conspicuæ, frustra prostates movi, frustra quanta maxima potui diligentia abrafi, frustra & ipse oculorum aciem intendi, & eos qui aderant, Auditores meos, quorum nomine duos potissimum intelligi in his cunctis Adversariis volo, à me plurimum in secundo, observandoque exercitatos, Jo. Baptistam Vulpium, cujus opera in publicis utor dissectionibus, ac Julium Pontederam Philosophiæ, & Medicinæ Doctores, ut ipsi quoque intenderent monui; non modò enim non *musculum notabilem*, sed ne unam quidem muscularem fibram in toto eo tractu videre potuimus.

415.
De Vesicæ
Sphinctere.

Observ.
Anatom.

ANIMADVERSIO XXXVIII.

DE Pseudosphinctere infra; de glandulis autem illis omnibus de quibus hic sermonem interjicit, in illa ipsius Animadversione videbimus in qua & de iisdem glandulis, & de nobis longè aliter verba facit. Nunc quid de Vesicæ Tunicis scriptitet, videamus.

De Vesicæ
Tunicis.

K 2

Exter-

408
416

Externam eâ „ solertiâ quam tu ut plurimum satis inutilem „ esse, jam agnovisti, „ in duplicem manifestè portionem disteſci posse, „ affirmat, propaginem scilicet peritonæi, & planum quo hæc ul- „ terius obtegitur, musculare: — quod quidem plexibus adiposis „ abrais, non secus ac musculares aliæ omnes partes rubescat in- „ tense. „ Sed disteſci posse, dicat quantum libet; modò is qui „ *confusionis declinanda* gratia usque adedò laborare se ostendit, ipse „ quid dicat, intelligamus. Ait enim, eam portionem hujus tunicæ „ quæ à peritonæo est, „ obtegi plano muscolari. „ Utrùm vult, hoc „ *planum* exterius esse, illam verò alteram portionem esse interiorem; „ an contra? Si primum, cur hoc discrimen non inculcat quod inter „ extimam tunicam vesicæ, & tot aliorum viscerum intercedit, in „ quibus peritonæum ipsum extimum est? Si alterum, cur dicit, *ob- „ tegi*? Et mihi quidem has tunicas sæpius in cadaveribus exami- „ nanti in quibus muscoli valde rubebant, *planum musculare* sive in „ externa, sive in interna facie exterioris vesicæ tunicæ, adiposis etiam „ cellulis quantumvis abrais, oblatum est nunquam. Vidi quidem ip- „ sam tunicam, antequam cultrum admoverem, subrubentem; sed „ accurata adhibita perquisitione etiam vidi, eum ruborem à subje- „ ctis, innexivse sanguiferis vasculis, non à fibris muscularibus, pro- „ venire, ut valde suspicer, eum ruborem quem à mora, & sangui- „ nolentæ alius Partis diuturno contactu membranz contrahunt, huic „ homini imposuisse. Omnino enim in fibris carnis statuendis ni- „ mium tribuere rubori videtur. Itaque cum in tunica externa adstru- „ xerit musculum; in media, quam plures Summi Anatomici Muscu- „ lum vocant, ne unam quidem fibræ carneam agnoscit. „ Media, „ inquit, tunica alba, & tendinea est, ex glomis fibrarum tendineis „ robustis, torosis. „ Hæc verò illa ipsa tunica est de qua vel olim „ Fallopius sic admonuit: „ dum carnosam dico, non ita rubicun- „ dam carnem videre expectes, qualem in musculis, sed subalbi- „ dam, qualem in ventriculi, ac intestinorum tunicis videre potes. „ Et reapse tot illi *robusti*, ac *torosi* qui in ipsa spectantur, fibrarum „ fascies, non albi, non duri, videlicet non tendineæ sunt; sed, ut „ conferendo perspexi, & colore qui ex cinereo albicat, & con- „ sistentiæ modo illas carneas fibras æmulantur quas, tenuiores licet, „ in tribus muscularibus Coli fasciis observamus. Quid multa? Neque „ Fabricius ab Aquapendente, neque Spigelius, neque Cowperus qui „ hanc tunicam Musculum esse, censuerunt, neque adedò; ut alios in- „ numeros prætermittam; tu ipse, Mangete, quin ex fibræ carnez „ essent, dubitasti non modò in hoc, verum etiam in quarto Capite „ Libri I. quo in loco etiam illud de quo supra dictum est, „ Fallopi- „ pia

Observ.
Anatom.Vide su-
pra Ani-
madv. 14.supra 408
41-

pianum Sphincterem agnovisti, quanquam quod ad hunc attinet; nonnulla verba Cowperi, quem ibi innominatum vertis, de Sphincteris loco perperam omittis; quod verò ad istas fibras, non nisi eas quæ „ per vesicæ longitudinem exporriguntur, „ commemoras. In tunica demum interna *curiosissimum rete* subindicat; sed „ degere „ glandulas ad ipsam, „ negat, contendens multis verbis, per hanc earum dumtaxat tubulos transmitti, ipsas autem glandulas per areas mediæ tunicæ „ de fastio assidere, „ & quidem „ patenter obvias. Quod ultimum si verum est, tu potissimum videris, *Manete*, cur supra in Vesicæ descriptione res *patenter obvias* prætermiseris; nam quicunque illas „ ad tunicam intimam degere, hucusque putarunt, „ non se reprehensos, sed collaudatos existimabunt, si *patenter obvium* sit, eas immediatè eandem tunicam contingere, quod videlicet idem est atque *ad ipsam degere*. Quod autem ad *rete* illud *curiosissimum* attinet; ego quidem antequam Adversaria I. ederem, in una tantum, atque altera vesica muliebri, nulla adhibita præparatione, in extrema cervice, & prima urethræ parte ferè circumcirca, sed præcipuè posterius corpus quoddam reticulare minutissimis arcis, sive mavis rete elegantissimum vidi; *curiosissimum* non vidi. Sed ad gravia, atque ad institutum pertinentia redeamus.

ANIMADVERSI O XXXIX.

Cum supra in Vesica Sphincterem negavit, non obscurum fuit quid ageret, nimirum ut ipsi vesicæ vim retinendi ad tempus lotii abjudicaret. Cum verò alterum ejus Musculum, ut multi vocant, Detrusorem urinæ in tendinem commutavit, quoniam pro hoc musculum nescio quem *cutaneum* in externa tunica substituere videbatur, non ita apertum erat quid moliretur, hoc est ut ipsi eidem vesicæ vim expellendi lotii adimeret. Id verò jam tandem patefcit. Quoniam, inquit, tunicæ musculares, seu cutanei musculi „ (hoc enim vocabulum dici non potest quàm ipsi placeat; num aliis placitum sit Anatomicis, & quibus, dehinc libenter attendemus) „ quoniam niam igitur cutanei musculi functionibus solum—involuntariis in—serviunt; probabile ideo non est, urinæ excretionem à contractione „ ne tunicæ vesicæ muscularis celebrari, aut saltem ab ea principali—ter, —sed per musculos non planos, non cutaneos, sed veros, „ solidos, circumscriptos, & densos. „ Non iterum hic dicam, tunicam vesicæ muscularem nequaquam illum esse nescio quem ipsius musculum *cutaneum*, sed tot illos fibrarum fascies, quos ut carnosos esse, *diffinulaveris*, *robustos* tamen esse, ac *tortuosos*, negare non potuit.

Vit expellenda urina Vesica & Musculus Abdominis videntur.

De Musc.
Dill. c. 1.

ruit. Illud tantum quæram, an fortè Quadratus Colli Musculus, aut Musculi Frontis non *plani*, non *cutanei* sint Musculi, quorum ille quidem ab ipso Galeno est *μυῶδες πλατύς*, nuncupatus, omnes autem meliori jure cutanei, aut potius subcutanei musculi dici possunt? hos tamen voluntariis motibus inservire, adhuc non vidi qui dubitaret. Neque tamen si præter muscularem vesicæ tunicam, musculos alios „ solidos, circumscriptos, & densos „ expellendæ è vesicâ urinæ inservire, confitear; novis & inauditis quibusdam musculis opus esse, concedam, cum præstò esse ex illo genere Abdominis Musculos, & id omni ævo inter Anatomicos convenisse, nemo ignoret, Itaque non miror, „ quendam olim juratum scriptorum testualem „ seriò id Nostro asseruisse; „ illud miror, Nostrium dissensisse ob eas præsertim rationes quas tibi „ vadit enarrandum. „ Principiò ponit: „ musculos abdominis inservire primariò expirationis servitio, „ costisque idedè deprimendis destinari: idque patere ex puncto in „ hætionis fixiori ad pubem & ilia, ubi scilicet eorundem principium est, &c. „ Hic de ambiguo, & permutabili plurium musculorum, etiam Abdominis, fixiore termino, atque adedè principiò non disputabo. Neque dicam, oblivisci hic hominem Transversorum Abdominis musculorum, quorum principium magnam certè partem ad ilia, & pubem minimè pertinet. Mittam quoque id excutere quod subdit: „ in ascite, tympanite, &c. „ ventris viscera à musculis abdominis non comprimi: illudque item quod non obscurè supponit: illam respirationem, sine cujus usu „ nullimodè vivere possumus, „ à musculorum abdominis actione pendere: ne multis, illud etiam dissimulabo quod potissimum intendit: hos ipsos musculos „ primariò expirationi, secundariò compressioni ventralium viscerum famulari. „ Sed cum ex his colligit: „ quamobrem operatio hæc „ musculorum abdominis superiora respiciens prohibere debet eorundem actionem ad inferiora, vesicæ nempe pressuram tanquam functionem oppositam; aut saltem pressuræ vigore distrahere; „ quisque, atque adedè ipse videt, ab illa actione, vesicæ compressionem non prohiberi: adderem, nec „ distrahi pressuræ vigorem, „ quoniam costarum depressio non est per se functio *opposita*, sed conveniens cum vesicæ compressione, quatenus in utraque vis musculorum deorsum urget. Sed ipsemet illud concedit; at verò negat,

417 „ per hoc multum venire adjumenti ad pressuram vesicæ; „ quærit enim, „ cur in forti illa musculorum abdominis contractione, qua „ utrimo ad solida fecalia foras ex intestinis trudenda, urinam ordinariò non ejicimus, quam tamen post desinentiam contractionis „ ejicimus? „ At rectè facit, quòd hanc etiam *inflantiam* dimittit;

non

non modò quia ; ut subjicitur ; non res semper ita se habet , sed & quia dura recrementa , vi ad prostatam appressa agere id possunt quod ab Recti intestini tumore , imò quod ab „ impedimento aliquo etiam levi „ posse agi , infra agnoscitur . 417.
Verùm hujus *inflantia* quam ipse dimittit , ego illam partem arripio in qua id posuit quod alioqui negare non potest : musculorum abdominis contractione recrementa intestinorum extrudi . Quæro enim : quorum musculorum compressio ad Rectum usque intestinum pertingit , eorundem compressio cur ad propinquiorem vesicam peringere nequaquam possit ? Atque id ita quæro , ut hac una *inflantia* tres quas addere se , dicit , demonstrationes refelli , contendam .
„ Damus enim , inquit , etiam primariam , etiam directam , etiam „ vividissimam tendentiam musculorum abdominis ad pressuram vesicæ . Hinc per hoc totum ineundam vesicæ pressuram non fore , „ triplici evidentia demonstramus . Primum quia hi muscoli tendinei „ sunt ad pubem , non carnei , sicque pars carnea unde emanare „ pressura debet , — nullimodè appropinquari poterit ad contactum „ vesicæ . — Secundò quòd — mediatio ossis pubis impedit immediatum „ musculorum , & vesicæ contactum . — Tertiò , & præcipuè assertum „ comprobatur situatio vesicæ inaccessibilis prementi musculorum „ natui . „ Vide , quænam triplicis evidentie , triplicivè demonstrationis nomine obrudantur ; quasi verò nihil nisi per contactum immediatum agi posset , vel isti ipsi muscoli cum ex Recto intestino fæces extrudunt , illud intestinum immediatè contingerent , neque satis esset , ut proxima comprimerent corpora , hæc verò alia , & hæc demum Rectum , quæve in Recto continentur . Id , quod ita obvium est , si vel obiter attendisset ; cum suas istas præclaras demonstrationes , tum alia omisisset quæ datà ab ipsis occasione nos docuit : ut musculos abdominis „ tendineos esse ad pubem , non carneos , „ Pyramidalium videlicet obliquis : Ut „ vesicam sustentari „ à duplicatura peritonæi , antrum pelvis à cavitate abdominis *non minus* „ se jungente , quàm se jungat ab abdomine thoracem diaphragma : „ Ut „ sæpissimè in cadaveribus turgidam *penitus* vesicam lotio — tumorem suum ad cavum abdominis non elevare : „ Ut „ ampliacionem recipientis spherici in quocumque sit sensu , „ tendere ad conum , „ & alia hujus generis , quæ prætermitto , territus videlicet à *clava herculeæ* , quam post triplicem istam evidentiam corripit . Sed ecce , inquit , *clava herculeæ* . „ Aperto cavere , detectà vesicà , eaque vel plenissimà inventà , licet immediatè pressurà manus , adjacentis in vivente musculi cuiuscumque „ vices præstemus , nec guttula urinæ per urethram profluit . Hisce , „ in-

„ inquit, auditis Dominus noster (ille videlicet de quo hic triumphum agit, *vestralis*) non amplius de imaginariis hisce excretionibus nis urinarie instrumentis loquebatur. „ Misere me hominis minime mali à clava ista *herculeæ* subacti atque confecti; Sed Anatomicorum famuli eundem ridebunt ignorantem, nihil ipsis facilius esse quam compressâ manu vesicâ, urinam, quotiescunque iubentur, extrudere. Chirurgorum quoque famuli vix supra risum tenuissent, si obtrudi homini, audivissent: per compressionem musculorum abdominalis „ non multum venire adjumenti ad pressuram vesicæ; „ quando nimirum sæpius viderunt quod & tu, Mangete, in hoc ipso Capite commemorasti, vel extrinsecus admotæ manus adjumento *hypogastrio compressio*, musculorum vesicæ fibrarum contractionem in earum paralyfi *suppleri*. Sed quid Anatomicorum, quid Chirurgorum famulos dico? truncus atque stipes, non homo inductus est, cui; cum supra disputari, audivisset: nisi muscoli vesicam immediate contingant, non posse ipsam comprimere; ne illud quidem in mentem venit, rogare: qui ergo fiat, ut spiritu cohibito, & facilius, & longius, & majore cum impetu urina emitatur, & quasi ejaculetur? num quod retentus in pulmonibus aer, aut ulla pars thoracis vesicam contingat? an verò quoddam depressum vi diaphragma subiecta viscera urgeat, & hæc denique vesicam?

ANIMADVERSIO XL.

417. **P**roponit deinde *Tentamina*, quæ vel ipse vocat *puerilia*. Sed unum tamen eorum est oppidò rarum, & admiratione dignissimum. „ Aerem, inquit, in vesica jacentem exhaurio, quum, stylo per factam aperturam in cervicis osculum introducto, eum notabiliter dilato. „ Eum videlicet, Mangete, aerem stylo tantum introducto *notabiliter* dilatare hic potest? Non, inquis, *eum aerem*, sed *eum osculum* (sic enim loqui hic Scriptor solet) stylo dilatasse, dicit, atque ita aerem exhaurire. Oh locutionem dignam tentamine! oh tentamen verè *puerile*! Quis enim vel sine tentamine id nesciat, viarum angustias dilataris, vel earum coincidentia ad tempus sublata, aerem è vesica exiturum? Quis pariter nesciat (quod tamen post paulò tentamen additur) illam eandem viam intruso stylo „ nervosè expandendo, derivari celeriter à vesica infusum latissimè? „ Illud verò quod continuò additur, tentamen: in aliis caveribus vesica „ in fundi sui summitate manu deprehensa, & tracta nonnihil elevabatur, & penitus statim ex ea per urethram elutriabatur contenta lotii substantia; „ hoc, inquam, tentamen ego igno-

ignorabam; sed post tentatum experimentum adhuc ignoro, certè enim mihi nondum successit. Hæc autem, & cætera tentamina quorum nonnulla sunt incerta, nonnulla nimis certa, omnia aliter atque ipse existimat, explicabilia; „ in seriem hic ponere se, dicit, „ ut apta firmandæ in totum assertioni quodd „ ejus sphincter, & pseudosphincter „ parum ad vesicam aut retentioni urinariæ, aut expulsi- „ pulsioni opitulentur; „ quasi verò plerisque, & quidem Doctissi- „ mis, Anatomicis aut sic verba dari possent, ut *Domino illi nostro se-* „ *suali*, aut placeret, sphincterem urinæ expulsi- „ pulsioni inservire, aut iidem pseudosphincterem „ non minùs ac verum ad tenendam in vesica uri- „ nam advocarent, „ aut denique de utilitatibus ejus sphincteris quem ipse vocat *verum, seu legitimum*, alii autem vel iteratis dili- „ genter perquisitionibus videre nondum possunt, multum essent labo- „ raturi. Cujus tamen sphincteris, & pseudosphincteris utilitates hic ipse prolixo, ut consuevit, sermone quærere instituit: in quo si om- „ nia excutere vellemus, prolixi nos quoque essemus. Attamen quis non miretur, Prostatam, etiam respectu habito ad vesicularum semi- „ nalium involucrum, *circumvallatam* dici musculari embolo *densiori* „ *equidem, & inzgentiori*? Mox quoniam hæc „ musculares vires mul- „ tum edentulæ ad postulatam impulsam (pro seminis videlicet eja- „ culatione) agnoscuntur in frontem legis mechanicæ, — nec minùs „ squallentes in faciem hydraulicæ: hinc in genuinum usum illorum „ sphincterum necessariò deferri „ dicimur, & in hanc rem multa etiam atque etiam adjiciuntur. Quantò melius Viri Doctissimi, & nominatim Boerhaavius, atque Fantonus, qui „ novas istas efficaces „ potentias musculares „ assignaturi, neque ad invisibilem aliis mus- „ culum confugiunt, & perpauca verbis sive musculos Acceleratores, „ sive ipsum Pseudosphincterem assignant. Non enim id ut faciant, il- „ lud sibi negotii datum credunt, ut disputent, quor modis possit „ ex „ tubo egredi cum impetu, & saltu contentus liquor, „ multòque minùs ut obrudant: huc pertinere *liquidum chilosum*, quasi verò „ hoc *cum impetu, & saltu* à ventriculo, tanquam „ ab embolo per „ tubum intestinale, „ vel (ne litterulam quidem mutem) *inte-* „ *stinale* extruderetur: „ in curvo quocumque canali — nec embolum „ validissimè applicitum, & trusum, impulsus in exitu, & saltum „ contento fluori conferre posse: „ aut denique; ut alia omittam; „ assignatos musculos „ ad quemcumque trajectum expandentium cor- „ porum sub se se cæcè, & indifferenter agere: „ nam etsi Præ- „ stantissimi illi Viri existiment, non modò seminis, sed & urinæ egre- „ sum ab iis musculis adjuvari; certà tamen, ac longè alià ratione in „ hoc, atque in illo egressu eosdem agere, arbitrantur, & jure qui-

L

dem

413

Institut.
Medic. n.
367. 617.
Anatom.
Dissert. 7.

418.

*De allione
Acceleratio-
re, & Pseu-
dopsalm.
Berz in
ejaculatione
seminis,
& in fine
mitionis.*

dem meritoque. Nam si in utrolibet assidue, & continenter agerent; non dubito quin urethram occluderent, atque ita egressum prohiberent; si verò in egressu urinæ, ut in seminis egressu, per vices agerent, ac remitterentur, urina quoque, ut semen, non continenti cursu, sed subsultim exsiliret. Itaque sapienter censuere, in urinæ egressu tunc solum agere, cum hoc jam desinente, lotii reliquæ ultimæ, que guttæ in quas ob contractum jam vesicæ sphincterem ex vires quæ lotium extrudere, amplius agere non possunt, sunt ex urethra depellendæ. Cum autem ii musculi sive tunc, sive in seminis ejaculatione agunt; probabile est, eo temporis intervallo quo ipsorum contractio remittitur, veros urethræ Dilatores confestim agere, & vicissim.

ANIMADVERSI O XLI.

- 419 **N**unc cum ipso in viam redeamus. Igitur Tentaminibus illis suis innixus, secundum ea, novos musculos, & novam vesicæ habitudinem quam esset inventurus, mente præcepisse: & „facile quam queritabat rem totam assequutum esse se,“ dicit. Quæ tu, quæso, omnia mecum recognosce; intelliges enim quàm proclive sit hominibus ea videre quæ non sint, quando ea quærunt quæ ut sibi animo confinxere, ita cupiunt invenire. Primum igitur vidisse se, dicit, vesicæ „collum statim in ejus discessu à cervice in notabilem „flexuram agi, hinc produci in urethram, eique tandem horizontaliter continuari, eademque insuper directione tramitis ipsam & „urethram excurrere usque ad terminum suum per glandis apicem. „Ego verò semper vidi Prostata, quæ glandula videlicet eam partem Urethræ ambit quam „vesicæ collum statim in ejus „discessu à cervice „hic appellat, Prostata, inquam, vidi Recto intestino parallelam; quæ autem urethræ pars inter Prostata, & initia spongiosi Urethræ corporis intercedit (hic vocare reliquam colli partem) eam verò in notabilem flexuram curvari, vidi; ibi enim Urethra, quæ primum descenderat, sic inflectitur, ut ab antica ani parte ad corporum penis nervosorum concursum ascendat, donec rursus cum ipso cui subnectitur, pene deorsum incurvetur, atque propendeat; tantum abest primum, ut extremum collum *horizontaliter* Urethræ continetur, deinde ut *eadem directione tramitis* tota reliqua Urethra excurrat. Vidisse dicit, „secundò, vesicam con- „tiguus partibus strictè & per vim alligatam non esse; „at continuo idipsum negat hoc subdens: „ideoque nec in tensionis statu naturaliter non degere; „tum verò hoc ipsum iterum negat, sic per-

*Totius
Urethra
Pars.*

419.

pergens dicere: „ sed laxè , & liberè in pelvi supra ossis sacri fi-
 „ nem, & coccigem insidere . „ Utrum tandem, Mangete, faci-
 „ lius est credere id quod alibi ostendi , hominem qui omnes docere
 instituerit, ipsum nondum loqui didicisse, an verò *me* in tensionis
 statu naturaliter *non* degentem, hoc est tensam naturaliter; & natu-
 raliter *laxam* eandem vesicam esse, vidisse? Nos ergo tum hoc; *De Vesica*
 tum illud alterum, quod vesica „ supra ossis sacri finem, & coci-
 „ gem insideat, „ non ut ille dixit, sed ut dicere debuit, intelli-
 gamus, scilicet vesicam sic satis laxè iis Partibus quæ imo ossi sacro,
 & coccygi insident, insidere, arque ita verum esse quod olim Eu-
 stachius in Tabulæ quæ tibi III. est, Figura 11. ostendit, & omni-
 bus qui non vacuæ vesicæ fundum amputabunt, obvium erit, „ inam
 „ partem cavitatis vesicæ tanquam planam „ esse, & in ejus *planæ*
 medio cervicis orificium esse excavatum. Quod autem tertio, di-
 cit secundum *irremissibilem* quam ipse præviderat, *necessitatem* ob sub-
 stratam Prostata, protuberantiam vidisse, illud idem „ orificium
 „ sat altè coronantem, idèoque & in cavum vesicæ valde erigentem
 „ se se; „ ego quidem crediderim, ipsum in vesicas hominum inci-
 disse quorum Prostata sive à natura, sive à morbo æquo esset ma-
 jor, qualem ego in lethali urinæ suppressione vidi, aut qualem in
 Casaubono fuisse, supra legimus, in quæ cùm quadruplo quàm so-
 leat, Prostata major esset, illud quoque morboſi notatum est, vesi-
 cæ „ collum interius, quod declive levi canaliculo sine ulla protube-
 „ rantia naturaliter in urethram definit, introrsum tumens, elatum
 „ instar podicis gallinæ, vel colli interioris uteri; ita ut in ambitu
 „ esset veluti sulcus, seu cavitas, per quam circumduci poterat di-
 „ gitus. „ Nam nisi in ejusmodi subjecta incidisset; neque infra scri-
 psisset, inter hanc Prostatae protuberantiam, & vesicæ latera „ pro-
 „ fundam quaquaversum, & tanquam angulosam concavitatem com-
 „ prehendi: „ quæ quidem non ita cum eo consentiunt quod pau-
 lô ante positum est, vesicam hic *tanquam planam* esse. Ego sanè in
 idoneis subjectis istam protuberantiam nondum nisi prorsus levem ac
 humilem vidi, arque adeò longè aliam rem arque hic describit, ac
 putat. Minimè enim dubitar, quin „ ex hac mechanica—jam ita—
 „ tim elucescat sibi germana urinariæ retentionis causa in vesica. „
 Nam protuberantiam hanc tam altam supponit, ut urina ex ureteri-
 bus in vesicam destillans, superare ipsam non possit, „ nisi aggera-
 „ tur in copia. „ Sed fac, ita esse; quid tum postea? „ Dum, in-
 „ quit, latiori semper copia accumulatur,—majus etiam momentum
 „ acquirit, obviam ei eminentiam expositam circumquaque premen-
 „ di. Sic plus magisque constricta colli aperturâ in eadem compre-

L. 2

„ hensâ,

„hensâ, nullum sibi effluxus aditum permitter, licet—supra emf-
 „nentiæ libellam jam fluctuans. „Hic quis non videt, duo maxi-
 „mè obstat: Alterum, situm vesicæ in nobis decumbentibus, sæpe,
 & diu, in quadrupedibus autem semper talem, ut prominentia illa
 „cujus necessitas deducta est ex collocatione vesicæ, substratæ Prostata-
 „tis insidentis, vel nulla esse debeat, vel siqua sit, à lotii sensim ag-
 „gesti pondere aut non premi, aut certè non *circumquaque* premi de-
 „beat etiam cum lotii altitudo jam ad orificium excretorium perve-
 „nerit: Alterum, renitentem Prostatae consistentiam quæ vel à super-
 „incumbente lotio circum pressa, non ita facile cedere possit.
 Hæc, inquam, duo quis non videt? ipse tamen primum in toto hoc
 Scripto non vidit; alterum vix demum vidit, sed ea ratione tollere
 conatus est quæ quàm nulla sit, vel ex modò dictis, vel ex rei ipsius
 natura, vel ex anatome intelligi potest. Nam „alia, inquit, defu-
 „per ad erigendum hunc verticem, eaque pars libera, & pressilis
 „notabiliter assidet; — scilicet tunicæ ex laxa vesicæ assidentia cor-
 „rugatæ ad dorsum prominentiæ glandularis, cujus portionem su-
 „periores constituunt; & non secus ac sæpe ad colla uterorum
 „flaccescientium faciunt interiores membranae, in altam crepidinem
 „circumflexæ, sat præfunt libertati cervicis, ut à circumfluo liquo-
 „re compressæ, & ad se se ut supra competenter adductæ, crassi-
 „tie qua pollent, & conniventia cedendi, parem in protuberantiæ
 „favorem, cacumine productio suo oclusionem procurent. „Quid,
 si ex modò dictis planum est, in brutis, nobisque decumbentibus
 circumflexas istas rugas à *circumfluo* urina premi non posse? Quid,
 si ex rei ipsius natura patet, quò magis urina vesicam distendit, eò
 magis istas rugas explicari, atque obliterari oportere sic ut demum
 invito homine urina excideret, si ex vesicæ oclusioni præessent?
 Quid denique, si quoties quæsimus; quæsimus autem pluries; to-
 ties Anatome nos docuit, non modò circumflexas istas in altam cre-
 pidinem rugas nullas esse, sed in vesicis non exinanitis, in quibus
 tamen ut magis opus est, ita magis patentibus istæ adductæ, & con-
 nivalentes rugæ extare deberent, ne unam quidem exilem rugam in
 tota ima vesicæ parte apparere? Et tamen „ex coincidentia, & la-
 „xitate vesicæ post mortem notabili, ejusdemmodi angustiam aper-
 „turæ cervicis majorem fieri, „vel ipse ponit, dum paulò post
 „sua illa *puerilia Tentamina*, longè aliter, ut supra innuimus, expli-
 „canda, huc trahere conatur. Quid si addam, in ejusmodi coinciden-
 „tibus & laxis vesicis, & eò magis laxis quòd magna pars fundi am-
 „putata erat, ne digitum quidem orificium versùs deducendo, atque
 apprimendo, me ulla eò rugas adducere, aut excitare potuisse, nisi
 forte

fortè tenuissimas, & quæ amota vi prementis digiti illico oblitterantur? Pergetne dicere, „disparitatis dracmam non habere curio-
sum hoc suum artificium—cum illo „quod ipsa Natura ad urete-
rum finem extruxit, ne per eos urina regrediatur?

ANIMADVERSI O XLII.

HÆc autem omnia cum in virilibus, tum verò etiam magis in muliebribus cadaveribus observavi, in quibus eam Protuberantiam, non dico levem, aut humilem, sed propemodum nullam vidi. Quam hic quidem dicitur, in iisdem „apparentem mediocri-
„ter esse, & retentionis urinariæ ministerio non imparem. „Nam etsi negare non potest, muliebrem prostatam „leviter, & tanquam „umbratilem, ad vesicam desinere; „duo tamen addit, alterum: 420.
„vesicæ corpus in convexitatem vaginæ ad angulum rectum concidens, & firmiter cum ea connexum, in imo nexionis, seu osculo cervicis, figuram suscipere etiam debere convexitatis, internè respicientis; „alterum: eandem figuram „facilius insuper à pinguedineis acervulis eidem cervici, & vaginæ intertextis procurari:—& sic circum cervicem parem laudato muneris prominentiæ habitudinem fieri. „Sed hæc duo quàm nihil sint, vide. Quod de ibi positis adiposis acervulis comminiscitur; primum in plurium mulierum, & in his paulò etiam habitioris cujusdam anatome nihil adipis, aut certè nihil notabile, & ad rem faciens inter vesicæ imam cervicem, & vaginam videre potui, ac multò minùs illas „adiposas vaginæ membranas, & illum pinguiserum ibidem præcipuè 430.
„glomum, „in quem *pinguedinei isti acervuli* in additarum Figurarum Explicatione commutantur. Sed tamen quod non est, id tac esse; num emaciatae mulieres (quod tamen necessariò consequeretur) minùs quàm antea urinam continent? Accedit, requiri hic non tantùm qua parte vesica vaginam contingit, sed circumquaque, ea corpora quorum tumore „circum cervicem ea prominentiæ habetudo fiat. „Hinc quoque intelligitur, quàm parum ad rem faciat convexitas illa vaginæ, quæ tantùm à tergo connexa est: quanquam quid est convexitas ista, cum vagina serè semper in modum flaccidi, atque inanis intestini in se concidat? Quod etsi non esset; haud tamen satis intelligerem, quomodo in eam convexitatem concidere vesica dicatur „ad angulum rectum. „Nam infra quidem ait, huc spectans: „cadere collo suo vesicam super memoratam notabilem curvaturam vaginæ priùs usque ad ima pelvis descensæ, „hinc rursus ad vulvæ terminationem ascendentis, aut saltem ho-
„ri-

„ rizontalis. „ Verùm; si præclara hæc. verba satis intelligo; aliud Anatomica vagina, aliud ipsum pudendum est; aliud quoque ipsi est vesicæ: *collum*, aliud *cervix*, „ cujus osculum esse inum nexio-
 „ nis „ vesicæ scilicet cum convexitate vaginæ, supra dixerat.
 Utcunque est; illud quod principiò dixi, certum est, eam prominentiam cui ad urinam retinendam in maribus tantum tribuit, in foeminis vix ullam esse: quod & ipse satis confitetur, dum *multò minorem* esse, concludit. Id verò cum adscripto eidem prominentiæ usui tam necessario evidentissimè adversari, intelligeret; attende, quæso, quidnam, ut effugium quæreret, affirmare coactus sit: inde videlicet fieri, ut *urina foeminis* „ ad levem quemcunque conatum, „ aut concussionem etiam involuntariè profluat; „ perinde quasi de nova quadam & omnibus incognita animalium specie loqueretur, aut verisimile videri cuicumque posset, Naturam potius in tam abso-
 luta muliebris corporis fabrica, quàm ipsum in assignandis organis urinam retinentibus defecisse. At quem hominem? qui nempe postquam foeminis univèrsim quidem, & naturaliter „ ad levem quam-
 „ cumque concussionem involuntariè urinam profluere, „ affirmavit, ita sibi constar, ut quinque „ non amplius, interjectis vericulis *demostratum* asserat: „ cervicem vesicæ in foeminis eàdem quoque ac
 „ in maribus, angustia orificii naturaliter cieri. Veruntamen attendamus quid dicat; fortasse enim suum in iis organis assignandis errorem senserit. Senserit autem? Imò verò adhuc pro iisdem pugnat. Nam primum ut „ incontinentiam urinæ, quæ in variis mu-
 „ lieribus post partum laboriosum accedit, à divulsis, explanatis, seu „ tanquam luxatis suæ istius protuberantiæ fulcimentis „ deducit; ita illam suæ unicè sententiæ favere, non dubitat; quasi verò nihil aliud in difficili partu aut divellendo, aut lacerando, aut etiam comprimen-
 do vitari posset. Quid? quòd me quoque ipsum trahere in suas partes conatur, ignarus, me quorundam hominum non magis laudibus quàm reprehensionibus moveri; quanquam haud scio, quàm mihi gratum esse debeat quòd quæ ego Vesicæ Corpora & ante hos undecim annos descripseram, & ante duos quasi annos quàm hanc Epistolam ad te daret, ipsi rursus indicaveram, quæ, inquam, Corpora se non nisi *ultimò* observasse, ipse hic confitetur, Figuræ autem ejus, in quibus omnibus sunt omiſſa, vel ipso tacente, significat; de iis tamen ita scribat, ut credi velit, sibi priùs observata esse quàm de nostra descriptione quidquam audiverit. Quod ut credam; illud certè non credo, esse hæc Corpora „ notabiliora in fo-
 „ minis, & solidiora, „ quàm in maribus, multòque minis, ve-
 sicæ orificium in foeminis „ exquisitè per eadem obstruari. „ Con-
 stat

De duabus
 Cervicis
 Vesicæ Cor-
 poribus de-
 scriptis in
 Adversa-
 riis I. n. 9.

421

420.

stat enim mihi per quàm plurimas vesicæ, in sua etiam sede observatæ, inspectiones, nihil æquè ac horum Corporum longitudinem, & præsertim crassitudinem, ac prominentiam indiscriminatim sive in maribus, sive in foeminis variare. Itaque ut in utrisque pluries vix eorum vestigia vidi, ita in his sæpe multò quàm in illis majora, sæpe æqualia, sæpe multò etiam minora, habità magnitudinis vesicularum ratione, deprehendi. Cùm autem in pluribus posterioribus vesicæ, è pelvi nondum exemptæ, amputatò fundo diligenter quæsserim, num illi quæ sæpe non pauca continebatur, urinæ, strata ante orificium ea Corpora obflarent; non modò hoc nunquam vidi, sed vidi ea semper, ut in distenta vesica par erat, ab illo orificio quod „ exquisitè obturare „ dicuntur, valde remota. Quæ omnia etsi ita sunt, si tamen poneret, non ita esse; num prominentiæ quæ non *circumquaque*, sed ut ex nostra descriptione, atque aded ex ipsa anatome loculenter constat, tantùm „ ad partem posteriorem ven sicæ „ occurrunt, hujus orificium *circumquaque*, sive *exquisitè* obturare possent?

ANIMADVERSI O XLIII.

A Ge nunc cætera videamus quæ ut sibi in animo confinxerat, ita oculis credit perspexisse, Musculos videlicet novos, „ elevantes vesicam, & deprimentes „ Musculos, inquam, tantùm ad hanc rem necessarios, quantum vera esse ostendimus quæ ab ipso hætenus proposita sunt. Quos antequam describit, „ quoniam 421.
 „ nil ordine synthetico opportunius invenit ad nitidius exarandam „ descriptionem musculorum, qui in animali immediatam cum offibus connexionem ducunt, „ (quasi verò non & eorum qui cum cartilaginibus, quales ad Laryngem pertinent muscoli) idcirco offium à quibus sui isti muscoli exoriuntur, descriptionem præmittit, laudando sanè consilio, si hæc mimis Anatomicis esset nota, aut saltem si rectè ipse proponere eandem sciret. Quod ne injuria dictum suspiceris, primùm quæro, cur in Partium intrà pelvim contentarum enumeratione nervos, præsertim ita magnos, omittat? nam se quidem nervos *vasorum* nomine non comprehendere, in Historiæ Hepaticæ II. Parte indicavit. Deinde cur os innominatum esse absolute dicat „ utrinque apparenter unum? „ cùm reverà in adultis unum profusum sit, non ex tribus coagmentetur, ut in „ septimum annum „ non transcendentibus. „ Præterea cur tria illa oïsa ad efformandum acetabulum concurrere *equaliter*, affirmet? quando ex Fallopio, qui hæc „ diligentissimè observavit, „ scire omnes contrarium pos.

c. j. s. i.

Observ.
Anatom.

422

*22000
quidam
huc Mus-
culus fra-
stra per-
quisimus.*

possunt. Postremo, idque potissimum, quæro, quosnam femoris musculos significet, cum medium inter os pubis & ischion „ma-
„gnum utrinque linqui foramen, scribit; pro aliquorum femoris
„musculorum tractu? „Nego enim, per illud foramen non modo
„aliquos femoris musculos, sed vel unum aliquem, quicumque is
sit, exilem musculum trajici: atque id quod dico, ita certum, ita
manifestum, ita omnibus notum est, ut valde mirer, qui in pervul-
gata Musculorum historia usque adeo peregrinus & hospes sit, eun-
dem tantum sibi sumpsisse, ut de novis Vesicæ Musculis se posse
scribere, non dubitaverit. Sed de his tamen quid scripserit, vi-
deamus. Principio, inquit, est quidam Musculus „vesicæ levator
„proprius. Originem sumit—in pelvi ad tergum cavitatis acetabu-
li, —sed aliquantulum altius, & posterius. —Descendit inde nota-
„biliter laus, validus, & teres, oblique ad protuberantias prosta-
„tarum. —Eisdemque—inferitur. —In foeminis minor est hic mu-
„sculus, quam in maribus &c. — „Hic, inquit, musculus nunquam
„est adhuc descriptus. „Sed nec unquam, opinor, posthac descri-
betur, si quidem omnia corpora ita sunt facta, ut tria, bina scilicet
muliebria, & unum virile, in quibus quanta maxima potui diligentia
perquisivi. Quid enim quæris? Musculi istius „notabiliter lati, va-
„lidi, & teretis „nec vola, nec vestigium. At, credo, cadaveri-
bus non sum usus idoneis? imò vel minimi quique musculi egregie
in his tribus rubebant. Aut præscriptam ab ipso methodum non ser-
vavi? imò, ut ex postea dicendis apparebit, multò etiam accuratius
servavi. Aut aliquid neglexi? qui vel singulas membranulas, ne di-
cam fibras, lenta manu scrutatus sum. Aut denique mei me oculi
deceperunt? qui, ne mihi uni crederem, non modò ad has potissi-
mum dissectiones meos Auditores advocavi, sed quos ex ipsis in mu-
sculis vel minimis, & difficillimis perquirendis felicissimè aliàs exer-
cueram, eos semel atque iterum coegi, ut ab altero, adhuc integro
à me data opera relicto, pelvis latere hanc ipsam perquisitionem,
me inspestante, diligentissimè instituerent. Coegi, inquam; nam qui
creberrimas hominis non modò in iis quæ adversus me scriptitavit,
sed & in cæteris scriptis hallucinationes ex ipsa anatome per me
primum, deinde & per se ipsos perspectas haberent, quin hic quo-
que, aut infectas sanguine membranas, aut partem musculi alicujus
proximi, aut quidpiam ejusmodi pro novis Musculis habendo, pro-
lapsus esset, non multum sanè dubitabant. Ex hæc de Musculo
Levatore quem ut sui, & Vesicæ Proprium descripsit.

ANI-

ANIMADVERSIQ XLIV.

Nunc quid potissimum dicat de Communi Vesicæ, ut vocat, Levatore, sub nomine Levatoris Ani, jam noto omnibus, videamus. Hic, inquit, ortum trahit ad medietatem faciei internæ corporis ossis ischii, — ut idem principium hujus musculi correspondeat posterius ad partem infimam, & anteriorem cavitatis acetabuli. — Eadem ac Levator Proprius, soliditate compositionis, densitate, validitate, & latitudine donatur. Amplè decurrit inferius. Ante insertionis loca in duas — distinctas notabiles expansiones dividitur: primam, eamque majorem — infra prostaticum corpus — circumfundit, — quam pseudosphincterem superius vocavimus. In foeminis prima hæc productio — aliud ad vesicæ collum inseritur, quàm in maribus, seu super ipsas prostaticas — ob multò breviorum elongationem ejusdem colli. — Altera tandem productio inferior, & minor ad rectum intestinum — elongatur, — ubi cum ani sphinctere immiscetur: ob quam — non malè hic musculus Levator ani vocatus fuit &c. Ego verò in tribus de quibus dictum est, cadaveribus sic observavi. A superiore, sive majori horizontali parte ossis pubis, qua facio pelvim spectat, atque item à membrana proximi, quem Obrutorem Internum appellant, musculi lata Expansio oriebatur, quæ superius semel tendineo — membranosa, aliàs magis carnea apparuit, inferius certè ex muscularibus fibris obliquè descendentes constructa erat. Hujus expansionis posteriori limbo contigua, nisi potius continuata, erat Expansio altera pariter ex carnis fibris composita, quæ, tendineo aliquando principio, ab ista ipsa ossis ischii interiore prominentia, è qua paulò post nescio quem Vesicæ Depressorem Musculum oriri, legemus, tanquam à latiore centro ad circumferentiam, ex parte ad infima latera intestini Recti, ex parte verò in os coccygis, & imam etiam partem sacri ossis demittebatur. Et hæc quidem hiæce ossibus se se inferebant. Reliquæ autem fibræ si ab lateribus intestini, quò nempe, ut diximus, immittebantur, levitri opera aliquantulum diducerentur, nova rerum facies offerebatur. Neque enim harum fibrarum directio ita perspicuè, ut superius, apparebat; sed transversè potissimum apparebant fibræ in sphincterem ingentem dispositæ. Hic autem Sphincter cum posterius, & ab lateribus Rectum intestinum ambiret, per Vaginæ etiam infima latera ad hanc amplectendam extendebatur. Quæ postquam vidi, in mentem venit loci illius Constantii Varolii: quem an alii animadvertant, haud satis scio: Musculus quidam notabilis carnosus, circum-

*Musculus
Ani Levator
inter.*

*De magnitudine
quidam
Ani Sphincterem
inter com-
mani etiam
Vagina.*

*Anatomia
L. 4. C. 4.*

M

,, lari-

„ lariter , inquit , fertur secundum totum ambitum infimæ partis
 „ ventris ita ut amplexetur cervicem vesicæ , & omnia vasa consti-
 „ tuentia radicem penis , & extremitatem intestinorum . - Hujus
 „ musculi exiguam partem quidam homines observarunt , & credide-
 „ runt sua actione comprimere cervicem vesicæ : „ Nam etsi Vard-
 „ lius eundem in foeminis musculum inveniri , non dixerit ; apparet ta-
 „ men ex iis quæ modò dicebamus , & in ipsis inveniri , & ejus par-
 „ tem illum musculum esse quem Vaginæ Constrictorium , seu Sphin-
 „ cterem nominant . Cum hoc autem communi Vaginæ , atque Ani
 „ Sphinctere commiseri etiam fibras observavi Anterioris ejus Expan-
 „ sionis quam ab osse pubis , & Obturatoris membrana oriri , propo-
 „ sui . Hujus enim Expansionis fibras postquam in latera Vaginæ sic de-
 „ mitti , videram , ut etiam in latera Prostatae , seu glandosi Urethrae
 „ corporis infingerentur ; tum easdem omnes fibras , velut supra dictum
 „ est , diducendo , ut qua habitudine essent ab interiore , & ima facie ,
 „ cognoscerem ; non has amplius , sed magnum illum Sphincterem vi-
 „ dere ceppi . Ad quem , in viro etiam , pertinere pariter observavi
 „ rum fibras quas descripta Posterior Expansio ab ischio osse ad intesti-
 „ num Rectum demittit , tum fibras hujus ipsius Expansionis Anterioris
 „ , ut quæ Prostatae lateribus annexa quidem , sed non infixa , in
 „ eundem denique Sphincterem immittebatur . Si me ergo meis hi-
 „ sce observationibus quidquam tribuere , par est ; primum quod ad
 „ Levatores Ani pertinet , hoc est ad Anteriorem , & Posteriorem Ex-
 „ pansionem , amplissimum , & multiplex principium , ab osse videlicet
 „ pubis , à membrana Obturatoris , & ab illa ischii prominentia ipsis
 „ videtur assignandum ; non autem ad eum ischii locum qui „ corre-
 „ spondeat posterius ad partem infimam , & anteriorem cavitatis ace-
 „ tabuli „ contrahendum : & sanè vel olim , cum aliud quærerem ,
 „ sæpe memini animadvertisse , Levatores Ani magna ex parte multò
 „ antè quàm plerique crediderint , esse collocatos . Deinde Expan-
 „ siones musculares non videntur cum Levatore Proprio Vesicæ , qui
 „ quidquid est , *teres* certè musculus dictus est , rectè posse comparari .
 „ Denique cum hæc omnes Expansiones perspicuè viderim cum ma-
 „ gno illo Sphinctere commiseri , non faciliè adduci possum , ut cre-
 „ dam , ullius earum *majorem* partem , à reliqua *distinctam* , ad Pseu-
 „ dosphincterem efformandum pergere , eamque ipsam esse quæ in ma-
 „ ribus „ infra prostaticum corpus circumfundatur , „ in foeminis au-
 „ tem „ super ipsas prostaticas inferatur , „ præsertim cum vel olim ob-
 „ servasse , meminèrim , ipsum Pseudosphincterem nihil aliud esse , nisi
 „ fibrarum in sphincteris modum Rectum intestinum ambientium mani-
 „ festam continuationem : quod & illud confirmat , quod ad postremas
 „ lotii

De Vesica
 Pseudos-
 phinctere.

lotii guttas ex urethra depellendas contrahere Pseudosphincterem non possumus, quin extremum quoque intestinum unâ contrahi circumquaque, sentiamus. Porro cùm haud tantùm in eo loco quem nunc excutimus, „ multò brevior elongatio colli „ vesicæ muliebri; sed & alibi „ major longè ejusdem colli brevitatis supra collum viri- „ le „ esse distinetur; ne quis fortè ita magnum discrimen esse, existi-
 met; scire licet, nos qui in magnæ staturæ viro id *collum*, hoc est quidquid Urethræ inter orificium vesicæ, & bulbum interest, tres ferè digitos transversos longum invenimus, idem (hoc est totam Urethram) in mulieribus aliquando plùs duobus digitis, nunquam totidem ferè, minùs longum comperisse. Quam cùm glandosum corpus ambiat; huic bis meminimus à parte saltèm anteriore carneas fibras secundùm longitudinem superimpositas vidisse, quas cæteræ transversim ductæ cingebant. Harum verò transversarum fibrarum etsi in L. Adversariis eam esse actionem censuimus, ut glandosum corpus virili genitali artius apprimant, quò sic ab eodem corpore humor quo scæter, largè, opportunèque exprimatur; non tamen de reliquis earum actionibus idem quod Scriptor iste, sentimus, qui postquam supra, easdem inquit, „ forsan salaci per lacunas „ scaturigini, superadditis ad vices subsultibus suis exsufflandæ desti- „ nari, „ non dubitat omne sphincteris munus iisdem pernegare. Nos enim siquis id fortè contenderet; non pertinaciter repugnaremus propterea quia primùm quæ causæ coegerint Falloppium, ut consimilibus in viro fibris id officii denegaret, eadem in muliere non occurrunt, dein:le quia etsi inter has fibras, & Urethram Prostata intercedat; hæc tamen, isto ipso Scriptore consistente, „ mul- „ to minoris duritiei est, quàm in viro, & certè compressa cedit, atque connivet. Siquis igitur ita censeat: in muliere vim Falloppiani vesicæ sphincteris addita sive ob latiorè urethram, sive ob alias causas earum fibrarum assidua contractione adjuvari, & ab harum facili in laborioso partu distractione eam urinæ incontinentiam quæ hunc haud rarò consequitur, potissimùm esse repetendam; ego quidem ejusmodi opinioni non sum magnopere adversaturus. Cæterùm etsi meas super Ani Levatoribus, aliisque de quibus hac oblata occasione dictum est; Musculis observationes non adhuc omnes in plurimis cadaveribus habuerim; tamen in plerisque rebus in quibus ab istius Scriptoris observationibus hæc meæ discrepant, eò magis ad verum accessisse me, puto, quò magis nunc demum animadverto, me in iisdem rebus cum pluribus aliis Anatomicis consentire. Non enim Verheyenùs tantùm, quem hic eo nomine reprehendit, Le-
 vatores Ani dixit „ ab osse pubis quandoque „ nasci; sed Exerci-

De Mulie-
 bri Ure-
 thræ, in
 quæ Ma-
 sculis
 416

num. 13.

410

420.

L. I. tr. 2.
 C. 11.

423

Myotom. C. 5. **t**atissimus etiam Conperus, qui & in nonnullis aliis rebus hic mecum facit, absolute ab interna parte ossis pubis, & ab osse ischio, cui & sacrum addit, oriri, docet, ac utroque; siquid ego judico; etiam melius Archangelus Piccolhominus, qui „ ex partibus latera-
 Anat. Pre- lect. 12. „ libus, & internis ossis pubis, & ischii ortos „ dicit; quamquam ego ab ipsa quoque media ossium pubis parte, hoc est prope utriusque commissuram nasci, viderim. Quam quidem istorum Musculorum portionem si Reprehensor hic novisset, non sanè Bartholinum redarguisset, quòd „ latum esse, & tenuem hunc musculum sub ve-
 Anatom. quart. re- nov. l. 1. c. 11. loco cit. De Anat. Admin. l. 6. c. 14. „ sica, „ docuerit; non enim quod ipse, idem intelligit Bartholi-
 nus, aut Bauhinus etiam, ac Spigelius, qui eadem tradidere. Sed præter hosce Auctores, eosdem Musculos „ latos, & tenues „ etiam dixit Piccolhominus, & „ ne plures addam, ipse Galenus, qui „ mem-
 412. „ branosos, latosque „ esse, docuit: quæ hic volui commemorare, ut omnes existiment, num verisimilius sit, eum propius ad verum accessisse qui hos Musculos universim cum suo illo terete compara-
 vit, & „ eadem soliditate compositionis, densitate, validitate, & „ latitudine donari, „ dixit, an nos qui Expansiones Musculares esse, observavimus. Hæc tamen omnia *errores* vocat, qui „ hucus-
 „ que duraverint per commentaria Anatomica, & in sua illa senten-
 „ tia conquiescit, quòd – forsan propter radiosum nimium harum
 „ partium foetorem, & sordem, vel laboriosam intensè dissectionem
 „ ossium, – descriptiones originis horum musculorum, quæcumque
 „ fuerint, alii ex aliis retulerint; „ perinde quasi tot Anatomici
 „ delicatuli homines fuissent, & usque adeò foetorem, atque laborem
 „ timentes, ut non esset „ ideo (quod ipse dicit) demirandum, quòd
 „ hæc sua omnia eorum visum effugerint, non minds ac Musculus
 „ Vesicæ Depressor, quem describendum jam vadit. „

ANIMADVERSIO XLV.

*Depressor
quidam
Musculus
fatusus.* **M**usculus Vesicæ Depressor „ nascitur, inquit, à tuberculo,
 „ quod eminet ad marginem anteriorem minoris, posterioris,
 „ altiorisque processus ossis ischii. Distat in hac ejus origine ab
 „ origine levatoris communis mox descripti per digitum circiter
 „ transversum, oblique versùs posteriora. – Excurrit indè horizon-
 „ taliter, imò aliquatenus ascendens, per duos & amplius digitos
 „ transversos ad quintam vertebra[m] ossis sacri, & principium ossis
 „ coccygis, ubi se connectit; hinc denuò utrinque elevatur, & ad
 „ rectum intestinum accedens, super eum tandem, & adnexæ ure-
 „ thræ latera, & penis corpus, imò & ulterius versùs vesicæ col-
 „ lum expanditur, & insensibiliter terminat. „ Quæ in descriptione
 ele-

elegantissimâ et si plura sunt quæ non possum probare; tamen antequam ego impugnem; attendas velim quantum ipse eidem repugnet. „ Musculus, inquit, huiusmodi contractione sua partes quibus inseritur, & ad quas expanditur, deprimere ad inferiora necessariò debet. „ Te ipsum, appello, Manete; Musculus quem dixit *horizontaliter excurrere*, quomodo „ necessariò debet deprimere? „ Sed *aliquatenus*, inquires, etiam *ascendit*. Id verò ut venditatio à se Mechanismo interserviat, quàm precariò addat, docet ipsa ad quam provocat, Figura ad litteras q q, in qua ita hi Musculi *in situ* exhibentur, ut apertissimè descendant, non verò *horizontaliter* (quod unum in Explicatione dicit) *extendantur*; docentque adeò ipsi quos proposuit, termini; non enim potest ab eo ischii tuberculo ad os coccygis ejusmodi musculus ita deduci, ut ascendat. At saltem, inquires, ea pars aliquatenus ascendet quæ ad os sacrum deducitur. Verùm si hoc dices, illud consequetur, os coccygis, quod est mobile, ab hoc Musculo non deprimi; os autem sacrum, quod immobile est, deprimi. Si autem non dices, descriptioni repugnabis. Cui quidem ipse manifestò repugnat, dum allatis verbis hæc subiicit: „ Partes autem huiusmodi (idest quibus is Musculus inseritur) „ sunt primò intestinum rectum &c. „ Non modò enim in descriptione hoc non posuerat, sed disertè tradiderat, „ excurrere illum „ ad quintam vertebrae ossis sacri, & principium ossis coccygis, „ ubi se connectit; hinc — ad rectum intestinum accedere: „ quod & paulò post confirmat: „ ut validius, inquit, muneri huiusmodi „ depressivo vacaret hic musculus, eum in suo progressu ad ossis sacri, & coccygis adhaerentiam tanquam ad novum punctum nifus, „ sulcitur exilimo: „ quo in iudicio tamen aperte fallitur; neque enim usquam fit, neque adeò fieri potest, ut musculus aliò inferendus, in medio progressu parti alicui immobili connectatur, atque adhæreat; non enim hic de transmissione per trochleam agitur, sed de *connexione*, atque *adhæsione*. Quamobrem ex parte eorum iudicium magis probo quorum „ se opinioni refragari, dicit, qui musculos huiusmodi, ut pote ab intestini vicinia lividiusculos, non „ carnea substantia, sed simpliciter ligamentosa donatos asseruere; „ ut scilicet ischio cum osse sacro simpliciter alligando, rectoque „ intestino, ejusque musculus melius sustinendis tantummodo interservirent. „ Hic verò illud attendas, velim, Manete, hos Musculos jam antea fuisse Anatomicis notos; non enim id de ipsis asseruissent, nisi existeret, cognovissent. Quòd si respondeas, notos quidem fuisse, sed non ut musculos; tibi ex iis ipsis quæ tuo Theatro addidisti, probare poterò, vel ut musculos notos fuisse. Inspice enim, quæ:

431.
431.

423.

Tab. Eustach. 16.

quæso, Eustachii Tabulæ XV. Figuram 2. in qua etsi Scalptor tuus (atque utinam in hac tantùm) ab archetypi nitore, & perspicuitate non parum deflexit; tamen si non ita clarè, ut in archetypo, ceret non prorsus obscurè inter dextrum os ischium, & sacrum primùm id de quo paulò ante indicatum est, ligamentum conspicitur, cum quo videlicet quidam Anatomici istum Musculum, ut unum idemque conjunxerunt propterea, ut opinor, quia partem hujus Musculi quæ ligamentum intrinsecus intratum est, eodem serè atque ipsum ligamentum ductu fibrarum, & artius præterea eidem nexam (sic enim solet) viderunt; quàmvis reapse ita alia res sit, ut ego in grandævo quodam homine cum id ligamentum jam obsecutum observaverim, Musculum tamen nihil mutatum invenerim. Hoc igitur ligamentum in ea Figura primùm inspicias, deinde sub eo statim hunc ipsum de quo loquimur, Musculum. Quem si forte quæras, cur Amplissimus igitur Lancisius, aut ipse in ea quam in Eustachianas Tabulas scripsi, Epistola non indicaverim; sic habeto: ex ullius silentio confici non posse, non esse eum Musculum in ea Figura satis perspicuè delineatum; præsertim cum Summus, & Incomparabilis ille Vir tot, tantisque distineatur occupationibus, ut longè magis & nobis, & posteris mirandum sit, quòd affecta ætate, ac valetudine tam multa, & graviora conscribat, quàm si uspiam minorem aliquam rem sciens, ut puto, volensque prætermittat. Ego verò non omnia, & præsertim quæ ad Musculos pertinent, ut disertè testatus sum, aut volui, aut intrà eas quibus Tabulas & tot, & nudas inspexi, & Epistolam dedi, octo, non ampliùs, dierum angustias potui attingere, multòque minùs si qua in re ab Eustachii delineationibus fortè dissentirem, ea quoque expedire, quod omnino mihi faciendum erat, si in ullum de hoc videlicet minùs cognito Musculo sermonem ingrederer. Sic enim mihi & aliàs, & non ita pridem de hoc Musculo observatum est. Primùm, Expansionem hunc esse Muscularem, imò postremam partem esse illius ipsius Posterioris Expansionis quam in superiore Animadversione descripsi. Quas enim Expansionis illius fibras in os Coccygis, & imam etiam partem Sacri ossis infigi, docui, eæ nimirum fibræ hunc Musculum faciunt; si quidem pro distincto Musculo, ac non potiùs pro Musculi parte sunt accipiendæ. Tantùm enim abest ut harum originem ab ea origine Levatoris Ani quæ in ischio osse est, *digitum transversum* distare invenerim; nunquam nisi ita proximas vidi, ut in earum separatione, vel potiùs; ut verum dicam; laceratione quâ cultrum adigerem, nullum certum discrimen, nullum intervallum, vestigium nullum sive in ipso initio, sive in magna parte progressus earum fi-

bra-

*Musculus
Levator
Coccygis.*

brarum videre licuerit. Itaque illud unum discrimen est, quod anteriores in eum magnum de quo dixi, Sphincterem; posteriores hæ in imam partem ossis Sacri, & in os Coccygis plerumque totum (quod etiam Eustachium vidisse, video) demittantur. Demittantur; inquam; nam etsi Eustachius (id quod in archetypo inspicendum est) supremas fibras ascendentes, medias horizontales, imas descendentes proponit; idque ad usum à me assignandum est satis; ego tamen omnes semper descendentes observavi, sive mares, sive fœminas; de quibus istic contra argue in priorum Musculorum descriptione, nulla in descriptione hujus Musculi fit mentio; dissecuerim. Illud verò nunquam vidi, ut hæ fibræ postquam Sacro, aut Coccygis ossi se se valenter inserverunt; „ hinc denud eleventur, & ad „ rectum intestinum, „ ab hoc autem ad *urethram* usque, & „ ult „ terius versus vesicæ collum expandantur. „ Sed neque aliud quidpiam vidi quod ab iis ossibus ad extremum intestinum mitteretur, nisi membranas, & fibras per quas ipsum, & magnus ille Sphincter, cujus fibræ prope Coccygem videbantur quasi invicem decursari, cum iis ossibus colligarentur. Quæ cum in omnibus in quibus adhuc perquisivi, si non plurimis, certè non omnino paucis cadaveribus ita se habuerint; profectò nihil est cur credam, ab iis Musculis eam fieri „ intestini recti, & podicis depressionem, quæ recrementorum excretionem præcedit „ (quam quidem depressionem negari miror ab ullo *alio principio* fieri posse) aut id quod consequitur: ab iisdem, adnexum intestino vesicæ collum „ ob excretionem urinariam, „ deorsum trahi. Quem ergo iis Musculis usum assignabimus? eum nimirum quem descendentes ipsorum fibræ, & in os Coccygis insertio, & tanta cum Ani Levatoribus conjunctio satis indicant: ut videlicet quo tempore ab his in pristinam sedem anus retrahitur, eodem ab iis os Coccygis à duris præsertim & difficile extrusis recrementis depressum, in priorem locum unà reducatur. Itaque siquod illi Muscularis Expansionis parti peculiare nomen est tribuendum; non eam quidem Musculum Vesicæ Depressorem, sed Musculum Coccygis Levatorem appellabimus. Et reverà vel in gravædo illo de quo supra dictum est, homine expertus sum, ea parte Expansionis suam versus originem tracta, os Coccygis elevari. Non tamen dubito, quin etiam prohibeat, ne idem os nimis extra suam sedem ita facile compellatur, aut quin præster, ut illud in interstitium quod Ischium inter, & os Coccygis, ac Sacrum intercedit, magis firmis parietibus obstruatur: quæ munera etsi ligamenta implere poterant, & ex parte implent; cum additis tamen fibris carnis adversus crebras magnasque quibus imum pelvis urgetur, com-

compressiones peculiari vi, musculari scilicet, firmiter repugnant. Quod nisi ita esset; iis fibris carneis quæ inter Ischium, & Sacri imam partem, hoc est inter duos immobiles terminos ducuntur, nullus (aut ego fallor) adscribi usus, atque utilitas posset.

ANIMADVERSIO XLVI.

424.
De Admini-
stratione
Anatom.
ad ea de qui-
bus in sum-
pserunt.
Animado
verioribus
dilectum est,
observanda.

419

Quò prolixiores hætenus fuimus in iis quæ instar fundamenti erant, convellendis, eò brevioribus esse nobis licet in reliquis quæ videlicet quasi superstructa iis sunt, oppugnandis; aut enim nihil hucusque à nobis actum sit, aut hæc quoque reliqua jam conciderint, necesse est. Itaque ne cætera non legisse videamur; nonnulla hæc illic notabimus. Et primum ubi anatomicam administrationem docet per quam Musculi, & reliqua de quibus supra dictum est, inveniuntur; operæ pretium est primum illud præceptum attendere: „Petitur, inquit, dumtaxat, ut ossa pubis, post ablata integre integumenta, aliasque obtegentes partes, non ad symphysim suam, sed magis lateraliter, seu utrinque versus ischion superius, & inferius rumpantur, & avellantur; ut idè totæ sus deque partem internæ pelvis facies. „Nunc demum intelligo, cur eam totam partem Ani Levatorum quæ ab ossibus pubis pronascitur, & post ipsa statim latet, non viderit; hanc enim eorum partem unà cum iis ossibus, rumpit, atque avellit. „Illudque etiam intelligo, cur supra tradiderit, eadem directione tramitis, totam Urethram excurrere; siquidem postquam ossa pubis avulsit, atque adeò Ligamentum Penis Suspensorium dirupit, tum demum, partium vicinarum situationem, observat. Igitur qui hæc omnia rectè atque ordine observare voluerit, sublati jam musculis abdominis, & omnibus præter Rectum intestinis, imò quò commodius quærere atque inspicere possit, hinc supra ultimam lumborum vertebra reliquo trunco amputato, hinc femoribus ita avulsis, ut nihil tamen quod ad anum, perianæum, & genitale pertineat, vitietur, tota dumtaxat intus forisque integra magna pelvi, & quæ in hac continentur, forvatis, primum eam partem Ani Levatorum de qua modò dicebamus, perquirat. Deinde hac ab altero tantum latere ab sua origine separata, scroto autem, & cæteris quæ huc non pertinent, ablatis, ferram ab illo eodem tantummodo latere prope osium pubis commissuram ita ducat, ut eorum tamen media illa pars cui per Ligamentum Suspensorium annexus est penis, atque adeò hic ipse in naturali sede relinquantur. Tum ferrà quò propius licet acetabulum, & infimum processum ossis ischii ejusdem lateris translata, & ducta, os illud

illud pubis cautè & suspensa manu auferat, atque ita sibi ad totius Urethræ positionem quam in XLI. Animadversione descripsimus, observandam eodem tempore quo cætera inquirat, aditum aperiat. Quem quidem Urethræ & Vesicæ positum sic inspexisse non modò ad hanc disquisitionem, sed etiam atque adeò inprimis ad catheterem peritiùs immitendum, ad Lithotomiam felicìus instituendam, ad ea demum quæ de hujus ipsius varia methodo annis superioribus disputata sunt, melius dijudicanda plurimùm proderit. Quæ cum omnia ab hoc latere inspecta satis fuerint, tum licebit, nexu penis dissoluto, & alterius lateris Levatore pariter observato, atque depofito, tantum reliqui ossis pubis auferre, quantum ad omnia quæ supersunt, commodiùs investiganda necesse est.

Hujus Ad-
monstra-
tione Visi-
litas.

ANIMADVERSI O XLVII.

CÆterum Ingenium hominis libenter agnosco (quod utinam in veris potius quàm in istis commentitiis meditationibus exercuisset) dum pleraque ad mictionem sive secundùm, sive præter naturam pertinentia quæ per jam notos, & veros Musculos, ut Diaphragma, Musculosve Abdominis, Vesicæ, Urethræ, Ani, aliosve ejuscemodi explicari satis possunt, ea per ignotos, & fictitios aut Musculos, aut Musculorum usus exponere, & declarare conatur. Conatur, inquam, atque adeò interdum laborat non minùs quàm sui illi Ani, & Vesicæ Depressores. Quos cum & duos tantùm, & *graciles*, & Levatoribus „ longè minores, brevioresque, „ Levatores contra & quatuor, & „ densos notabiliter, & latos, torolos insuper, „ & firmos „ esse, falsus sit; contendit tamen, Depressorum actionem illam esse qua „ in mictionis fine – interdum – per iteratas vices „ anus, & annexæ partes deprimuntur, nihil dubitans, quin tunc à duobus illis gracilibus, infirmisque Musculis quatuor isti torosi, & firmi antagonizantur vicibus superentur. Qua in re nimirum haud satis animadvertit, ea quæ supra sibi comparaverat, effugia, utilia esse non posse, Dixerat enim, „ depressioni; tanquam à ponderis „ propensione secundatæ, parvam sat esse potentiam. „ Nunc autem „ in fine mictionis „ exoneratà jam vesicà, frustra ad lotii pondus confugiet. Atenim, inquires, confugiet ad *innatam Partium gravitatem*; quasi verò illa eadem alterna depressio à stantibus dumtaxat, non autem etiam à decumbentibus observaretur. Noli expectare, ut experimentum quoque illud perpendam, quod nescio, cur non potius inter sua illa Tentamina supra collocaverit; est enim ejusdem ponderis, ut quod à causis esse potest non minùs fallacibus, hoc est

425
& seq.

426

Ibid.

- ambiguis. Nam comparationes quidem quas subjicit, rerum sunt ita dissimilium, ut ejus opinionem parum illustrent, nihil confirmant. Nec verò multum eidem faveat *singularis* cujusdam *symptomatis* explicatio, in qua cum sphincteris vesicæ convulsionem rejecerit, ut qua Sphincteris ejusdem resistentia, idest vis contractionis duplicari debet, imò & ulterius multiplicari; „ ipse in medium cogitur adducere suorum Musculorum convulsionem; qua mirum est, non vidisse eorundem vim contractionis debere pariter multiplicari. Quid? quoddam phenomenorum quæ per memoratas paulò ante causas satis superque explicantur, alterum „ nubilum hucusque „ distitit; in altero autem difficultatem ridet qua nemo qui Falloppium legerit, implicari jam potest. Quid? quoddam „ mictionis, naturæ „ leges ex vitio partis genuino transgredientis „ omnes casus (quorum tamen aliquem minus miror prætermitti, quam inter casus incontinentiæ urinæ ipsum urinæ egressum per catheterem reponi)
425. quid? inquam, quoddam hos omnes casus partim ait, „ nonnisi ad suam „ hypothesim explicari posse, „ ita ut homo non magnificus minimè dubitet, quin res quoque quarum causæ, ut omnibus notum est, sunt explicatissimæ atque clarissimæ, „ absque detectionis suæ, hinc „ que elucidationis subsidio in densis hucusque tenebris jacerent : „ partim verò asserit, causas quas habent „ apud Authores decantatas „ sine eodem subsidio *impares* habere, Quibus tandem Lectoribus se putat scribere? rerumne omnium ignaris, an ita prorsus, ut ipse est, erga ejus hypothesim affectus, ut non modò quæ non sunt, si opus sit, videant, sed ea etiam quæ sunt, nequaquam videant? Sed nimirum major à me tibi honor habebitur, Mangere, cui, quasi homini rerum omnium imperito, non hic ostendere aggrediar, quàm commodè ista omnia queant secundum vulgaram Vesicæ anatomem explicari. Itaque hisce prætermisissis, duo potius ex te queram; alterum, cur is qui sæpius inculcavit: quotiescunque urina redditur, toties illam Prostatae in vesica prominentiam complanari, auxerri, deleri; nunc quasi eadem, cum vesica exoneratur, persisteret, fidenter asserat:
426. „ calculum faciliè cogi ad remorandum in vesica ex „ ipsamet prominentia cervicis, „ cujus propterea homo, ut alibi etiam vidimus, & misericors, & styli anatomici peritissimus, paulò post verbis ut transcribantur undequaque dignissimis calamitatem
427. deplorat: „ Luber hic, inquit, miserescere feralem prominentiæ cervicis sortem; quæ scilicet ob structuram suam alitrix per sæpe monstruosi calculorum generis; non tardè in consequens saginati hostipis, ingraticque penas luit. „ Alterum quod ex te quero, gravius est, scilicet cum & inter initia, & in calce hujus Epistolæ orasset te, atque

atque obsecrasset, ut hanc „ expolires, atque perficeres, ejusque de-
 „ festibus (sic enim inquit) peritia tua suppleres : „ quæro ex te,
 „ correxeris, an non? nam non perfecisse, satis video. Si correxisti;
 quot ergo, quantisque erroribus scatebat, cum tot adhuc, tantique
 superfint? Si non correxisti; cur igitur probavisti, edidisti, laudavi-
 sti? Sed hæc tu videris; ego ad duas huc adjectas Figurarum Ta-
 bulas transeo.

415.
429

ANIMADVERSI O XLVIII.

CUM *Mechanismus* quem in his Figuris exhibere se, dicit, Pro-
 minentia notabili Prostatae intra Vesicam, Musculis Levatoribus
 Propriis, & Depressorum insertionem in Urethram potissimum conti-
 near, cumque id ferè omne non modò non *visibillimum*, ut ipse
 promiserat, sed nullo modo visibile nobis in cadaveribus fuisse, osten-
 derimus, tempus hic non teremus, idem in singulas Figuras incul-
 cando; sed hoc dumtaxat universum commemorato, ad alia noranda
 veniemus. Et primùm rectè fecit & perprudenter, cum id quod
 in singulis tribus Figuris prioribus appositâ notulâ * monstravit, in
 Explicatione esse „ Orificium cervicis, „ testatus est; plerique enim
 pro extante potius tuberculo, quàm pro cavo meatus initio facillè
 accepissent. Neque illud minùs probo quòd in iisdem Figuris, ac
 potissimum in I. per litteras C. C. indicari Prostata, declaraverit;
 siquidem, ut etiam supra dictum est, in Prostata videtur æquo ma-
 jores incidisse; vel quòd per litteram D. in eadem Figura intelligen-
 dum sit „ collum vesicæ à muscularibus, & glandulosis tegminibus
 „ aliquoties denudatum; „ nam vel proxima Figura, aliqua potius ef-
 se addita, quàm detracta, suadere potuisset. Illud verò, quòd
 quænam per litteras E. E. & I. I. significari vellet, in Explicatione
 exposuit, necessarium omnino fuit; cui enim unquam venire in men-
 tem ex ista delineatione potuisset, Musculos significari? Mitto cæ-
 tera, & in his urethræ „ bulbum, ut se se prodeat (velut ait) con-
 „ spectui „ ad P, ac vestigia ligamenti penis suspensorii, „ quæ ego
 met qui primus inter Italos ejus Ligamenti memoriam restitui, in eo
 præsertim loco ad b, nunquam eram sine Explicatione agnitus;
 omnia, inquam, exceptis Ureteribus, mitto. Quorum in hac Fi-
 gura, & in proxima, & in quarta operæ pretium est tenuitatem pa-
 netum ad sectiones M. M. I. I. E. E., amplitudinem verò cavitatis in
 omnis ferè harum Tabularum Figuris ad insertionem, seu orificia
 in vesica spectare. Neque hæc jam dico in Figura 2. tubercula po-
 tius quàm orificia videri; illud dico, existimasse me priùs, incidisse

415

De Ure-
terum fise.

hunc hominem in magnas plerumque Prostatas, nunc autem agnoscere, etiam in maximos plerumque Ureteres incidisse. Pluries ego totos penè Ureteres à sanie atque ichore vidi dilatatos, atque ita aliquando ut arteriæ magnæ truncum æquarent; nunquam tamen memini ipsos eorum in vesica hiatus ita amplios vidisse, ut in prima hac Figura delineantur. Ureterum autem secundum naturam se habentium ita proprium esse, observavi in ipso extremo orificio contrahi, ut in bobus etiam, aliisque in quibus perquirere id placuit, brutis, eodem in loco contrahi viderim: quam etiam ob rem urinæ in ureteres reditum fieri difficiliorem, non dubito. Quid verò de ista dicam qua in plerisque ex his Iconismis pinguntur, figura orificiorum circulari? cum potius, ab inferiore parte, quæ videlicet in illa Corpora à me descripta, in his autem omnibus Figuris omiffa, producantur, nunc quasi in ellipsim, aliàs in acutum angulum, ut ventriculus cerebri quartus, videri soleant, ut ita dicam, degenerare. Num autem prominentia illa Prostatae tanta sit, ut quemadmodum primæ in utraque Tabula Figuræ ostendunt, infimæ eorum orificiorum partis prohibere conspectum debeat, & de plicis istis *e. e.* ac demum de cavitare notabili ista *f. f.* „ ubi, inquit, de-
 „ cidunt calculi, „ de his nimirum cunctis supra satis dictum est. Jam verò paucioribus licet verbis proximas Figuras notare; non enim opus est, ut de Ureteribus, aut de orificio cervicis; quod dicit „ ad
 430 „ inferiora descensum, & dilatatum; „ aut de aliis ejusdemmodi rursus loquar. Satis ergo fuerit in Figura 2. Musculi Levatoris Proprii sectionem B inspicere ita egregiè pictam, ut non musculi, sed vasis sectio esse videatur, itemque Urethram F, cujus nimiam latitudinem vel tres quæ consequuntur, Figuræ, & duæ præsertim muliebrem Urethram, quæ latior esse deberet, hac ipsa angustiorē exhibentes, satis redarguunt, & denique Musculos Depressores M. M. de quibus quod dicit, quis intelligere satis possit? „ In suo, inquit, pro-
 „ gressu rescissi, ad recti posteriora satis retrò urethram terminan-
 „ tes; „ nam si ad Recti posteriora desinunt; quomodo in Epistola scripsit, eisdem „ super rectum intestinum, & adnexæ urethræ la-
 433 „ tera, & penis corpus, imò & ulteriùs versùs vesicæ collum ex-
 „ pandi, & insensibiliter terminare? „ Age nunc inspicimus Fig-
 439 „ uram 3. quam supra „ ad diluenda vetera, recentiaque Anatom-
 „ corum dubia, & errata, licet non instantio connexa, „ pro sua videlicet liberalitate, additurum se, dixit. Verùm in hac ipsa præter ea de quibus ante diximus, errata, hæc quoque sunt, primam quod pars illa *indumenti*, ut vocat, *muscularis b. b.* potius quàm sphincter canali clauso superinductus, apertus canalis videtur. Dein-
 de

de quod iste idem sphincter quem hic ostendit, frustra in idoneis cadaveribus perquiritur. Præterea cum intrâ prostatam nihil nisi suum hunc ignotum sphincterem proponat; quomodo in Explicatione potest dicere, se prostatam hic abrafisse, „ ut clarè compareant „ musculi, sphincteres communiter dicti? „ Postremò quonam jure hanc notam viventibus Anatomicis inurere conatur, quasi Pseudo-sphincterem *F communiter* à vero; quem ipse tamen non exhibet; Vesicæ Sphinctere haud satis distinguerent? nam illum, inquit, „ com- „ munitè sphincterem etiam nuncupant. „ Restat Figura 4. in qua mitto illud, quodcunque est, quod pro sinistro Ureteris orificio exhibetur; ac Depressores tantùm Musculos hic ad litteras D. D. delineatos cum iis comparo quos in utriusque Tabulæ Figura 2. delineavit. In proximæ Tabulæ Figura 2. descendentes exhibet; in 2. autem hujus Tabulæ ascendentes quidem, sed tamen vix ascendentes; hic autem contra & duas illas Figuras, & descriptionem in qua „ excurrere horizontaliter, & aliquatenus ascendere, „ affirmavit, 413 mirum quantum ascendentes eosdem pingat. Huc adde, in Figura huic superposita longiores quàm hic exhiberi, cum tamen illic, ut pote non integros, sed ut monet, in progressu rescissos, breviores; hic autem ut in muliere, cujus antequam urethram attingant, vaginam quoque emetiri debent, longiores apparere, conveniat. Denique utrum, quæso, his duabus Figuris, an Epistolæ majorem fidem tribuamus? Hæc *gracilitatem* Depressorum testatur; illæ autem ambæ in sectionibus notabilem eorundem crassitiem ostendant. Et nostræ sanè observationes, in vera horum Musculorum parte habitæ, nos luculenter docuere, tantum falsæ crassitiæ in hisce omnibus Figuris Depressoribus addi, quantum veræ latitudinis ipsis demitur. 413.

ANIMADVERSIO XLIX.

SEd prorsus jam ad Tabulam proximam transeamus, cujus 1. Figura vel suâ cum *naturali archetypo*, ex quo omnes hæc delineatæ dicuntur, exactissimâ *convenientia*, vel singulari elegantia, cæterisque ornamentis suis ad se nimirum oculos pertrahit. „ Plura enim „ huic ad complementum potius, & ornatum, quàm ad rem suam „ faciennia addidisse se, dixit, utrum videlicet, ejusque appendices: „ quod ego quidem non *magnificè*, ut ipse de me, sed liberaliter factum dicerem, atque adeò etiam atque etiam laudarem, si modò aut dum hæc adderet, nihil eorum quæ ad rem suam faciebant, omisisset, aut saltè ea quæ addidit, rectè, peritèque addidisset. Verùm cum se his duabus Tabulis „ mechanismum omnem „ exhi- 419

- exhibere professus elset, marium, & foeminarum vesicæ urinariæ, ad urinæ retentionem, & excretionem facientem, cumque ad istum (mitto illa subnexa orificiis Ureterum Corpora) Musculos Levatores Communes pertinere, jam posuisset; hos ipsos quod ad foeminas attinet, prætermisit. Nam quodd ait, eos idem in hac Figura non ostendi, quodd in Figuris superioribus sint expositi; in iis quidem quæ ad mares pertinent, expositi sunt: quod si promissio satis faceret; nihil profectò erat causæ cur muliebrem ullam vesicam, ullosve alios huic inservientes musculos cum eadem exhiberet. Quid? quodd cum Prominentiam insignem A, & in hac vestigia plicarum m, & prospectum orificiorum ureterum ab eadem Prominentia ex parte sublatum hic pingat (quarum quidem rerum nos in vesicis inprimis muliebribus, in hoc statu retentionis urinæ, observatis, videre nullam potuimus) rem postea, eandem Prominentiam, ut ipse posuit, ex parte efficientem, eandemque indubiam, & sine manifesto errore in transversa sectione muliebris urethræ delineanda nullo modo prætermittendam, Prostata videlicet inter eandem, & musculos circumpositæ crassitudinem ad C prætermisit. Ut enim muliebris Prostata cum virili comparata gracilior sit, non tamen propterea nihil est; idque sanè, vel me tacente, ex Graafii Figuris 3. & 4. in Tabula LXXII. Lector postea satis colliget. Hæc, arque alia ad rem suam facientia omisit in ea Figura in qua tot aliena addidit. At hæc, credo, quæ addere, ad complementum, & ornatum, voluit, ea saltè rectè peritèque addita sunt. Scilicet id satis ostendit tubus ille campaniformis, quem, nisi litteram F inscriptam, & in Explicatione declaratam haberet, pro Vagina Uteri nemo acciperet. Satis quoque probant Ligamenta Uteri Rotunda K. K. quorum summam partem ut neque tam altam unquam comperi, ut naturaliter inde proficisci videretur, unde in Tabulæ, hujus Theatri LXXI. Figura Graafii primà, & in Tabularum Verheyenii XVI. & XVII. Figuris pariter primis; ita vicissim nunquam adeò humilem observavi, & multò minùs in eam transversam protuberantiam vidi productam, uti in hac Figura, à sinistra præsertim parte, monstratur. Quid de Ligamentorum Testium i. i. seu longitudine, seu crassitie dicemus? Longitudinem certè uno transverso pollice non valde majorem in cadaveribus observo; hic autem vel duobus majorem video. Crassitudinem verò, vel me silente, quis à dextris enormem esse, non cognoscat? à sinistris autem istud ipsum Ligamentum in Tubam abire, non miretur? Nam Tubarum quidem tantam jam prope Uterum crassitiem notare quid attinet? De Tuba autem dextera nominatum, quæ melius in situ esse dicitur, quid

De Testi-
bus Uteri
Ligamen-
tis.

quid habendum sit, tunc satis intelligetur, cum Præclari hujus Figurarum Auctoris ineptissimam censuram à nostra Tubarum delineatione repellemus. Nunc illud tantum dicimus: tunc Anatomicos esse forsassis credituros, & istam Tubam, & cætera quæ in hac Figura ostenduntur, ex ipso naturæ exemplari in sua sede esse descripta, cum inter summi fundi uterini medium, & huic respondentes laterales pelvis parietes tantum intervalli esse, invenient, quantum hic inter litteras H, & S S intercedere, nunc mirantur.

ANIMADVERSI O L.

ATque ut tandem aliquando hunc hominem cum suo isto Vesicæ Mechanismo relinquamus; ultima ejus Figura inspicienda est. In qua etsi affirmat, ut cæteros, ita nominatum Depressores musculos „ in sua insertione apparere; „ hanc tamen præsertim qualem anæ descripsit, incassum hic quæres. Ad litteram autem d. cum eam partem *colli vesicæ* esse, conceperis, quæ *infra prostates* est; non poteris non mirari, Levatores Communes o. o. quorum in Epistola dixit „ primam eamque majorem expansionem ad collum „ vesicæ infra prostaticarum corpus sat latè distribui, & circumfundii; „ & amplum hoc pæcto densumque progigni musculum prostaticis, & „ tuberculo spongioso interjacentem; „ non poteris, inquam, non mirari, eosdem musculos vix demum paulò supra e, ubi *penis productio* esse dicitur, inferros ostendi, præsertim si cum hac Figura, „ in qua partes omnes multum infra ordinariam magnitudinem diminutæ sunt, „ & propterea intervalla quoque multum sint immixtura, necesse est, superioris Tabulæ Figuras duas priores contuleris, & locum insertionis Levatorum Communium in hac Figura cum loco insertionis eorundem in iis duabus Figuris contenderis, monitum in earum primæ Explicatione positum attendendo, eos Musculos „ sua super collum insertione aliquantò inferius esse in ea Figura delineatos. „ Cætera sciens volensque prætermittam, illudque unum addam: quâ omnes hujus hominis Figuræ, eadem hanc quoque esse negligentiam ex archetypo naturali describam. Quod vel obiter intuentibus satis superque significant summum os Sacrum adèd ab lateribus introsum extans, summum os Ilium sinistrum adèd acuminatum, ea quoque transversorum processuum Vertebrarum lumborum (ut de ista eorum figura, & gracilitate nihil dicam) ea, inquam, ipsorum origo non à superiore, sed à parte præors media Corporum vertebrarum, ac denique interjectum *vertebræ*, & *vertebræ* aut nullum, aut certè sic tenue Ligamentum,

ut

422.

431.

436.

*Ligamenta
F. vertebrarum
Corporibus
interjuncta.*

*Ad Sceleti
conficienda
Monitum.*

ut vehementer dubitem, num ex naturæ exemplari hæc Figura descripta sit. Quod ne sine causa dixisse videar, scire licet, ejusmodi Ligamenta quibus Corpora vertebrarum copulantur, ex substantia inter cartilaginem, & ligamentum ferè media constare, quam si transversum totam seces, ex crassis quasi fibris, & ad modum semicirculorum concentricorum elegantissimè dispositis compactam invenies, nisi quòd in posteriore eademque media parte, ut ipsa substantia magis durefcit, sic ex fibræ non apparent. Hujusmodi igitur Ligamenta quantò nos magis ætate crescimus, tantò ipsa magis crassitudine decrefcunt, iis scilicet fibrarum illarum stratis quæ vertebris proximiora sunt, ossificatis, & in earundem vertebrarum naturam abeuntibus, ut quò plus ipsis Ligamentis crassitudinis decedit, eò plus vertebris accedat. Itaque hæc etiam de causa ut altioris staturæ Sceleti parentur, seniorum quàm juniorum ossibus uti præstat. Hæc autem omnia ita sunt accipienda, ut tamen constet, non nisi perrarò, idque in summa senectute, contingere, ut ex ejusmodi Ligamentis quædam, & nominatim vertebrarum dorfi, tota ossescant atque obliterentur. Certè illud ipsum Ligamentum cujus causa in hunc ingressi sermonem sumus, duabus ultimis lumborum vertebris interpositum, in variis ætatibus, sive in mulieribus, sive in viris inspiciendo, & cum dimidiata Corporis superpositæ vertebræ crassitudine comparando, sæpe observavimus, cum flore ad huc juventute crassius, & aliquando etiam multò illa crassius esset, in consiliente autem ætate eidem æquale; in senioribus ea ipsa quidem tenuius, non ita tamen multò fuisse. Quæ cum ita sint, & cum quod cæteris præcepit, id eò magis ipse fecisse credendus esset, ut ad hanc demonstrationem *juvenile cadaver* selegisset; non levi profectò etiam summa istius Ligamenti tenuitas esse videtur indicio, hanc Figuram non ex cadaveribus, sed aliunde, aut ex ejus memoria, ne dicam imaginatione descriptam esse. Sed jam nobis ad alteram Libri hujus tui II. Partem, atque adeò ad alterius tui Voluminis initium est transeundum.

Adversarium Anatomicorum III. Finit.

RE-

RERUM INDEX.

A

A Bdominis Ligamenta Suspensoria nota fuerunt Vesicibus. pag. 2

Eadem quid verè sint. 2

Acceleratores Musculi quando, & quomodo agant. 81. 82

Ailorum Lips. Scriptores laudati. 5. 32

Adiposa Vasa. De his quid sentiendum. 3

Ani Cellula quadam, & Canaliculi. 11

Levatores Musculi quales, & quot ex locis oriatur. 89. & seq.

Sphincter quidam magnus, communis etiam Vagina. 89. 90.

95

Valvula quadam, & Columna. 10. 11

Earundem usus. 11

Appendicula Intestinor. Vermiformis in homine nonnunquam deest. 27

Ejus orificium ubi sit. 25

Ad ipsum desinunt omnia

Coli Ligamenta, & cur. 26. 27

Ejusd. Append. positio qua sit. 25. 26

Ejusd. usus generatim inquiritur. 24. & seq.

B

Banhini Valvula adversus quosdam negantes vendicatur. 14. & seq.

Ea non est peculiaris mu-

sculus, ut pluribus vel olim visum est. 19. 20

Quid verè sit. 19. 20. 21

Qua diametro, altitudine,

& figura sit. Ibid. & 22

Qua ratione suo munere fungatur. 21

Ejusdem Valvula duo Fre-na descripta. 22. 23

Horum usus. Ibid.

De Figuris ejusdem Valvula hætenus editis judicium. 29. 30

Beccarius laudatus. 60

Bilis quidam usus impugnati. 51

Vie in Vipera. 54

Boerhaavius laudatus. 3. 36. 81

Bohnius laudatus. 36. 53

Brunnerus laudatus. 13. 14. 36. 50.

52

C

Calculi Cystis. Vid. Cystis.

Caci Intestini veri magnitudo incerta est. 25

Situs pererrans observatus. 26

Cacum perperam dictum. V. Appendicula.

Chylifera. V. Lactea.

Clericus Daniel laudatus. 5

Clysmata cur sepe nequeant ob copiam flatuum immitti. 24

Coccygis Musculus Levator. 94. 95

Coli Intestini Flexus extremi variant. 9

Flexus in sinistro hypochondrio

O

*ario non sufficit ad explicandum
dolorem Lienis vulgò adscriptum.*

9. 10

Coli Ligamenta quid verè sint.

26

*Hac non sunt duo, sed
tria.*

27

*Unde oriantur, & ubi de-
sinant, & cur.*

26. 27

Cyst-hepatici Ductus. De his

57.

& seq.

*Cystis fellea Calculi interdum per
alvum ejeti, quibus notis di-*

gnoscendi.

59. & seq.

Eos aqua innatare, quinam

vel olim tradiderint.

59

Duorum genera, & cir-

ca utrumque observationes.

60.

61

Ejusd. Cystis quasi hernia.

74

*Ejusd. internum Rete quo-
modo constructum.*

65

D

Deventer laudatus.

28

Digestio. V. Ventriculus.

Donatus Marcellus Scriptor est non

semper cautus.

17

Duodeni Intestini Glandula.

13

Lactea Vasa.

31

E

Eustachius Ligamentorum Coli na-

turam,

Vesica habitudinem, &

Musculum quendam huic recens

affectum jam olim cognovit.

26.

83. 94

*Falloppius multa de Ventriculi stru-
ctura docuit qua Willisus postea
tradidit.*

6

Fantonus Jo. laudatus.

5. 6. 18. 27.

48. 65. 69. 75. 81.

G

*Glandula. V. Duodenum. Intesti-
na. Lumb. Oesophagum. Ven-
triculum. Ureteres.*

*Ad Glandularum stru-
cturam manifestandam Cogitatum.*

69

Glissonii lapsus.

1. 2. 7. 9. 10

Graafii lapsus.

102

H

Heisterus laudatus.

29. 31. 64. in

marg.

Henningerus laudatus.

32

*Hepatica Arteria rami quò pertin-
gant.*

39

Hepatica cujusdam Historia Exa-

men.

37. & seq.

Hepati-cystici Ductus. De his

57

& seq.

Hernia peculiaris, descripta à Li-

vrio,

fieri potest etiam ab Ileii

Diverticulis.

8

Hernia, ad illam Livrii re-

ducenda, quæ signa habuerit.

9

Highmori lapsus.

17

I

*Ileii Intestini diameter, directio, &
fibra in ejus fine ut se habeant.*

19

Ileii

*Ilei Diverticula quid sint , &
à quibus antea observata .* 8.9

*Hac non inveniuntur ferè
semper .* 9

*De Hernia in qua ipsa in-
cluduntur . V. Hernia .*

Iliaca Passio . V. Volvulus .

Intestina singula V. suis locis .

*Intestinorum Fibra non sunt spira-
les .* 7.8

De eorum Glandulis . 12.13

Valvula Bauhini dicta . V.

Bauhini .

Valvula Conniventes . 12

Valvula Spirales in piscibus

de Canum genere . 8

*Intestinorum Crassorum Pingues
Appendicula quem usum habe-
ant .* 10

In Tenuibus etiam sunt

Glandula Solitaria . 13

Hinc Lienis usus Malpi-

ghianus confirmatur . 36

Lien multiplex . 38

Idem perexiguus . 36

*Ligamenta . V. Abdom. Coli . Ver-
tebrar. Uteri .*

Littoris laudatus . 8.36.39.69.70

*Lumbares Glandula saepe tribus plu-
res , interdum quoque multò plu-
res .* 12

M

Manfredii Fratres laudati . 60.67

Merys laudatus . 36

*Mesenterii Pinguedinis Usus in-
serviendi Hepatis secretioni pro-
ponitur .* 3

Musculi . V. Acceleratores . Ani .

*Coccygis . Vagina . Vesica . Ure-
thra .*

L

*Lactea Vasa statim infra Pylorum
observata .* 31

Ex Crassus etiam Intestinis

oriri , non est negandum . 31

Lactea , & Lymphatica in

Mesenterio sunt eadem . 31

*Lanciscus Archiater Pontif. lauda-
tus .* 40.44.49.63.94

*Levatores Musculi . V. Ani . Coccy-
gis . Vesica .*

*Lien defuit à primordiis in Canes-
te ulla noxa .* 36

*Defueritne verè in Orice-
lio , dubitandum .* 36

*Exsectus in Canes sine fa-
cunditatis laesione , sed cum la-
sione bilis .* 36

O

*Oesophagi Fibra in homine non sunt
spirales .* 4

*Glandula interiores in va-
riis brutorum speciebus obser-
vata .* 5

*Glandulas exteriores veri-
simile (non certum) est , in*

Oesophagum influere , & cur . 5

*Omenti Usus inserviendi Hepatis
secretioni .* 3

P

*Pancreaticus Succus non est aci-
dus .* 38

*Partus tempore an ossa Pelvis di-
ducantur .* 28

- Peritonæi Processus à quibus descripti melius fuerint. **1**
 Pharynx. De ea quadam. **45**
 Piscarnius laudatus. **34-42**
 Poupartii lapsus. **2**
 Pseudosphincter. V. Vesica.
 Pylori structura. V. Ventriculus.
 Sceletis conficiendis quorum offa aptiora, & cur. **104**
 Secretio animalis. De ea commenta quadam confutantur. **45** & seq.
 Sphincter. V. Ani. Vagina. Vesica.
 Splen. V. Lien.

R

Rectum Intestinum haud rarè à suo recto situ facilè dimove-
 tur. **21. 24**

Ejus Diverticulum. **9**

Valvula quadam. **10**. Vide etiam Ani.

Renes an semini præparando inserviant, quomodo inquirendum. **70**

Renum alterius defectus. **67**

Cellula quadam morbose pluries in ipsis observata. **69**

Structura Malpighiana propugnata. **69**

Superficiæ structura, & ejus vasa. **70. 71**

Renum Pelvis magnitudo, & varietas. **68**

Ejusd. Pelvis, & Ureteris vasa. **70**

Renum Succenturiatorum Usus. De hoc quadam. **66**

Riolanus jam olim Ileii Diverticula observaverat. **9**

Ruyfchius laudatus. **8. 36. 32. 53. 64-70**

S

Saliva cur naturaliter subviscida. **50**

Santorinus laudatus. **28. 68**

V

Vagina Uteri Sphincter quid sit? **90**

Vallisnerius laudatus. **8. 33. 34. 36. 59**

Valsalva laudatus. **27. 36. 67**

Valvula Bauhini dicta. V. Bauhini.

Vasa. V. Adiposa. Lactea. Renum.

A vasorum majorum conditionib. non licet inferre conditiones minorum, & insensibilibium. **40. 41**

Ventriculi humani Glandula observata. **6**

Ejusd. Pylori structura, etiam ut in sue. **6**

Villi in eod. animali satis ostenduntur. **14**

Ventriculum ingesta non succo dissolvante, sed motu potius exte-
 rente conficere, quibus disputa-
 ri argumentis possit. **33. 34. 35. 49. 50**

Vercellonus laudatus. **34**

Verheyenii lapsus. **1. 2. 4. 7. 29. 31. 68. 70. 71. 102**

Vertebrarum Corporibus interjecta Logamenta. Horum structura. **104**

Eorundem pro varia ætate varia crassitudo. **104**

Vesicæ.

- Vesica Urinaria duo Carnea Corpora.* 86. 87
Musculus quidam Levator Proprius commentitius videtur. 88
Musculus quidam Depressor refutatus. 92. & seq.
Sphincter verus, & falsi. 75. 81. 82. 90. 91
Tunica. 76. 77
Alia de Vesica. 83. & seq.
Vesica Urin. novus quidam Mechanismus examinatus. 74. & seq.
De Acubus intrà Vesicam repertis. 73
Ejusd. quadam quasi Hernia. 74
Peculiares ad Vesicam Via pro urina potius non admittenda, & cur. 73
Vesicula fellis. V. Cystis.
Vicusseninus laudatus. 38
Volvulo correptorum rarissimi verum stercus evomunt. 16
Circa Suppositoria in Volvulo per os rejecta quid animadvertendum. 17. 18
- De Volvulo, alia.* 16. & seq.
Ureterum dilatatio ingens. 100
Figura, & angustia in fine, hujusque usus. 100
Glandula confirmata. 71
Parietes cur crassiusculi. 71
Urethra Muliebris. De hac quadam. 91
Urethra Virilis tota positio descripta. 82
Hujus positionis observande modus, atque utilitas. 97
Musculi Dilatatores veri quando agant. 82
Uteri Ligamenta Rotunda. 102
- W
- Willisi lapsus.* 6
Ejusd. descriptio Ventriculi magnam partem est ex Falloppio. 6
- Z
- Zambeccarius laudatus.* 25. 70

F I N I S.



NOI

N O I R I F O R M A T O R I

dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. Frà Tommaso Maria Gennari, Inquisitore, nel Libro intitolato: *Jo. Baptistæ Morgagni in Patavino Gymnasio Primarii Anatomies Professoris Adversaria Anatomica Tertia, &c.* non esser cosa alcuna contra la Santa Fede Cattolica; e parimente, per attestato del Segretario Nostro, niente contra Principi, e buoni costumi; concediamo Licenza a *Giuseppe Comino*, Stampatore in Padova, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 16. Novembre 1717.

(Francesco Soranzo Proc. Rif.
 (Michel Morosini Rif.
 (Lorenzo Tiepolo Cav. Proc. Rif.

Agostino Gadaldini Segr.

ER-

E R R A T A.

Pag. 3. lin. 5. *pro* Malpighii *lege* Malpighii P. 11. l. 31. *pro* horumque *lege* horumque
 P. 15. l. 12. *pro* laves *lege* leves l. 19. *pro* Celeberrimam *lege* Celeberrimum P. 22. l.
 21. *post* rimæ *adde* ferè P. 54. l. 23. *pro* acclivis *lege* retroversâ P. 63. Lult. *dele* " "
 P. 91. l. 27. *post* est *adde* " Pag. 102. l. 16. *post* in *adde* ista



PATAVII. MDCCXVII.
EXCUDERAT JOSEPHUS COMINUS
VULPIORUM AERE.

FIGURARUM EXPLICATIO.

FIGURA I. pertineas ad Animadversionem VI.



Intestini Recti aperti, atque explicati infimam internamque partem, & in hac Ani Columnas, & Valvulas, quemadmodum saepe observantur, ostendit.

a. a. a. a. a. Ani Columnae.

b. b. b. b. b. Interjecta iisdem Valvulae Semilunares.



FIGURA II. spectans ad Animadversiones XII. XIII. XIV. Intestini Coli partem cum Caeco, & Bauhini Valvulam, hujusque Frena, atque alia praeterea repraesentat.

A. A. A. Colon Intestinum à suo principio sursum in pariete dextero secundum longitudinem apertum, & explicatum.

B. Veri, hoc est Veterum, Caei Intestini pars externa.

C. Intestinum Ileum haud longè à sua insertione in Colon, amputatum.

D. Appendicula Vermiformis, quam huc ad latus protraximus tantummodo ut appareret; neque enim in hac, aut proxima Figura, id nobis proposuimus, ut hujus Appendiculae, aut Ilei frequentiore situm ostenderemus.

e. Caei Veterum Intestini pars interna.

f. Intestini Ilei extremum orificium in rima modum naturaliter occurrens: quod intra Coli initium sursum retraximus, ut quantum prominere intra intestini cavum ab * videlicet usque ad f. si non satis ob concidentem nimirum mollis istiusmodi Partis substantiam, at cerè quadantenus posset intelligi. Istud autem orificium, atque hac prominentia Valvulam Bauhini dictam constituunt.

g. g. Frena, seu Retinacula ejusdem Valvulae.

h. Appendicula Vermiformis orificium, in quod specillum immissum est.

FIGURA III. ad Animadversionem pertineas XIV.

Eadem Intestina, quæ modò exposita Figura, ostendit, sed ab externa facie spectata, praesertim verò partem ultimam trium Coli Ligamentorum, atque horum finem in Appendicula Vermiformi.

P

A. A. A.

- A. A. A. B. C. D. *Eadem qua in II. Figura, Intestina commonstrant.*
 E. *Appendicula Vermiformis initium cum tota Appendicula sursum retractum, ut in hac desinere tria mox indicanda Ligamenta, perspicue appareat.*
 F. *Ligamentum Coli Anterior.*
 G. *Posterior.*
 H. *Laterale. Quod quidem Ligamentum in hoc falsum, isemque in altero quod nuper secui, cadavere neque aliis duobus esse angustius, neque ut ipsa, pertingere totum vidi ad Appendiculam Vermiformem, sed ejus quoque partem per proximum Ileum produci.*

Illud insuper huc addam, Riolanum tria quidem Coli Ligamenta aliquando memorasse; attamen cum in Monito quod in postrema suæ Anthropographiæ editione, post Præfationem subjunxit, quæ ante ediderat, excepto Encheiridio, *abrogaverit, revocaverit, atque improbaverit*; cumque in Encheiridio quo utimur, *emendato* non nisi duo Ligamenta Coli agnoscat, in ea autem postrema Anthropographiæ editione loca omnia in quibus illa tria Ligamenta memoraverat, sedulo mutaverit, & pro tribus duo rescripserit; cum hæc, inquam, ita sint, satis nimirum hinc intelligi, cur neque illa scripta quæ ipse improbavit, unquam antea, & ne nunc quidem, nisi fortuito inspexerim, & si vel antea inspexissem, non tamen debuerim illud Riolano adscribere, quod ipse (nescio qua de causa) abrogavit, ac revocavit. Quod autem Summus Anatomicus Ruyschius, ut me nuper monuit Vir Cl. Laurentius Heisterus, *tertium ipsi Ligamentum Coli ante annos duodecim demonstraverit*, id verò si tempestivè novissem, illius quoque nomen in memorata Animadversione XIV. haud illibenter adscripsissem.

Cum autem hæc typis jam jamque describenda essent, ut Adversarius III. adderentur; reddita est mihi cum ejusdem Præcl. Heisteri elaboratissimo de Re Chirurgica Volumine, aliisque mecum liberaliter communicatis Dissertationibus illa etiam quam *de Valvula Coli* inscripsit, Anatomica Dissertatio: quam inter, & pleraque eorum quæ in IX. & quatuor proximis, nec non in XVI. eorundem Adversariorum Animadversionibus de iisdem rebus edita fuerant, ut summum apparere consensum, gaudeo; ita haud ægrè fero quòd in perpaucis, inprimisque in Frenis, & compositione ejusdem Valvulæ; si quis fortè attentius utriusque scripta conferat, discrepare inveniamur. Quinimo ut omnes intelligant, esse